

PHARMACO-

PŒIA, SEV DE MEDI-

camentorum simplicium dele-

ctu, præparationibus, mi-

stionis modo, Li-

bri tres,

*

IACOBO SYLVIO MEDICO

AVTHORE.

*Cum Indice omnium rerum hoc opere
memoratarum, amplius*



IN
VIR
TUTIBUS



NO
T
A
N
A

72,038

LVG DVNI,

Apud Gulielmum Rouillium,
Sub scuto Veneto.

1565



PHARMACO

LIBRIA, SEV. DI MEDIC

centenarium dispensationum

et compositionum

thom. moro, li.

philosophice

*

JACOBO SYLVEO MEDICO

AVTHORE

Qua serie continetur remedia optata

in curandis morbis



ET
MORTUARIA

ET
MORTUARIA

IN ODORAT

Apud Gulielmum Roubini

in Vindobona

1582

AD LECTOREM.



VT rectè est veterum sermone celebrata sententia, Quam quisque nonit, artem, hanc exerceat vnam atque excolat, & totus in ea versetur: sic rectè nunc pronūciari posse mihi persuadeo, quam quisque exercere artē constituit: hanc accurate prius pernoſcat. Id quod si hodie diligentius obseruaret homines, non tam multi repente fierent medici, nulladam medicinæ parte illis probè peruestigata, nullius adhuc morbi curatione apud præceptores obseruata. Cum tamen esset e re ipsorum, sed magis etiam ægrorum: si nullum omnino affectum susciperent curandum, quem non antè obseruassent à præceptoribus curatum. Quàm rectè cum ægris ageretur, si hac ætate qui medicinam facerent, sic essent antè sub præceptoribus instituti affectus cognoscere, illis occurrere, futura præuincere. Non mediis fidius per hominum mortes, experimenta sic agerent imperiti adhuc, & rerum omnium suarum rudes medicitæm questus auidi, ut quid eos deceat, ignorent, quid famam perstringat nesciant, ut interim animæ detrimentum taceam. Vbi enim medicas nescio quas præceptiuinculas memoria didicerint, ac medica-

mentorum certas quasdam scripturas, se medi-
 cos profitentur. Illis est satis scire antidotum, ca-
 tholicum verbi gratia, humorum omnium redun-
 dantiā vacuare, cum ignorent, quibus & quan-
 ta singulorū mensura constet, quæ singulorum sit
 facultas, quæ horum cum illis sit mistorum: ea-
 demque in ceteris medicamentis cōpositis vtun-
 tur, ignorantia impostura. Quid per Deū im-
 mortalem hoc hominis portento, se medicum men-
 tiente est reipublica pestilentius? quod nota cen-
 soria dignum magis est facinus? Cur leges cessā-
 tis in hos carnifices, vt meriti sunt, animaduer-
 tere? An nondum extant quæ hanc capitalem
 inscitiam puniant, & nouo vindictæ exemplo
 coërceant? aut si hac peccandi licentia impunè
 permittitur, cur non modo ex typographorum
 prælis, sed omni omnium hominū ordine in medi-
 cinam non cōuolatur? Sed Deus optime maxime
 nobis largire meliora, & indoctis his carnifici-
 bus ignorantie suæ conscientiam oppone, vt fa-
 cinorum tam indignorum penitentia confusi, in
 ordinem suū redigantur. Iam ab hac arena ex-
 plosi circulatoribus istis, rem medicā sincerè tra-
 ctaturo non soli pharmacopœo necessariam esse
 hanc medicina partem quæ simplicia deligit, ad
 compositionem præparat, & denique feliciter cō-
 miscet, docere aggredior. si enim pharmacopœi
 fides tibi suspecta est, velisque ob id ipsi simpli-
 cia deligenti, præparanti, miscenti, adesse, quid
 ex hoc

ex hoc studio emolumenti consequare, nisi hac tu-
t ut ille pernoscas? imò quam tibi infamiae notam
imprudens inuris, dum ignarus horum simplicium
medicamentorum, tanquam asinus quidam ad
omnia eius rogata auribus motis velut annuus.
Quid quod tibi saepe etiā volens pharmacopæus
illudū, & mea sententia iustissimè, dum coryli
nucamentum pro pipere longo ostētat, dum cen-
taurū magni radicem pro rhiapontico, dum aco-
rum palustrem nostrū pro Indico. & vero porri-
git, sed vitia hæc tolerabilia sunt. Pro elleboro au-
tem nigro, Arabū napellum, aconiti genus qui-
busdam, hodie propè ab omnibus pharmacopæis
substitutū quis ferat? an non cōmunis est utriq; me-
dicorum & aromaticorū ordinis ignorantia &
culpa? Venia dignior est impostura, cum aristo-
lachiam clematitem nobis frequētem pro diabusi-
alijis rarioribus supponunt, indignior cum scam-
monium erudū pro cocto miscent, aut largius quàm
scriptura medicamenti postulet, medicamentis
immiscēt, aut etiam cum al cuius ex tithymalis
lac miscent pro scammonio. Quæ errata ceteraq;
omnia in medicamentorū mīstione cōmitti soli-
ta si vellem persequi, longior Iliade nostra pro-
cederet oratio. At ut donemus medico ad cōpo-
nendum nihil opus esse diligenti ista in simplici-
bus medicamētis deligendis, parandum & miscen-
dis exercitatione, iam pharmacopæo cōmissa: ad
pernoscendum autem cōpositi vires, omnia hæc

illi ad vnguem sunt pernoscenda. si enim vnius
simplicis improbitas totam saepe compositionem vi-
tiat, vt abunde in methode medicamentorum compo-
nendi docuimus, an parui esse tibi debet singula-
rum simplicium delectus: si item preparationis ra-
tio simplicium vires auget, minuit, abolet, nouas
acquirat, vt lib. 2. explicauimus, quam tu horum
ignarus facultatem toti medicamento tribues? Si
denique mistionis modus ex eadem materia un-
guentum, ceratum, emplastrum efficiat, an tibi
est negligendum? Crede mihi, absurdissimus est,
ac saepe ridiculus, qui medicinam facit, harum re-
rum ignarus: nō dico quoties medici imperiti enu-
merata simplicium turba subscribant, fiat empla-
strum, vel aliud, cum tamē ad hanc medicamen-
ti formam scripta illa simplicia nunquam ve-
niant. Quae res medicum pharmacopaeo ignoran-
tiae suspectū merito reddit. Praeterea multos me
vidisse tam harum rerum imperitos, vt cum in of-
ficinas discessissent pharmacopaeorum, non modo
simplicia vsu ipsis quotidiano celebrata nō agna-
uissent, sed neque cōposita medicamenta illis propē
cōtinenter in ore et calamo versata nouisse mol-
lia ne essent, an solida: an non id est ignorantia
rerum maximē necessariarum crassissima? Quā-
ne exuant plerique à medici dignitate alienum
putant in medicamentarias officinas diuertere,
ibi aliquandiu sedere, quae cōponuntur obseruare,
quae consuetudo, vt in Gallia Narbonensi est
antiquiss

antiquissima, utinam hinc saltem nunc inciperet
ac procederet: spectarent medici quam sæde fre-
quenter labuntur ob cōpositorum iniquitatem,
& fortasse sua dignitate, si scientia id minime
possent sua, indoctos, aut improbos pharmaco-
pæos à prava compositione deterrerent. Hæc
prolixius à me scripta quam rei natura postu-
let, fortasse ineptus aliquis calumniabitur: cum
tamen res ipsa longissimam efflagitet orationem,
quæ profligata multorum ignorantia, omnes
medici nomine dignandos in id studium impel-
lere posset, ne posthac esset accusationi locus. Fa-
xit Deus, ut quisque quam exercet artem, per-
noscat, & medicus nihil eorum ignoret, quæ ad
morbos cito & tuto curandos utilia, vel necessa-
ria esse consueverunt. Porro medicum omnia
hæc intelligere oportet, non ut in opus pharma-
copæorum euadat (nisi si quando horum desi-
derio cogatur aliquid huius artis moliri) sed ut
cōponenti pharmacopæo possit non modo adesse,
sed etiam præesse: nec huius discipline ignarus
quotidie describat simplicia quæ in emplastrum
cogi iubeat, cum ex his quidvis potius quam em-
plastrum perfici queat, quomodo cum ampibora
cœpit formari, corrente rota cur vicens exit?

Vive, vale lector, si quid seu rectius istis,
Candidus imperti: si non, his ptere gratias.

DE PHARMACOPŒI

OFFICIO.



QUANTUM plurima cum medico habet communia pharmacopœus, prudentiâ naturâ insitam, medicamentorum absolutam cognitionem, diligentiam in his omnibus quæ suarum sunt partium maximam, probitatem: tamen non pauca ipsi propemodum propria videntur, quæ tamen aliquando & medicorum fuerunt cum ipsi medicamenta parabant, id quod Galenum fecisse passim scripta ipsius loquuntur. Eius generis sunt medicamentorum delectus, ratione & experientia summa quæsitus: deinde seruandi hæc modus, & tempus quo viget, aut iam viribus efforta sunt ac exanimata. Item qua ratione vnumquodque sit vtendum, siue illud ipsum per se, siue cum aliis coquendo & terendo, vel alia ratione præparando. Sit præterea doctus grammaticam, vt compositiones veterum, & scripturas medicorum quotidianas intelligat, in quibus si quid interdum hi scripserint largius,

gius, aut parcius, aut ingratus quam
 ægro huic competere coniectet pharma-
 copœus, medicum amicè admoneat. Vo-
 lumus præterea pharmacopœum artem
 omnem medicamenta deligendi, præpa-
 randi, & componendi callere, cultu me-
 diocri contentum, hilarem, facetum, dili-
 gentem in rem ægrorum: non avarum,
 non libidinosum, non ebriosum, non con-
 tentiosum. Quæ iterum illi cum medico
 sunt communia, vt Hippocrates docuit
 libro de medici officio. Quibus animi &
 corporis, & fortunæ dotibus si præditus
 erit pharmacopœus, nihil inconsulto me-
 dico perito, cuiquam propinabit, præser-
 tim magnarum virium, sed neque quan-
 tumvis paruarum, cum horum vires ne-
 sciat: & plerunque auxilia hæc quamvis,
 vt videtur, imbecilla, tamen quantitate,
 qualitate, tempore insalubria, magno-
 rum sæpè morborum sunt occasio, & le-
 gitimam curandi rationem peruertunt,
 dum sub his curatum corpus remedia
 iam maiora, sed idonea non feret. Nihil
 etiam vel amore, vel odio, vel metu, vel
 pretio, vel ignorantia peccabit: neque ve-
 nena abortum facientia, exoleta, adulte-
 rina, aut supposititia vnquam exhibebit:
 sed medicum doctum cōsulet quodnam

simplex, aut cōpositū illi? penuria volet
 substitui. Non augebit medicamenti ali-
 cuius valentis quantitatem, vt vacuatio-
 ne hinc largiore securæ dicatur medica-
 menta habere præstantiora. Quàm vel-
 lem huius ætatis pharmacopœos ad hūc
 se velut canonem conformare, & medi-
 cos ad suum: non esset cur hodie tam ne-
 glecta iaceret medicina, etiam multo-
 rum probris lacerata. Deum optimum
 maximum supplex oro, & obtestor, vt ali-
 quando id studium in mentes medico-
 rum & pharmacopœorum immittat, vt
 esse quisque quàm videri aut dici malit
 optimus, vel medicus, vel pharmaco-
 pœus. Quod si diuinā illam gratiam ne-
 glexerint, faxit Deus, vt regia censura in
 eos aliquando animaduertatur, qui ar-
 tem prius exercent quàm pernouerint,
 hominum corpori tam salubrem,
 cum rectè obitur: tam in-
 salubrem & pernicio-
 sam, cum inscien-
 ter tractatur.

DE



DE MEDICA-

MENTORVM SIMPLI-

CIYM DELECTV RITE

FACIENDO LIBER

PRIMVS.

Q. .CITAM. .ED.



Vos tres libros his mensi-
bus proximis sum pollici-
tus ad modum recte medi-
camenta componendi per-
tinetes, prestare aggredior:

Primum scilicet, de accurato medica-
mentorum simplicium delectu: Alterum
de legitima ipsorum preparatione: Po-
stremum, de modo miscendi medica-
ta componi idonea. Quod vero ad pri-
mum laborem mihi propositum attinet,
quanquam recte à Mesue tradita est me-
thodus medicamenta purgantia deligen-
di, & quam facile ad alia quoque medi-
camenta deligenda transferre possit le-
ctor nō indoctus: tamē paucis visum mi-
hi est eam methodum illustrare, & planio-
rem reddere locis aliquot e communibus,
à Mesue post Dioscoridem, & Galenum
obseruatis, nostro autem commentario

latius

latius effusis: quanquā & à me non pauca
in hanc rē sunt dicta initio methodi me-
dicamenta cōponendi: sed tamē quę nūc
trademus, neq; bis dicta, neq; ociosa faci-
lē intelliges, si ea legeris attentius. Dele-
ctus itaque medicamentorū simplicium,
vt aliarū rerum plurimarum præcipuē su-
mitur ab ipsorū substantia, quātitate, qua-
litate, actione, situ, & tempore. Quædam
enim ipsorum præstantiora sunt, si crassæ
sint substantiæ: alia, tenuis: nōnulla, dēscē:
alia, raræ. Sunt quæ magis leuitas cōmen-
det, quæcūq; granitas. Nec desunt quę fria-
bilia magis p̄bamus, alia fractu & pulue-
ratu cōtūmacia. Adhæc glutinosa quædā,
alia fluxilia. Aspera itē nōnulla præponi-
mus, alia leuia. Postremò hæc mollia aliis
præstātiora, illa verò dura iudicam⁹. Hęc
enim propria qualitātū tactiliū nomina
substantiæ per se incōprehensibili & indi-
cibili tribuuntur, quòd eius crassamentū
& ex elemētis mitionē primę sequūtur,
& omniū post sapores (qui etiā ad has re-
ferri possunt, cū gustatus, quoq; Aristo, &
Gal. quidā tactus sit) maximē demonstrāt.
Ad eandē plenius declarandā nō leuiter
conferunt sinceritas, impuritas hepatis,
ferri, aliarūque rerum nobis notarū, in
substantia similitudo. Præterea substantiæ
triplicis

triplicis in vnoquoq; , si obseruari queat, copia, penuria, mediocritas.

Quid autem hæc nomina qualitatum tractum medico significet, licet abunde sit explicatum lib. 2. nostræ methodi medicamenta componendi, hoc loco tamē paucis perstringere non fuerit alienum.

Crassum seu *πᾶχυμεις*, quod ægrè in Lib. 10. tenues partes comminui potest. *simpli.*

Tenue seu *λεπτέμεις*, quod facîle in partes tenues cōminui potest: quod in siccis significat in puluerē tenuissimū, in liquidis verò, quod pròptè latius se spargit, & corp² quaquauersum citò imbuat, ipsumque velut vanescit, vt aqua vitæ, oleū terebinthinæ, & oleū ipsum aquæ collatum. *cap. 3.*

Densum propriè quod poros, id est, meatus paruos per se totum habet.

Rarum propriè quod poros per se totum habet magnos. Lib. 2. *sanit. tuen.*

Densum per metaphorā & abusiue est coactū in se, vt aqua, terra. Rarū verò est laxū, vt ignis, aer. quanquā hæc elementa sint vnita, & ex similaribus natura partibus cōstet, nec vllos tales poros habeant.

Græue quod mole exigua, pondus magnum exhibet nobis, vel stateris, qualia sunt aquea, terrea præsertim densa.

Leue quod mole etiā magna pondus exiguum

exiguum præstat nobis, vel stateris: ut igneum & æreum corpus, præsertim rarum. Aqua autem quæ cito calefit aut refrigeratur, Hippoc. leuissima dicitur: nō tantum proprie ut definimus, sed etiam per abusum, quod hypochondriis non sit grauis, nec in his diu immoreretur ob essentiae tenuitatem: quæ facit ut cito alteretur, & promptè in corpus distribuatur.

ραϊοχηρ, id est, lētū & glutinosum in solidis corporib. quod fractu est cōtumax, humore partes terreas glutināte multo, & tensioni cedente, ut in sparto, salice, coriis, tendonibus, ligamentis, quæ rufa lateſcūt magis. Friabile quod proptè friatur, & in puluerem abit, etiam digitorum compressu, ut amyllum, cerussa, caphura.

Lentum autē in humidis est quicquid egrè dissolubile adharet, seu quod dū trahitur, aut digito vel alio tollitur, cōtinuitatē longissimē seruat, nō intercisum, nec abruptum, ut oleum, mel, adipēs, pituita.

πυρρην, id est, detergēs, quod tantū abest ut adhaereat, ut etiā quæ adherent detergeat. Alibi autem in Methodo, ipsi glutinoso in humidis opponit Gal. fluxile & liquidum. Asperū non solum tactu inaequale, sed etiā gustatu partes inequaliter siccās, cōtrahēs, humore terreo integēs: quale

Lib. II.
metho.

Lib. 7.
Meth.
in mel-
le.

Lib. II.
Meth.

quale acerbū, austerum. Lene, lubricū, & equale, in humidis verò quod lingue, faucium, asperæ arteriæ, dentiū inæqualitatē corrigit, vel replendo, vel modicē tergendō, & laxādo, quale dulce & vinctuosum.

Molle quod cedit nostrę carni. Durum cui cedit nostra caro. De vtroque plurā lib. 2. sanit. tuendæ, & lib. 5. simp. cap. 4.

Ad crassum reducitur terreum, lapidosum, arenosum, astringens, opacū, crudū.

Ad tenue, aëreum, igneum. coctum, vstū, amarum, acre, perlucidum.

Ad densum, solidum, coactum, compactum, vnitum.

Ad rarum, laxum, fungosum, solutum.

Ad graue, plenum, distentum: & si vis densum, succulentum, bene habitum, probe nutritum.

Ad leue, inane, foraminulentum, fungosum, rugosum: & si vis rarum, exacum, emaciaturum, marcidum.

Ad glutinosum, pingue, gummosum, resinofum, mucosum, tenax, sibi fluendo continuum.

Ad fluxile, liquidum, pinguis expers.

Ad laue seu lene & politum, vel fortis tantum enode, spinis carens, depile, vel etiam intus equale, sibi vbiq; simile, hominem ac simile.

Ad

Ad asperū foris, spinis armatū, & his lōgis, breuibus, rectis, hamatis huiusmodi lanuginosum, muscosū, capillarū. Vel etiā int^{us} inaequale sibi, partib^{us} quibusdā dissimile, anomoromerēs ac dissimulare, grumosū.

Ad molle, tenerū, carnosum, succosum, fungosum, muccosum, pingue, lentū, & vitilium; corriq; modo flexile, humidum.

Ad durū, firmum, osseum, lapidosum, lignosum, exuccū, solidum, aridum, friabile, rigidum, inflexile, fractu contumax, vegetum, adamantinum refertur.

Secundo loco cum quātitas sit duplex, multitudo & magnitudo, ab utraq; notae etiam sumūt^{ur}; quibus intenti, hoc eligimus, illud reuicimus. Numerus enim singularis, dualis, multiplex, vel aliter pluralis, radices, stipites, ramos, folia, flores, fructus, semina, cortices, & reliquas plātarū partes, atq; adeo plantas totas, vel optatiores reddit, vel cōtempiores ac minus salubres, quod in colocynthide planta & fructu, & aliis quibusdā recte Mesues commemorauit, & in multorum aliorum delectu clare apparet, tū ex nostris simplicibus, tum ex hoc lib. 4. Pharmacopoeiae.

Magnitudo autem latius patet, nō modo quia magis ad deligendū pertinet, sed quia eius nomine interdū sola longitudo

venit: vt Aph. vlt. lib. 2. Potest etiam latitudo sola intelligi, vel etiã solã profunditas. nonnunquã longitudo simul & latitudo, vel lōgitudo & profunditas, vel latitudo & profunditas, vel tria simul: quo significatu ferè accipimus: Huc pertinet, q̃ in horū singulis cōtrarietas est, ratioq; maioris & minoris in infinitū extenditur & lōgum, breue, latum, angustum, profundū, elatum, symmetrō sui generis collatum, aliud magis & min⁹ alio dicitur, idq; paulò vel multò magis vel minus. Et inter hæc contraria, præter dicta, est mediocritas. quædam indiuisibilis; alia maioris & minoris ratione diuidua.

Ad huius loci cōmunis vastitatē pertinent nomina mēsurarum nobis notarū, digiti, & eius parui, maximi, mediij, pollicis, palmi, do drātis, pedis, cubiti, & aliorū plurimorū. Hinc dicimus deligendū hoc illud vel fugiendū, quod magnū est, enorme, procerū, vastum, corpulentū; benē habitū, exiguū, gracile, strigosum, rugosum, marcidum, (nam hæc etiã quantitātē cōsignificant) & item quod est præditū magnitudine digiti, pollicis humani, manus, palmi, do drātis, pedis, semipedis, dimidij cubiti, cubiti vnius, duorū, triū, quatuor, quinque, seu digitali, pollicari, do drātali,

Pedali, semipedali, bipedali, tripedali, cubitali, bicubitali, tricubitali. In quo sermone genere magnitudo longitudinē poti⁹ declarat, quanquā crassitiē & profunditatē significare possit: quarū alterutra dum nobis apert⁹ significāda est, exprimitur, vt humani digiti, parui, indicis, pollicis, cubiti, baculi, vnus, duorū, &c. vel digitali, pollicari, cubitali, &c. crassitiē vel longitudine. Id q̄ in profunditate similiter facimus frequēter, vtrāq; dimensionē crassitiē nomine cōprehendimus, dicentes, hoc tūc esse, vsui, quādo est crassitiē digiti, pollicis, cubiti, baculi. Est quādo altitudo quoque exprimitur, vt pro tensorum vtrinq; hominis brachiorum altitudine est solanum manicon. Dio sc. & phcenix herba sedigitalis, seu senum digitorum.

Eodem modo in contrariis paruitate, breuitate, angustia & gracilitate, maioris & minoris ratio exercenda est.

Ex loco enim fertili plātē & animalia, auctiora & pulchriora euadūt eadem ob id vel deligenda vel interdum fugienda. Scillā nāq; enormē (qualis terra feraci prouenit). Galemis dānat: improbat & strigosam flaccidāq; bene habitā verò, & magnitudine mediocrem commēdat.

Qui autem locus cōmunis in qualitate est,

est, notarū ad deligēda medicamēta necessariū est fœcūdisimus. Hinc pbamus aut improbam⁹ medicamentū hoc, illud: calidū, frigidū: humidū: siccū: principio medio, sine ordinis primi, secundi, tertij, quarti. Ad hæc, hac vel illa præditū facultate, secunda, tertia, & sapore, odore colore, has qualitates primas, cōsequentibus.

Sapore quidē vel nullo apparente, seu aquo & fatuo, vel gustū astringente, seu acerbō austerōve vel acido, vel dulci, vel vinctuoso, vel nitroso seu falso, vel amaro vel acri (adquē feruidus linguā erodens, caustic⁹, idest, vrens reducitur, vt ad dulcē melleus, suavis iucūdus) vel ex horū quibusdā misto vt vinoso, medicato, vel rei alicuius notē vnicū sapore, & ob id insignē, sed fere inexplicabilē nascit^r, vt sapore aloēs, piperis: hoc illud est præstātius vel deterius. Sed dū sapore medicamēta exploras, præsertim acria, aromatica, amara, falsa, ne gusta eodē tempore multa, vt nō tibi imponat gustatoria qualitas linguæ ab iis tradita: quā tamē aqua pura gargarizata, aut papyr⁹ māsā delere putatur.

Odore verō iucūdo, suavi, bono, ingrato, fœdo, tetro, acerbō, austerō, acido (tot enim sūnt differētiæ odorū, quot saporū sed nominibus nō designatē, odore itē

*Galen.
libr. de
natur.
homi.*

croci, bituminis, cucumeris, vel alterius cogniti, & odore eximio præditi sed indibili, & qui in nullâ prædictarû differētiarû rectē cōferri possit. Sic odore vino so, aromatico, medicato, illud hoc cōmēdante, iucundo. Hoc illud esse debet, non debet, hoc graniter odoratu, halitu, terrâ, hircû, picem, resinam pineam, bitumen, olēte, viroso, aspero, est melius vel peius.

Colore deniq; nullo insigni, vel albo pallido, rufo, flauo, rubro, viridi, liuido, nigro, vel horum medio (vnde hoc illud *ὑπάλινον, ὑπ᾽ ὤχρον, ὑπὲρ πυρρὸν, ὑπὸ ξανθόν.* & similia Græcis dicuntur, vt Latinis subalbū, subpallidum, subrufum, subflauū vel albicās, pallefcēs, rubescēs, flauescēs, vel in album, pallidū, rufum, flauū inclinans) vel ex horū quibuscūq; misto, vnde *χρυσῶχρον, ὠχρὸπυρρὸν, ὠχρὸξανθόν, πυρρὸξανθόν,* & similia Græcis sepe dicuntur: nobis ex albo pallidum, ex pallido rufum, vel in pallido flauum, ex rufo pallidum, vel pallidum in rufum inclinans, vel cū rubore albescēs, cinereus, ad ceruleū vergens, & similia. Sed id illustrius apparet in semotis coloribus quàm natura propinquis. Hæc verò naturæ in coloribus propinquitatē ordo nobis Gal. lib. 1. crif. sequentis seruatus ostendit. Albo enim pallidus vt situ hic est proximus,

ximus, sic natura & aliis similiter.

Ad albū verò reducitur color lacteus, niveus, fulgore & nitore alabaſtri.

Ad pallidū, cinereus, plūbeus, buxeus.

Ad rufum, melinus, id eſt, mali cydonij, fuluus, rutilus, igneus.

Ad flauum, aureus, luteus, croceus, diluti, aquæ croci color.

Ad rubrum, roſeus, ſanguineus, puniceus, purpureus, vermīculus.

Ad viridem, herbaceus.

Ad liuidum cæruleus, glaucus, cæſius nonnullis dictus, ferrugineus; & interdū cinereus, plumbeus, buxeus, hæc enim ambigūt, vt in ſuis in artem medicā Gal. commentariis apertè demonſtrat Martinus Akakia medicus longè doctiſſimus.

Ad nigrū tenebroſus, opacus, terreus, bituminoſus, fuliginoſus.

A figura quoq; nō leūis eſt ad medicamētī delectū cōlectura, quòd hæc ſunt vitæda vel vitāda, quæ figura ſunt elegāti, ſpecioſa, circinata ſeu rotūda & circulari, trigoniā ſeu triquetra & triāgula, quadrata, quadrangula, multāgula, mucronata, ſeu acūta, obruſa, recta, obliqua, trāſuerſa, ſolida, fiſtuloſa, ſpōgioſa, multiſida. Alia iſte figura, forma, ſpecie, aſpectu, effigie imagine, modo, ritu, oculi, oculi bubuli, capi-

tis taurini, cornu caprini, caudæ scorpionis, pulicis, ricini animalis, vitulinæ naris, cirrorum polypi piscis, testiculorū carnis; vel alterius, capillorum, linguæ, linguę bubulę, auriū muris, delphini, pennarū auis, geniculata, raro, crebro fructuosa, iūcea, tuberosa, bulbosa, fibrosa, cępacea; pomi, pyri, cotonei, glandis, oliuę.

Horum autem vel omnium vel plurimorū exempla postea leges frequentissima in particularium delectu, & in notis à similitudine sumendis.

Probantur præterea aut reprobantur nūc similia, nūc dissimilia, vel inter se, & in aliquā plantarum specie, vt absinthiū ponticū sit simile cantonico: abrotonū mas, dissimile feminæ.

Vt in aliquo genere superiore ppinquo sumitur similitudo aut dissimilitudo qualitarum quarundā prædictarū atq; adeo substantię & quantitatis, & actionis, vt in herbarum genere, absinthiū seriphiū est diligendū simile abrotano, sapore amaro, & foliorum habitu: vel in toto platarū genere, vt chamædrys, chamépitys herbe sunt similes quercui, pinū arboribus. Vel in genere diuerso, vt aloë optima sit similis hepatis: ascyri foliū cribri modo foraminulentū, ambitu serratū vrticę foliū, illud

in arcum flectitur, vel anchorę modo est, vel crescētis lunę ritu incuruum: venenosum, gibbosum, dorso elato: galeri, petasi, pileoli, lācę, lanceę cuspidis, cultelli, securis, acetabuli, vasculi, calathi, disci, clypeoli, fusi, pali, clauę, pistilli, iunci, festucarū, sceni, vitiliū modo formatū, inflexile, virgatū, velut lineis intersectū alarum canis binis, pluribus, virgis arborescentibus specie capituli rotundi, verticillorū, pedū lecti, stellarum, tomentosa lano saq; pube obducitur dictānus, bullę in dipsaco spinosę, flos comicis personis hiātibus similis, radice hoc esse debet crebro geniculata, vel geniculis duobus, tribus, crebris dissecta, turbarū modo in se inuicē infartis radicibus, stipitibus condylorum modo tuberculis quibusdam excrescētibus. c! Horum nihil negligendum est ei, qui probē velit medicamenta simplicia deligere, quibū singulis aliqua ex dictis insunt accōmodatissima ad ipsa cognoscenda & deligenda non mediocriter pertinentia, quod exemplis, quā verbis pluribus probare mains erit opere precium.

¶ Quāto plantarum & aliorum simplicium medicamentorum delectus sumēdus est ā situ & loco, nō modō generali & regione, vt castoriū sit pōticum, cuminum

Aethiopicū, glycyrrhiza cretica, sed etiā à particulari, in singulis regionibus, loco nempe calido, frigido, humido, sicco, horum medio. Plantæ enim calidæ in locis calidis valentiores euadunt: præhumidæ locis siccioribus castigatæ. Quæ ratio in animalibus quoque recipienda est. Sub loco autem & cælum, & flatus ventorum comprehendas oportet. Ob id ad locum calidū reducitur apricum, æstiuū, inter tropicos aut proximè ipsos, insolarū, qui in meridiem sit apertus austro perfletur, montes habeat septentrionibus obiectos, ut Galenus docet in secessu Tabiarum.

Ad frigidū umbrōsus nemorosus: arboribus, sepibus, & aliis stirpibus confertus, quercetis, frutetis, dumetis defensus, muscosus, saxosus, montosus, opacus: parietibus, arboribus vel aliis: & item polo alterutrum proximius, in parte Alpium aut Pyrenæi Septentrionem spectante situs, niuosus, glacialis, aquis niuosis & glacialibus rigus, borea & aquilonibus perfletus, solis aduersus obiectum montium.

Ad humidū, quod in aquis viuit aut vet satur, & ipsis dulcibus, salis, fluëtibz, torrentibus, pigris, rapidis, stagnatibus, paludosis, paludibus æstate siccatis, lacubus, radicatis, sine radice inpatatis, aut ppe aquas

cal

easde & scatebras, fontes, canales, fluuiorum ostia, alueos in cōualle, aquosa loco vliginosa, pratis, puteorum parietibus, & muris aliis humētibz, saxi rosidis, stillicidiis, fossis vrbium. Hinc fluuiales, maritimæ, pratenſes, aquaticæ plantæ aliis ſui generis alio loco educatis præſtantioreſ ſunt, vel deterioreſ pro varia ipſarum natura, & expetita nobis earundē facultate.

Ad ſicū, editus, montuoſus, tumuloſus, cliuoſus, ſaxoſus, petroſus, ſcrupuloſus, tophace°, pumicoſus, ſalebroſus, ſabuloſus, arenofus, argillace°, prærupt°, ſcopuloſus, p̄mōtoriis altus, aſper, tenuis, ſterilis, perflatilis, in ſemitis, viis, itineribz, in aggeribus viarum & murorum, in ruderibus, & ruinis, aut circa ruinarum rudera, domos in parietibus, muris, muroꝝ crenis & minis, in tectis recentibus, vetuſtis. Quæquæ horum quædam aliquando humectata eſſe poſſunt, vt petrę littorales, teſtæ piſciū, quibus muſcus marinus innaiſcitur.

Ad mediū horū ſeu temperatū reduci tur locus regionum tepēratarū, vernus, & magna ex parte capeſtris, planus, pinguis, fecundus, cultus arūm, in ſegetibz tritico, hordeo, leguminibz, vinetis, hortis.

Ad locum nē & ſitum cōnexio reduci tur & vicinia, Plātæ enim maleficæ & ipſa

rum fructus sunt innocētiōres, si multę si-
mul ex eodē loco venenosam, sed sibi fa-
miliarem substātiā trahāt, & multi fru-
ctus malefici ex vna planta, ob id thyme-
lēam, colocynthidē, seillā in loco aliquo
solam rectē damnat Mesues, præfert quę
multas cōgeneres simul nutritas habet, &
colocynthidis fructū si vnicus erit aut pau-
cus improbat, numerosum præfert. Ratio-
nabile enim est, vt plātas benignas si pau-
cę sint, vberiorē succū benignū trahere,
& ob id salubriores esse: sic maleficas ve-
nenosam loci malitiā exhaurire, & in se
trāsferre: quę & largiorē & vehementiorē
pauca, quā multę in se trahant necesse
est. Sublimis quoq; situs, infernus, dexter,
sinister, anticus, posticus quidam est, sic
misy, chalcitis, sory, situ diuersa, metallicā
substātiā indicant & facultatem diuer-
sam, & tartarū in summo vase vinario me-
lius, quā in lateribus, & cadmia botry-
tis melior alijs, & pompholyx, spodio præ-
stantior: sic densi fructus quia conferti &
cōpressi malē nutriūtur, malē coquūtur,
malē diffiantur: cōtrarij, cōtrā: laxi enim
& rari partus plantarū, & animalium, vbe-
rius alimentum trahunt, ob id meliores
sunt, si nobis salubre est id alimētū: peio-
res si insalubre, vt in colocynthide Mesues

probè docuit. Et plantarū partes humi re-
pētes rectis aliis meliores, vel cōtrā: & in
orbem circumacta radix, vel altera alteri
insidens, vel sibi inuicē implexæ radices,
& partes mutuo cōtractu inharētes, disti-
ta, superficialiæ, profundæ. Quintò verò
cū tēperamentū medicamēti, vt aliorū,
causa facultatis, & facultas actionis, & a-
ctio operis ipsius, vt docet Gal. lib. de fa-
cult. natur. & lib. de vsu partiū, quæ ex na-
turali cuiusq; potētia, deligēdi ratio sumi
potest, ea nobis ab actione tāquam sensu
notiore sumitur. Ab actione igitur facul-
tates, primas, secūdas, tertias, quartas cō-
sequēte, delect⁹ medicamētorū sumituri
estq; hac nota maximarum virium. Quo-
niam tamen de omni genere harū facul-
tatum nobis abūdè est dictum initio lib.
2. nostræ methodi medicamēta cōponen-
di, necesse nō putauī huc ascribere. Harū
autē differentiarum & notarum, vel plu-
rimarum, vel omnium, vel saltē quarun-
dam, in singulis simplicibus medicamen-
tis exempla plurima tibi Dioscorides sup-
peditabit; non pauca Galenus, & qui post
eum de materia medica scripserunt. V

Adde quòd vt tota substātia nobis ali-
mentum est familiare, sic plātis suū, quòd
fit, vt non omnis ferat omnia tellus, non

solum quia calidior, frigidior, humidior, siccior, aut per coniugationem, quam ipsius plantæ vel animalis naturæ conveniat: sed quia in ea alimentum plantæ & animali cognatum desideratur.

Nec tantum hæc in plantis totis, sed ipsarum partibus singulis sunt exploranda (ut idem de animalibus, & ipsorum partibus, & terreis corporibus tibi persuadeas) quales sunt radices, trunci, caules, culmi, festucae, rami, virgæ, surculi, germina, farramenta, viticulæ, adnata, capreoli, spinæ, cirri, pediculi, folia, flores, fructus, semina, siliquæ, vascula, capitula, calices, umbellæ, corymbi, comæ, apicæ, papi, ligna, cortices, succi, liquores, lacrymæ gummosæ, & resinosæ; & si quæ sunt eiusmodi.

Sexto & ultimo tempus in deligendo medicamento multiplex observandum est, ætas scilicet, pars anni qua collecta sunt & repōsita, aeris constitutio serena, pluviosa, ventosa: his viventibus aut repōsitis pars diei varia: duratio & servatio longa, brevis. Quæ alia tempus indicet diximus libro secundo nostræ methodi.

Virtus enim alia, ut & temperatura est neophytis & teneris: alia adultis & senescentibus, vis item alia euphorbio recēs collecto, atq; alia veterato. Plantæ item calidæ,

dæ, siccæ, si aër sit calidus, siccus, sunt meliores. Ob id plantas Italicas aromaticas Creticis nō cedere dicit Gale. si aëre non fuerint pluuio educatæ. In singulis ramen partes deligendæ sunt, omnium præstantissimæ, & maximè medicamentosæ, si his viribus egetur. Est enim quando ignobilioribus & imbecillioribus est opus, ob affectus ægri, aëris naturam. Præstantissimæ verò, tum ex prædictis cōditionibus, tum ex his quæ in singulis particulatim dicendæ sunt coniectantur, ratione eadem quæ in plātis dicta est, in animalibus quoq; & corporibus terreis seruata. De tēpore verò collectionis Dioscoridis verba hæc sunt: Imprimis curandū est, vt quæ in vsum reponenda sunt medicamēta, suis tēporibus singula demetantur. Ex hoc enim fit, vt quædā viribus magis valeant, alia sint inefficacia. Primū itaq; cælo sereno plantæ legantur. Magni enim refert inter colligendū, si vel squalores & siccitates, vel imbres infestēt, quæadmodum si loca quibus hæc pdeūt, sint mōtana, excelsa, pflata, frigida, sicca. In his enim locis vires habēt longè valētiores; cōtrā verò quæ in cāpestribus riguis, opacis, ceterisq; locis à vento silentibus, plerunq; degenerant, & minus valēt viribus, præsertim si nō suo tēpore legantur.

gantur, vel vitata, & præ imbecillitate languentia, ignoradum nanq; nõ est, multa p soli & cæli natura ac tēperie, citius aut tardius adolefcere: nõnulla vi ppr̃a, etiã hyeme frõdere & florere. Sciendum præterea est, quædã in herbaceis medicamentis, vt veratrũ vtrunq; multis edurare annis: alia post trimatum inutilia. Quæ verò herbæ sunt fruticose, vt stœchas, trixago, polium, abrotanũ, seriphium, absinthiũ, hyssopũ, & alia id genus, dum semine prægnãtia sunt, demetēda. Flores verò antequam sponte sua decidãt. Fructus autem dum maturi sunt, vt semina dũ siccari cœperunt, priusquã defluãt, herbarum & foliorũ succos elicies, cum primũ cauliculi germinãt. Lac & lachrymæ excipiuntur caule inciso per summũ adolescentiæ vigorem. Radices & liquamenta, corticēsq; ad recondendum eximãtur, cum primũ herbæ suis foliis exuuntur. Si puræ sunt & nitidæ, siccantur & reponantur loco non vliginoso: quæ autē terreno aut luto sunt sordidæ, aqua prius abluantur. Flores, & omnia iucundũ odorē reddentia, arculis niliaceis ædiũ parte siccissima reponantur. Est quando chartarum inuolucris & folliculis suis semina vtilius & innocētius seruãtar. Liquidis medicamentis densior

materia, argentea, vitrea, cornea cōuenit;
fictilis etiam, modò rara nō sit: & lignea,
præsertim è buxo: ænea verò vasa ocula-
ris medicamentis, & liquidis, & his om-
nibus quæ aceto, picē liquida, aut cœdria
componuntur. Adipem autem & medul-
las stanneis vasis, seu plumbo albo re-
condi cōuenit. Hæc Dioscorid.

Finē labori proposito imponemus, vbi
locū Mesuę, quo quēdā medicamēta pur-
gātia cælo & solo simili meliora euadere
scribit, sed sine exēplis explicauerim², sū-
pta ab animalib. analogia. Nā vt animalū
naturæ, hoc est temperaturæ, & ætates, &
morbi calidiores ad hyemē, regionē frigi-
dā, victus rationē refrigerantē, tanquā cō-
trario excessu frigido, illorū caliditatem,
immodicam corrigentia præsidia bene se
habent: ad æstatē verò, regionem calidā,
victum calefaciētem, ceu intemperaturā
augētes causas, malè: & cōtrā naturæ, æta-
tes, morbi frigidiores, ad æstatē calidam,
regionē, victum calefacientē, bene se ha-
bēt, quod ab his cōtrariis illorum à tem-
perato recessus corrigatur, malè verò ad
hyemem, regionem frigidā, victum refri-
geratē, tanquā affectus illos propter si-
militudinē aucturas causas, & simili ratio-
ne humidiora hæc ad causas siccātes & sic

ciora ad humectātes melius habēt: sic plānē in plātis apparet, quibus vt animalib. insitum est alimēto familiari nutriri, quibūsq; vt animalibus cōsuetā victus ratio naturā seruat, sic est victus illarum naturę similis, aut nouā facit, si dissimilis. Ob id plātæ intēperatiōes, id est calidiores, frigidiores, humidiores, sicciores, solo & cęlo, & alimēto ipsīs cōtrario emendātur, & ad temperaturā mediā, quoad fieri potest, inclināt: nisi quas multū calidas, frigidās, humidās, siccās experim^r: tales enim solum & cęlum, & alimētum simile cōseruant: mirum nī etiā intendāt. Quę verō animalium temperatura est omniū extremorū mediā, iniuriisq; omnibus omniū maximē resistit, illa similibus tēperatis seruatur, quod Gal. dilucidē lib. prioribus sanitatis tuendę demōstranit. Sic plātæ tēperatę cęlo & solo temperato cōseruatę, meliores euadunt, nisi ad effecta alia, has calidiores, frigidiores, humidiores, sicciores requiris. Tunc enim solo & cęlo dissimili, & à sua natura tēperatā diuerso, hoc est, calidiore, si calidiores vis: frigidiore, si frigidiores: humidiore, si humidiores: sicciorē, si sicciores expetis, emēdātur, & calidę siccę calido sicco solo & cęlo. Ob id Creticas plātas plurimas ad theriacā, &

ali

alia medicamenta, & Italicas si solum & celum sicca fuerint, præponit Gal. tamē in his est quodam prodire tenus, sed nō datur vltra. Nā eadē ex India aut Æthiopia fuerint deteriores, licet illi tractus plātas quasdā habeant eximias, vt Æthiopia cuminū, Trogloditæ myrrhā, India nardum & malabathrū, & alia plurima, quæ inde largo prouentu Lusitani navigationibus ad nos conuehunt. Quæ igitur ad methodū simplicia deligendi pertinent: vbi ex locis prius dictis memoria tenebis, eandē in particularibus ipsis exercere oportet, ordine illō, quē in simplicibus seruauimus. De radicū itaque delictu primū dicamus, in quibus vt aliis plātarū partibus, propterea quod nostrates cōmunem quandā deligendi rationē sustinēt, de his etiam cōmuniter scribemus: de exoticis verō singulatim, tum quæ sunt cariore, & ob id ab exteris adulterari solitæ; tum quod hæc, quia infrequentes magis, etiam exercitatos fallūt.

Radices autē omnes incipiente foliorum defluuiō legēdas, & celo sereno, cē sunt Dioscorides, cui in quibusdā Gal. & Auicē. & Mesuēs cōsentunt, in aliis diuersa sentiunt, vt post leges. Sunt contra quibus placet magis, radices esse legēdas.

Tēpus colligendi.

priusquā in caulem, folia, florē, fructum, semē, vis plantę propē tota erumpat. De-
fluentib. autē foliis, eas esse fœtis anima-
lib. similes, hoc est, velut semianimes ac
multū imbecillas, nisi si quę tantum ha-
beant viriū, vt etiā earum satis retineant
arefacto caule, vt scilla, quomodo valida
animalia etiā fœta adhuc robusta perma-
nēt: nisi dicas etiā in illis quę vicia & veto-
ri radice repullulant, saluā vitālę plantę
velut sanguinē p. caulē priusquā areseat
in radices, licet nō totū, refluere, vt in ar-
borib. fit. Alio quouis tēpore colligi pos-
sunt, quę hominū cultu & satione crebra
in omnem anni partem vegetę incidūt,
quales ferē sunt hortenses, alimentosę, vt
apij vulgaris, buglossi vtriusq;, betę, lactu-
tę, intibi, oxalidis, rhaphani, napi, pastina-
cę, sisari, cari, panacis, cæpe, porri, allij: &
pter has erraticę, dauci, gingidij, caucali-
dis, ari, dracūculi, cyclamini, periclyme-
ni, cotyledonis: nā hę quinq; vt bulbose
quędam alię, etiam æstate siccatis foliis,
plenę sunt, & frequenter autumnō reger-
minant, alimentū pinguis & crassę copia.
Quę verō solius naturę spōtē crescūt,
aut semel à nobis tempestiuē serūtur, aut
plantātur, ferē sunt optimę, solo aut vere,
aut (vt dixi) autūno, paucissimę æstate, aut
hyeme.

hyeme. Quin & hæ quas multis anni partibus. cōmunes dixim⁹, sunt præstatiores cū tēpestiuè satæ adoleuerūt, & vigent: aliis vero tēporibus ignauiores, quādo vt quādā & holioris opera & irrigatione coguntur adolere, sub cōlo sibi parū ppitio quale estiuū est, ac autūnale, & hyemale. Sic vere ipso, quādo primū germinare incipiūt, nobis legūtur in annū, enula, althea, iris, acorus, symphytū, rusc⁹, asparagus, petroselinū, apiū, fœniculū, bryonia, cyperus, rubia, saxifraga, valeriana, eryngiū, tormentilla, pæonia vtraq; , polypodiū, grāmen, silū: nisi recentibus aliquādo sit opus, sed quæ omnino erūt imbecilliores, q̄ si quo tēpore recētes colligi debēt, in vsum venissent. Omnes tñ integræ sunt, si fieri potest, vellēdē, & vnaqueque in solo & cōlo suæ naturæ familiari, quod experientia cōfirmat. Nam tūc bene habitæ sunt, nec enormes, ob alimēti copiam: nec strigosæ, & marcidæ & tennes, & rugosæ ob eiusdē inopiā. Mox aqua lauandæ sunt, & radiculae purgandæ, multæ etiā elignandæ: quēdā vero crassæ & magnæ etiā in taleolas secādē: posthæc siccādē in sole, v̄to, interdum igni, vt in siccatione lib. 2. dicem⁹, nisi recētes sint v̄tēdæ. Igni autē præcipuè siccātur, quādo cōelum est

nubilū, aut hyems, aut quando mox sicca-
tis opus est. Adde, quòd in his & alijs plā-
tarū partibus nō solūm tempus colligen-
di legitimū est obseruandum; quale mul-
tis radicibus est pleniluniū, natura humi
dissimum, sed etiā repositio commoda &
duratio. Nō enim sunt reponēdæ nisi ex-
quisitē siccatae, ne putrescāt: nec loco hu-
mido, puluerulēto, nō p̄flato, reponēdæ.

Radices supra tres annos nō seruātur
Auicēn. Quæ enim crassæ & densę substā-
tiæ sunt, tandiu seruari possunt, vt radix
bryoniæ, rha pontici, peucedani, mei, ari-
stolochiæ. Quæ verò tenui & rara cōstāt
substātia, vt asari, apij, petroselinī, saxifra-
giæ, dictamni, tormentillę quotānis sunt
mutandæ. Radices autē legēdas cum fo-
lia cadūt, etiam censet Auic. capone 2. &
Platearius in Aristolochia. Quædā tamē
alijs temporibus Saladino leguntur, vt ve-
ris fine, aut æstatis initio, acor^o, gētriana:
aut mēse Augusto quādo etiā spina alba,
vulgò bedegar, ruscus, bryonia, cyperus,
iris, enula cāpana, dictān^o vulgaris, pēo-
nia, glycyrrhiza, vt Septēbri peucedanū.
Octobri cyclaminus, recēs & siccus effi-
cax. Decēbri eryngium iisdē leguntur.

Efficaces autē illę quoq; seruantur an-
num vnum, pēonia utrāq;, peucedanum.

Duo

Duos, meum, iris, cyperus, maior & minor dictamnus.

Tres, acorus, chelidonium, enula, saxifragia, valeriana, pyrethrum.

Decem, costus, cenanthe, rha ponticum.

Daucus autē, asarum & alię radices multę recētes sunt meliores: recōdita autem

propē oīa, quę sunt essentię tenuis, parū diu seruat̃ur efficacia, p̃sertim puluerata.

Asari radix ampla, spissa, odore tenui, sapore acri, & parum astringente.

Eryngij radix eligenda ampla, alba, tenera, quę condiatur.

Radix satyrj plena & recens, non flaccida & emortua ad diasatyrion.

Exoticę verō radices sic deligantur.

Acori radix similis ireōs radici, id est, cōplicata in obliquū, geniculis intercepta,

cādida, gustu acri, & modicē amaro, odore incundo, calida, sicca ordine tertio, de-

sa, plena, carie non exesa, qualis à Colchide & Galatia affertur: quę à quibusdam

galanga maior vocatur, quōd sic vtraque crebro geniculata, & odore aromatico

sed hęc iridis magnitudine, illa cyperi.

Vulgaris acorus huic diuersissimus tota sua natura, nōṽsurpādus, nisi medicus ad refrigerandū & ficcandū imperauerit.

Quōd si qua huius gñis in locis ficiōri-

bus educata & calidioribus naturā acorū
 prædictā aliquid induerit, vtraque acorus
 esto, ille indicus, hic nostras imbecillior.
 Agaricus fœmininus rectis inus venarū
 discursib. cōstās, sapore initio dulci, mox
 amaro, tandē etiam subacti & subastin-
 gente, leuior, rarior, mollior, albi or, bre-
 uior, friabilior, splēdidior quā mas: in fra-
 cturis suis, filosis neruorū modō, grāuis,
 dēsus, durus, niger, lignosus, lōgus, inter-
 dū rotūdus, sed vbiq; compactior & ob-
 seuior, superficiei nō dēsa, sed rara tota,
 fœmininus præsertim, sede verō & radi-
 ce semiliginosa & semiputri. Gignitur
 in Agaria Satmatiae regione, & inde ap-
 pellatur: hodiē ex alpihus mittitur.

Hæc autē *iniqua*, id est, superficiei seu
 facies summa, seu cū Mesæ pars superior
 quauis tota vndiq; superficiei, intelligi
 possit, tamē quæ pro situ in arbore varior
 est, agarici pars superior, vti à Mesæ rectis-
 simè dicitur, ea potior videtur, qā magis
 aërea, & ob id leuior, rarior, &c. cū aëreū
 ob insitam leuitatē sursum feratur, vt in
 eodem terrenum & aqueū deorsum: siue
 autē ea pars superior sola, siue etiā tota ei
 superficiei optima est, nō est nobis purgā-
 tibus agaricū excidēda & abiciēda quo-
 rundā more. Nec ita superficiē ad vinum
 intellige,

intellige, vt sola velut cūticula sit vtilis; sed illæ partes quæ subsunt, quo ipsi optimæ sunt propiores, eo meliores.

Aristolochiæ clematidis longa radix nobis est perfréquēs; longa, rara, rotundæ vero in agro Nemausensi plurima, etiā hic crebrescit. Effodienda est messibus, & desquamato terreno seruanda. Legenda vtrāque plenilunio, vt alias propè oēs quidā contendunt: sic enim pleniōres cū sint, siccādo min⁹ flaccescūt, alio tēpore lectis magnā sui parte siccādo vaporātibus, & marcescētib⁹. Eligenda vtrāque bene habita, & si est sicca, minus altè rugis striata; carnenē multa, firma, odore & sapore regeto, sed suo, nō puluerulēta dū frāgitur, nec si ru obruta, nec carie aut teredinib⁹ exesa. Quæ bonitatis notę reliquis propè plātarū partib⁹ sunt cōmūnes. Pōtica autē & Cretica est præstātiōr. Behen accipiantur Armenia, calida, humida, odora, rubra potius q̃ alba: quæ verò hodie in Italia & Prouincia in odora reperiūtur radices, & pro behē supponūtur, vel alię sunt ab Armeniis, vel saltem his minus effecaces. Harum loco placerent magis radices eryngij. Behen rubrum folio lapathi rotundi propè Burdegalam locis aquosis plurimum, ac inde in alias Galliar partes

Dios. trāsportatur: albū in Prouincia crebrius.
Gal. Bryoniæ radix, foris cineritia, intus al-
 bicans, ampla, consummata, colligatur
 veris initio.

Calamus aromaticus, calidus, siccus or-
 dine secundo, partiū nonnihil tenuiū, ful-
 us, intus albicans, odore frāgrātissimo,
 dense geniculatus arūdinis modo, cetera
 mollis tactū, lētus in frangēdo, cōfractus
 autē in assulas dissilit, non totum rapha-
 ni modo rumpitur, fistula intus plena ara-
 neorum, casix gustu, leuiter astringēs, &
 cum quadā, sed minima acrimonia ama-

Hor. r², in mādēdo glutinosus, ex India defer-
Ma- tur, teredinib. facilē tentatur. Qui verō in
nardi. officinis est, nō calam², sed radix est, neq;
 ea calami, sed plantæ alterius: neq; ex In-
 dia videtur afferri, quia vili vēditur, & se-
 pē recens multū cernitur. Ob id inter ra-
 dices eū recensui, iustius inter ligna locā-
 dum: si verus habeatur, triēnio seruatur.

Diosc. Centaurij magni radix, acris, astringēs,
Gal. subdulcis, subamara, rubescēs, crassa, gra-
 nis, solida, tripedalis (si integrā est) succo
 pręgnans dū recēs est, ex solo pingui &
 aprico Licyæ, Peloponēsi, & aliarū multa-
 rum regionū, annos decem seruatur. Ra-
Ibidē. dix autem centaurij parui, medicamen-
 tis est inefficax.

Costus subamarus, modicè astringit, acer adeò & calidus vt vlceret, cādidus, leuis, eximia odoris gratia, recēs; abūdē plenus, dēsus, ficcus, à tere dinib. nō exesus, Arabicus. Post hūc Indicus, tertius in bonitatē Syriac⁹, grauis, colore buxus, odore feriēs. Hodie Lugduni frequēs est Arabicus, nō tamē. quē Arabici scriptores dulcē & amarum soli inuexerunt. Costi nigri mentio fit Diosc. in rha pontico.

Dracūcali radix legēda vere, aut estatis initio, ampla, cōpleta; ex loco libero, hāc etiā nostras est, rarò externa huc cōuehitur. Dictāni radix Diosc. calefacit, aliis foliā magis celebrātur calida, odorata, rotūda, parua, dēsa, lanugine vtrinq; innecta Cretica meretur aestate & autūno. Quē verò radix dictāni ab officinis supponitur alba, tenuis, elignata, ppē inodora, minimū amara, nullo exiguo ve caloris sensu: pseudodictāni fuerit potius, aut herbæ nescio cuius: qua abiecta, potius pulegio vtendum est. Doronicum, radix parua, fo-

*Mes.**iois**Sera-
pio.**Diosc.*

Elleborus albus radicib. nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & exiguo capite ex-euntib⁹, cōparū modò fibratis: optimæ sūt cādidę, friabiles, carnosę, mediocriter

extētē, nec iūci modo mucronatē, nec in
frangendo puluerē emittētes: suntq; me-
dulla tenui, gustu feruente, nec tamen id
vehementer, nec saluam subindē ciens.

Quę enim confertim eā contrahūt, stran-
gulāt. Laudantur ex montibus & asperis,
Cyrenaicę: Galaticę verō & Cappadoci-
cę & Italę sunt periculosiores. Omnis al-
bus est periculosus Mesue, nō item Grę-
cis autoribus. Eidem minus acer & mor-
dax, nec statim initio albus quā niger,
sed amarior est ac diūtius seruari potest
quā niger, cętera nigro similis.

Mes. Cortex radicū fibrosarum, asari colo-
re, fractu facilis, mediū crassi tenuis, an-
tiqui recētis, grāuis & levis, aut potius le-
uior q̄ grāuior, legitur vere & estate Mes.

Dios. Elleborus niger radicibus cohēret ni-
gris, tenuibus à capitulo cape simili, cōfi-
bratis, vt albus, quarum est vsus. Optimę
sunt corpulētę, plenę, in quibus sit tenuis
medulla, acres gustu, & feruētes, in colli-
bus asperis, & sitientib; locis, vt Anticyra,
Helicone, Patnaſo, Ætolia. Addit Mesues
fragiles, leuēs, asperitarisq; expertes, le-
uiōres quā grāuiores, tenuiū & crassa-
rum, recentium & vetularū medas. Sa-
lubrior est albo, colligitur vere & estate.

Mes. Esule minoris radicis cortex eligēdus
tenuis,

tenuis levis, fractu facilis, rubescēs cassiæ
fistulæ modo post sex à collectu mēses, ex
loco libero collecta initio veris. In fine
veris autem, lac eius colligendum est.

Galanga est radix subrūbra, vel rufa, ge-
niculata, intorrea, grauis, sapore acerrimo
linguā admodū vellicāte; calida sicca gra-
du tertio, odore & figura quādam cyperi.
Vnde q̄busdā cyper⁹ Babylonie⁹ dicitur
indicta priscis, alba, odoris & saporis gra-
tia carens Puluerabilis multū abiiciēda.

Gentiana notis tantum cōmūnibūs ni- *Actus*
tūtur, ex lura mōte in Gallias totas distri- *arius.*
buitur, colore foris buxco, intus crocāte, *Serap.*
amarissima (ob id alio Gallica dicitur) du-
ra, partū rugosa, frāgi cōtumax. In hortos
Parisiēses trāslata, min⁹ efficax adolescit.

Glycyrrhiza quāuis in Galliis passim du *Diosca*
xuriet, laudatur tamē Gal. magis Cretica,
aut saltē Hispanica, vel ex locis aliis mi-
nus humidis: colore est foris buxco, ligno
lento & fractu cōtumaci, intus multū cro-
ceo, sitimq; māsā exinguēte, sapore sub-
acerbo, dulci, q̄busdā melior est nigricās
& lēta, quā buxea & fragilis. Improbā-
tur int⁹ albavet nigra, exucea, vetus, fragi-
lis raphani modo, & inter frāgendū pul-
uerē edēs: quæ nota in omni parte plāte,
si præter naturā adest, vetustatem prodip.

Hermodaetylus Mesuæ pbatur radice
 rotunda, ampla, foris & intus multū alba,
 mediocriter durā, ex loco edito lecta, ca-
 lida & sicca initio gradus secū dilaxa ve-
 rō, rara, levis, est imbecilla: rubra & nigra
 mala. Quæ in officinis est, affirmatur mi-
 hi ab his qui legerūt frequēter in Gallia
 Narbonēsi & Prouincia, esse foliō nigro,
 porraceo, florē per autumnū croci, sine
 croco tamen, foris nigra radice: quæ res
 declarat esse colchicū, innoxium tamēn
 aut saltē innocētiū experimur: fortē q̃a
 siccatum est, nisi recens nobis vsurpatur.
 Iris Illyrica veteribus propē sola lauda-
 tur, parua, dēsa, frangi contumax, subrus-
 sa, intus albior, amara, sternutamenta dū
 rūdicitur ciens, odorata. Florētina tamen
 sola nobis hodie inculcatur, cū Gallica
 alba purgata laudetur Gal. lib. 8. c. ph. par.
 Ex locis apricis & siccioribus Illyridis le-
 cta ad me missa Venetiis à Marti. Greg.
 med. præstātissimo in horti mei partem
 editam, & solī meridiano apertā transla-
 tā, iam pulchrē repullulat. Mesuæ verō
 laudatur radix ampla, dura, dēsa, velut in
 nodos breues collecta, ex albo rubescēs
 odore violæ nigrae, aromatico sapore, a-
 cri & mordaci, florē purpureo potius
 quā albo, veris initio collecta.

Nardi

Nardi spica cum radice dodrātali, digiti parui crassitudine, astringēte, subacri & leuiter amara, odorata, calida primo excessu, sicca secūdo. Mihi Lugduno delata est à Ioāne Hornæo Parisiis Pharmacopœo lōge peritissimō, & fidissimō, latinē doctus. Grēcē & Hebraicē mediocriter instituto, cū costo, acoro, & aliis nō paucis.

Pyrethrū radice est lōga, pollicari cras *Dios.*
situdine, gustu feruidiss. & igneo, à quo nomē habet, quē māsapituitā largā elicit.

Polypodii radice dulci, austera, digiti *Dios.*
parui magnitudine, multū siccāte, sed si *Gal.*
ne morfu: p̄batur subdulce, subausterū, *Me-*
gustatu ad postremum subamaro, & nō *sues.*
nihil aromatico, solidum, cirrīs seu nodis plenū, ex rubro nigrescēs, colore int^r her-
baceo pistacij modo, recens, quercuū &
arborū aliarum glādiferaarū trūcis inna-
tū: aliis murale & saxosum magis proba-
tur, nisi loca sint vliginosa & vmbrosa.

Rha ponticū radix nigra, costo nigro fo- *Dios.*
ris, cētaureo magno intrus similis, sed mi-
nor, ruffior, fungosa & laxa, aliquantum
leuis, sine odore, quæ mansa colorē red-
dit pallidum, ad crocum inclinantem, te-
redinibus non exesa, Diosco. In quo prę-
ter hæc legit Serapio, astringens, si plu-
sculum mandatur, subacris, &c.

Rha indicū & proximum ipsi rha bar-

barum, laudatur subnigrum in rubrū in-
clinans, graue pro raritate sua: contra-
ctum, ex rufo & glauco alternat, & croci
modo tingit, recens, non adulteratum,
astringens, amarum, cholagogum, calidū
siccum ordine secūdo. seruatur annis tri-
bus, quatuor, in psyllio, milio vel obliuū
cera sola, vel ea cū terebinthina. Scilla
sit bonę magnitudinis (nō tamē admodū
magna & enormis) bene habita & nutri-
ta, alba, recēs ex terra sumpta, cū folia ei⁹
& caulis exacte aruerint, seu quādo triti-
cum metunt, quia tunc potiss. viget. Huic
pācratū simile gustu & viribus, sed imbe-
cillus. Mel præferitur, quę sapore est dul-
ci, acri, amaro, squāmis delibrata, splen-
dens, ex loco libero prope alias educata.

Turbith Arabibus laudatur, cortex al-
bus, gūmosus, lactis crassitie, vacuus, arū-
dinaceus, tractu facilis, recens, foris autē
cineritius & planus, ex locis siccioribus.

Zingiberis radix sit cādida, odorata, pi-
peris sapore & viribus nisi quod tardius
calefacit: sed diutius, ut longū piper. Dā-
natur teredinibus exesum, puluerulentū,
rectorio quouis circūlitum ad pondus &
magis ad excisionem regendam. Terram
meritā & columbinum, quod vocāt, male
zingiberis loco supponūt, quoties pulue-
re eius est opus: licet pondere, colore, &

Gal. li.
3. sim.

Ad-
sues.

reliqua natura radices sint diuersæ.

Zedoaria radix aristolochiæ rotundæ, æmula, sapore & colore zingiberis, calida, sicca gradu secundo, eadem Serapioni dicitur zurumbeth: sed zurumbet sine h, radix est diuersa.

HERBARVM DELECTVS.

HERBÆ ppè omnes sunt nostrates, quanquam harum quædã ex aliis regionibus sunt meliores, vt absinthiũ ponticum, chamædrys, chamæpirys, scordiũ, Cretica chamædrys cæpestris pon^o quàm suburbana, calamithem môtana melior quàm domestica: tamẽ si nostrum hoc solum & cælum habeant persimile externo, vires quoq; non ita dissimiles sortiãtur, qua ratione plãtas Italas Creticis non multũ cedere scribit Gal. si pluuium nõ fuerit cælum, & herbæ acres digerētẽsque, quæ humores prauos afflictis partib⁹ infixos vehementer digererẽt, ex siccis & maritimis locis eligãtur, in empl. *δια βερβερυ* initio lib. 6. compos. pharma. secund. genera.

Porro ex herbis plurimæ solũ virides in vsum recipiũtur, dum hę vel harũ succi in syropos coquũtur, & in apozemata, clysteres, forus, cataplasmata, & alia id gen^o, in quos vsus postremos quouis tẽpore leguntur: in syropos autem, vel formam
aliam

aliā toto anno seruandā sunt legēde, quādo sunt efficacissime, cū scilicet florēt, aut etiā semine iam plēnē sunt vt fumaria, calaminthe, & alię ex sequētib⁹, in syrupos, vel alia cōpōsita diu seruāda recipi solitē. Nā fumariam florētem veris initio, semine autē plenam veris fine legit Mesues.

Quōd si herbæ nec caulem, nec florē, nec semen edūt, vt adiantū omne, asplenū, legēdæ in foliorū vigore: quādo scilicet maxima & virētissima sunt, quēdā verō dū florēt, aut semētescūt, quia lignosæ sunt, & exuccæ, antē id tēpus in vsum trahūtur, vt beta, brassica, cichoriū, chōdilla, eupatoriū, lappatha, plātagines, verbascum, verbenaca. In quo virū vigore etiā sunt colligēde quę siccātur, & in vsus medicorū varios anno etiā toto seruātur, vt absinthium omne, adiātum omne nobis (quibus enim abūdat, virēs & vigēs vsurpatur) anethi coma; betonica, cardu⁹ benedictus, cichoriū, centauriū parū, calaminthe, mētha, chamēdiys, campepitys, eupatoriū, eufragia, fumaria, hyssopi coma, marrubiū, marorana, origanū, poliū, pulgiū rura, rosmaris, salvia (licet hæc duæ etiā sine floribus sint efficaces) scordium spleniū, thymum, thymbra, verbascū: aut salte cū vigēt folia magnitudine, odore,

*Ane-
thi &
hyssopi
coma
florulē
ta est.*

colo

colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora. Absinthium autem vere legit Mesues, ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine, vel etiam autumno. Eupatorium quoque legitur, & ex eo succus exprimitur in fine veris Mesue. Siccatur autem in umbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidior, & ob id apto putrescere. Vbi præbe sunt siccatæ, reponuntur, ut radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ.

Adiatum omne eligit Mesues bene habitum, virentibus foliis: quod autem gracile est immodicè, & folio flavescente examinatum est.

FLORVM DELECTVS.

FLORES ut plantarum partes reliquæ legantur cum maximè viget, cælo sereno: non autem ut Bulcasis & indocti alij scribunt hoc vel illo mense. Nam quibusdam regionibus & cæli constitutionibus celerius aut tardius plantarum partes perficiuntur: ut capparis in gema, rosa expandi coepta legatur, reliqui sese aperti: sed haud ita pridè, & ex quibusvis nodum exhalauit, nec folia tenuentur, & sunt decidua. Siccatur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura. Quidam siccandos volunt, donec ex poderibus decem unicum supersit,

minus autē ex mōtanis floribus quā ex
cāpestribus minuitur. Reponūtur vt alia,
quotannis mutātur, quamvis schœnāthū
etiam decēniū seruari possit: chamēme-
lum itē diu vegetum est, ob fortem par-
tium suarum mitionē. Quam viriū con-
stantiam etiam cum validus odor demō-
strat. Flores absinthij, chamædryos, cha-
mepityos, hyslopi, anethi, eustragiæ, fuma-
riæ, maioranæ, origani, torismarini, sal-
uiæ, thymi, verbasci in herbis ipsis cōme-
morati sunt, reliqui nunc dicentur.

Balaustiū flos syluestris punicæ, cytino
flore saruæ punicæ est astringentior, præ-
sertim quod ex acerbis punicis est. Vterq;
hic flos punicæ, est ab arbore auellendus
quo loco tunc granatum nullū gignetur.
Nā qui cecidit, sæpē id illi ob alimēti ino-
piam, auescente & protrudēte fructu cō-
ngit, aut ob vermiculum, aut aliam cau-
sam: ob id infirmior est, qualis agnosci-
tur facili: quia vna parte nigricat, folio-
rumque capillamentum ipsis non hæret,
vbi in eo quē auulseris, qui præterea in vni-
uerso ipso, vt foris, ruber. Hispana, rosæ
modo lara, & breuia præstantiora sunt
Narbonensibus longis, angustis.

Caryophyllum laudatur, fragi cōtumax
odoratū, ex plano tumidulū, recēs, quod

in quibus cōpressum humorem quēdam
 remittit, acre, & aromaticū, calidū siccum
 gradu secundo, aut etiam tertio; Annos
 quinque seruari potest, loco tēperato; nam
 in humidiorē putrescit, sicciorē arefcit, &
 rugosius euadit ac imbecillius, vt quod in
 eo est enormius, quod barbari antophyl-
 lum vocant, interpretanturq; ante folium
 natum, vt vox sit illis cōposita ex Latina
 præpositione, & Græco φύλλον folium.

Crocus Dios. optimus ad medicamēta, *Lib. I.
antid.*
 Corycius, recēs, oblongus, integer, ple-
 nus, non fragilis, flauissimus, & qui cum
 humore tritus suo colore manus saturer,
 nec fitū nec cariē redolens, subacer. Gal.
 autē Corycius, à Coryco antro in quo na-
 scitur, licet aliis sit procerior, nō tñ aliis
 robore odoris aut diuturnitate est prestā-
 tior. Eligēdus verò est nō procerior, sed
 odoratissimus & flauissimus, & longo tē-
 pore in vigore suo persistens. Præstantis-
 simū igitur aliquē crocū apto quodam
 ædiū loco repositū observa sæpe, vt per-
 noscas. Nam id colorem odoremq; pri-
 stinum diu seruabit: adulterati verò odor
 & color citò vanescit. Hæc Galenus.

Cētaurij parui flores ex pallido flauos
 initio æstatis legit Mesues. Nostrates au-
 tem sunt purpurascētes.

Epithymum Arabū seu thymi cassutha amplexi caulis, cum ramulis thymi lecta minus citò marcescit, & à thymo esse nō herbis aliis cogenerebus cernitur. Sic flores ceteros & fructus cum ramis legēdos Galenus docuit. Ex thymo autem montano est præstantius, quàm ex hortensi. Cretense rufum præfertur à Mesue.

Epithymū Græcorū qd reuera sit, nōdū planè compertum habemus, nisi sit flos satireiæ, Picardæ vulgo dictæ, perpetuò virentis. Hyslopus colligenda Mesuæ quando incipit florere.

Nymphææ flos tā albus ex stagnis, quā luteus ex fluuiis, verè legitur. cum apertus est, siccatūque luteus ob puritatem, integer, albus, conspurcatis aliquot externis foliis purgatus, & cauliculo capillamentisque crocatis. Luteus verò ferè hic in aquā etiā cū albo distillatur, rarò siccatus seruatus. Narbonenses alba sola vtuntur.

Rosæ sunt præstantissimæ quæ longè omnium suauissimæ sunt, & aliis rubicundiores, quales ex montanis, nō autē conuallib⁹ leguntur: siccandæ loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrēt, rosas tamen nō tangant. Nā albæ, incarnatæ, moschatæ, quāuis recetes odoratissimæ sint, tamen siccatæ sunt inodoræ: rubræ cōtrā

recen.

recētes parū odoris reddunt, siccatę iucū
 dissimum & diuturnissimum iaculātur. Ex
 agro mōtoso, petroso Pruini vrbis, vnius
 diei itinere à Parisiis dissitę in vniuersam
 propē Galliā omnium præstātissimę cō-
 ueniuntur, in territorio tamē Parisino nō
 insuaues præsertim vico cui fons Naia-
 dum nomē etiā vulgō est, larga manu lu-
 xuriāt fabulosis vinētis, quę Vrbi toti sa-
 tis esse possint, vt Pestanas & alias priscis
 celebratas rosas nō desideremus. Rubras
 admodū foliis paucis & planis præditas
 præfert Mesues. Rosę tardi⁹ collectę pa-
 rum diu seruātur, & citō nigrescunt, tem-
 pestiuē lectę biennio seruāntur: cum igitur
 mediocriter sunt apertę, mox integre
 insolentur, sæpē mouendę, deindē folia
 auulsa vase terreo claudātur, ne odor aut
 color pereat. Si quo die sunt lectę sol nō
 luceāt, rarę disponātur, ne se corrumpāt
 densatę. Similiter alij flores siccentur.

Schœnāthū seu schœnu anthos ex Ara-
 bja rarissimē huc ad nos trās fertur, sed ei⁹
 iūti tantū calami: si deferātur flores, solo
 odoratus vigore deligantur. Nā odoris il- *Gal. li.*
 lius gratia citō vanescit, Gal. lib. i. antidot. *l. An*

Stoechas etiā exotica est ex Creta enim
 habitior & melius nutrita, ob id melior,
 petitur. multa tamen nobis domestica ex

Infulis stœchadibus Massilię assidētib. ex
q̃b⁹ & nomē ipsa est sortita. Prouenit etiā
multa in Arabia, vnde Arabica cognomi-
natur, & à Mesue præfertur, flore præfer-
tim, post foliis: sit amara, modicē astrin-
gens: spica ex purpureo cœrulea, odorata.

Stœchas verò citrina seu flaua Dioscori-
dis heliochrysum, & Gal. amarāthus co-
ma floris aurea, dēsa, in Gallia Narbonēsi
& Aquitania, agro Burdegalēsi plurima &
præstantissima gignitur, odore abrotani
maris, & etiam sapore, sed minus amaro.

Mes.

Viola nigra, vulgo martia & quadrage-
simalis, à Mesue laudatur quæ prima flo-
ruit, neq; vim suā calore solis resolutam
perdidit, nec pluuia obrudit vel diluit &
dissipauit. Quæ iam diu apēta est, aut plu-
uiam sensit, aut in syluestribus nascitur,
odoris gratia caret, ac viribus.

Flores vix annū seruari possunt effica-
ces, præter chamæmelum, stœchadē, cro-
cū, & alios paucos, qui annis post duob⁹
aut trib⁹, coloris & odoris gratiā retinēt.

DE SEMINIBVS.

SEMEN à fructu quantum differat, abū-
dē in nostræ metho. lib. I. docuim⁹. Se-
minavērō deligātur matura omnia, bene
habita, plena, & corpulēta, & quæ naturę
sux vires p̃ptias habeāt efficacissimas, &
odo

odorē, saporē, colorē, sui generis p̄fectissi-
mū, si odoris, saporis est particeps. Multa
em̄ sunt inodora & insipida, nō modò se-
minū, sed aliarū quoq; partiū ḡna. Sūt p̄-
terea, si fieri potest, delata ex regionib. in
quibus celebratissima crescūt maiorū no-
strorū testimonio. Sūtq; recentia, aut his
proxima. Quæ enim diutissime fuerūt re-
posita semina, & alia, vires habēt imbecil-
liores. Vbi aut̄ pulvis ab ipsis diuidēdo, ex-
cidit, terminū excesserūt. lib. 4. alimētorū.

Amomū cādidum vel suluum, simplici
tamē colore, nō vario, laxius in vna parua,
seminis tamē plena, diffusum: nō astricti-
coherēs: sit p̄terea odoratū, nares vulne-
rans, acere, mordax, recens, non cariosum.

Amomū Scythicū laudatur lib. 8. com. phi

Ami Illyricū vel Ægyptium.

Anisum Creticum.

Cuminū Æthiopicū, deinde Ægyptiū.

Ligusticum ex Ligusticis alpibus, vnde
illi nomen.

Seseli Massiliēse, alterum Æthiopicum,
tertium Creticum Dioscoridi laudatur.

Sinapi Alexandrinum.

Thlaspi Cappadociū vel Creticum, sed
maius & minus rotundum est p̄stantius
Galeno. Vtrūq; nobis est, à Bursa pasto-
ris herba frigida astringente, diuersum.

Diosc.

Cardamomū eligi debet frangenti cō-
tumax, occlusum, plenū, fartūmq; : gustu
acre, amarūmq; , odore caput tentans, ex-
calfaciens: quod tale nō est, exoletū iudi-
catur: Hęc Diosc. Nigrum passim cogno-
minatur Galeno, Nasturcio minus cali-
dū, sed suavius & fragratius eidē dicitur.
An verō semē quod hodie noster Ioānes
Horneus Lugduno aduexit, minus & pla-
nius grano paradisi, colōre & sapore ppē
eodē, in siliqua breui triquetraq; largissi-
mum, sit verum cardamomum, affirmare
nō ausim ob historię ipsius obscurā bre-
uitatē: tamen tum ipsum, tum granum pa-
radisi, & quod cardamomum minus vo-
cant, proferunt officinæ, semina sunt non
indigna recipi in antidota, ob virium in
ipsis aromaticarum excellentiam.

Cnici semen sit amplum, plenum, me-
dulla pingui, albū, angulosum, leue Mes.
Psyllium elegit Mesues, absolutum, am-
plum, tam graue, vt aqua mergatur.

FRUCTIVVM DELECTVS.

EX fructibus quanquam nō pauci no-
strates in medicamenta recipiuntur:
quia tamen externi quidā præstantiores
habentur, ipsorum quoq; bonitatis notas
paucis attingere fuerit operæpretium.

Amygdalę tā dulces quàm amaræ, pro-
ban

bantur flauissimæ, plenę, integræ, nō con-
fractæ, nec erosæ, tñ leues, duræ & siccæ;
quātum illis datū est, ob id fragiles, intūs
albissimæ. Ex his dulces, sapore delicatæ,
propè indicibili in castaneam tostā, & pa-
nis purissimi bene cocti qualitatem incli-
nātes, odore ante esum nullo, aut perquā
exiguo, inter edendum autem iucundo.

Improbātur albescentes, nigrescentes,
rugosæ, molles, tortiles, fractu contuma-
ces, & quæ fractę à cādore illo ad pallorē
recesserūt, aut nigrorē, oleosæ natura aut
vetustate, odore rancido, sapore ingrato
aut oleagino: quę omnibus vetustas af-
fert. Ex quibus tritus etiā si plus olei ex-
primatur, tamē olei amygdalini probatis-
simi dotes nō assequitur, quod ex priori-
bus extrahatur, excorticatis cultello po-
tius q̃ aquā calidā, vt in oleis dicemus.

Anacardus, seu cum Paulo & Actuārio a-
nacadion, sit plenior & habilior, fuscus,
resina in cortice multa, acri, nigra, nucleo
intus albo: quo in melle cocto fit mel a-
nacardinū. Hoc etiā ruso potest oleū ex-
primi, sed lōgè diuersum ab eo quod co-
ctis in aqua corticibus supernatat, & cō-
chis colligitur ad cōfectionē anacardinā.

Myrobalani citrinæ sint flauæ, multū in *Mes.*
viride inclinātes, dense, graues, in fractu-

ris gummosæ, amplæ, cortice crasso, den-
so, os paruum complectente.

Ibidem Cæpulæ amplæ sint, & quo maiores eo me-
liores, subnigræ, in rubrū inclinâtes, gra-
ues, ob id in aquâ prôptæ mergi, cortice

Ibidem crasso. Indæ sint nigræ, magnæ, graues,
substâtiâ densa, sine ossibus. A quibus cõ-
ditionibus quâto longius abscedunt, tan-

Ibidem to sunt deteriores. Emblicæ magnæ, gra-
ues, carne multa, densa, ossib⁹ exiguis: ra-
ta verò carne quæ sunt, spiritu & vigore

Ibidem carent. Bellericæ, magnæ, graues, carne
multa & densa. Notæ igitur in his com-
munes aliorum fructuū & præcipuæ sunt,
vt sint bene habitæ, & corpulentæ, carne
multa & firma, ac densa, & ob id osse exi-
guo, quibus os datum est. Nam indæ sunt
exosses. Quæ verò notæ aliæ à colore du-
cuntur, & ossis figura, minoris sint momẽ-
ti. Balanus myrepica sit ampla, vetus,
cortice læui, tenui, pleno, medulla læui,
pingui. Parua verò ex albo nigricans, ve-
tus, plena medulla alba, læui, pingui, est
innocëtior. Conij seu strobili vulgò pi-
neoli, pleni, recentes, albi, sicci, quatenus
illis datum est. Vitentur flauī, aut etiã pal-
lidi, oleosi, rancidi. Id quod his citò, vt fẽ-
rè sexto mense accidit, nisi prius saccha-
ro intincti hoc vitium effugiant: præfer-

tim si prius ex surfare frigrantur, & sic probe siccentur: deinde cribro purgentur, quod remedium est aliis quoque seminibus condiendis, ne aut citra condituram, aut etiam condita ranceſcant.

Cupressi pillulæ, vulgò nuces, sint perfectæ, recentes, ob id molles, seminis plenæ, etiam in ipsis hiatibus.

Cydonia seu cotonia sint bene habita, flauescencia, odorata, matura cum minus astringendum & refrigerandum est: cum verò magis, ante maturitatem colligantur.

Eadem ratio est struthiorum, quæ nos cydonia feminina vocamus, aliis maiora, minus acerba, carnosiora.

Citrium & arantiū malū, & quæ vulgus limonē vocat, sint magnitudine quodq; in suo genere mediocri, odore valido & iucundo, cuiq; suo cortice tenui, raro: colore in limone pallido, in citro flauo, in arancio rubescēte: quāuis & arancia viridia etiā per maturitatem inueniantur: carne intus multa, firma, & succo odorato, acido, interdum dulci, est quādo ex vtriusq; misto.

Colocynthidis medulla cortice ablato *Gal.* sit pilæ mediocris in specie cōglomerata, vehemēter amara, matura, ampla, rara, ob id levis: & quāto leuior, tāto melior: alba, admodum levis, eadē femina, autumnō
legem

legenda cum flavescit abeūte iam virore.

Mes.

Cacumeris agrestis fructus præfertur absolutus & maturus, & virore deposito flavus, amarus. Ex quo succus albus, subpinguis, Elateriū dictū, quomodo sine valenti compressione extrahatur, docet Diosc.

Diosc.

Carpobalsamum sit flavum, plenum, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, modicè opobalsamum redolens.

Mes.

Cassia fistula, seu nigra, seu cathartica, id est, purgatrix, eligatur foris & intus nigra, ampla, collucēs, grauis, plenior & quæ concussa clausis intus granis non strepat: pulpa intus pingui, splendente, succulēta, non situlenta. nec putri: sapore prunorum: delicato: calida humida primo gradu. Vtendi tantū tempore extrahenda: nam extra cannas, vt semen, sanguis, lac, extra propria conceptacula, promptè corrumpitur, & in vasis seruata peior euadit.

Act.

Cubebæ sint corpulente, plenæ, graues, acres, minus tamen quàm piper, subamaræ, admodum aromaticæ, subdulcēs, annis decem seruantur.

Coccum gnidium ex thymelæa eligendum, cui folia magna, tenuia sint, quæ in locis liberis, crescit prope alias multas thymelæas, foliorum vsum celebrat Mōsues, non granorum.

Dact.

Dactyli nobis, vt Græcis vulgaribus hodie dicuntur, fructus palmæ, à digiti figura. Probantur magni, flauī, parū rugosi, molles, pleni tñ, & carne intus multa, subdura, ad nucleū candicāte, ad corticē rubescēte, non pertusi, nō vermiculosi, & qui cōcussu nihil aut minimum sonent, sapore vinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri, quia excarnes, excusso pediculo pertusi: iidem ferē vermiculis scatentes.

Ficus passæ seu caricæ habentur præstantissimæ, quæ in calathis spartaceo digitis, aut pugnis vtrinque pressæ, sic illis mollicie sua cedunt, vt murus partium dictarum motus sibi propē occurrentes sentias: odore sunt iucūdo, nō calorem putredinosum, aut vermiculosum referēte.

Hæ verò si particulatim explorētur, pediculo sunt breuissimo, colore in cādīdū vergente, molles, tractatū facilē cedēres, cute tenui, molli, succo intus & semine flauo, & planē mellēo sapore, odore ante esum & inter edendū iucūdo, graues, paruæ. Si Massiliotides (quæ etiā saporis gratia ceteras lōgē antecellunt, siue albicātes tantū sint, siue intus & foris albæ, sed flauo semine) maximæ: si externæ sint, quales Hispania mittit musto mersas, vt dulciores sint, post nē coherescat farina asperfas.

Vlt

Vitiosæ sunt duræ, tū in massa, tum per se singulæ, vermiculosæ, graueolentes, foris nigrae, intus rubentes, vel alio præter naturā colore præditæ, cortice crasso, duro, sicco, intus alieno colore, odore, sapore. Quædam tamen sunt nigrae Prouincijs & Narbonensibus dictæ, foris nigrae, intus ruberrimæ, omnium delicatissimæ dum recentes sunt: nam siccatae liquescunt, aliæ eisdem cineritiæ, aquosiores quàm vt siccati possint: hominibus ingratae, auib. expetita.

Galla omphacitis, id est immatura, laudatur parua, seu magnitudine mediocri, nodosa, grauis, solida, nō pforata: minus vilis, magna, rotundissima, polita, leuis, laxa, perforata, flaua, aut saltē rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert ros marinas vulgo dictas, omniū minimas, graues, solidas, asperas, pretiosissimas.

Iuibæ zizipha vel zinzipha Græcis dictæ laudatur recētes, ample, oblongæ, passæ, tamē tensæ, carnē intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosæ: plene, graues, sapore dulci & delicato: nucleo paruo, foris rufo ac verius rubētes, int^o pallidæ aut albescētes. (Nam foris albæ nobis nōdum visæ) esse prunorū rotundiorē, paruo intus nucleo, dulci. Improbantur yctustate nigri-

cantes, leues, sicca, puluerulenta, friabiles, ex carnes.

Myxa, myxa, & myxaria, vulgò sebesten, à muccoso lentore, quo abundant dicta, prædictis affines, sed dimidio minores, acuminatæ, parum rugosæ, graues, nigre, carne multa ex rubro nigricante. firmiore, glutinosa, dulci & subacida, osse prunorum Damascenorum inæquali, nucleo intus exiguo, dulci.

Malum punicum cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, graue, maturum, granis intus rubris, vel roseis, succo prægnantibus vinoso plenissimum.

Myrti bacce recentes, plenæ, succulentæ, odoratæ, grandes & bene nutritæ.

Nuces auellanae præferuntur ligno solido, non petroso, rubente, rotundo: corpulentæ, graues, nucleo intus si concutiantur sonante: si fracta nuce gustetur, gratissimo, & sapore castaneam referente: foris flauo, intus albicantæ, pleno, duro.

His proxime sunt, francae vulgò dictæ, hoc est legitimæ, oblongæ, ligno similis, cute intus nucleum vestiente rubentissima, carne dura & firma, rubente. Infirmae sunt syluestres, ligno & nucleo candicante. Improbantur leues, perforatæ, quia vermiculosæ, vetustate oleaginæ, rugoso nucleo

nucleo & exucco.

Nux moschata sit grauis, oleosa, odorata. Nux indica aqua intus dulcē habet, si recēs est. Quę quidem vtendā, nō cortex.

Oliuæ halmadēs, seu colymbadēs, quę in sua muria cōditę innātant, pręstantiores sunt, magnę, ouales figura, pallidę aut rufę, plenę, solidę, carne multa, densa, subamara & subdulci: osse intus paruo, longo, nucleum delicatissimum cōplexo. Quę verò enormes aduehuntur, acuminatę, carne multò largiore, sapore sunt minus delicato, vt armeniaca. Insita non insitis corpulentiora multò sunt, sed saporis iucunditate multò inferiora.

Gal.

Oxyacāthes & rhois, & scribes vna legēda matura, plenior, acinis paucis bene nutritis potius q̄ densis, & paruis, & strigosis.

Piper longum sit, corpulētum, integrū, recēs, linguam tardē, sed diu cōmordens. improbatur perforatum, vel adulteratum.

Mes.

Piper album ex hoc productum acius longo, & nigro: maximum, plenissimum, graue, non rugosum.

Piper nigrū, alio maius, cortice tenuiore, & minus rugoso, graue admodum.

Pistacia fiat recentia, nucleo intus herbaceo, sapore iucundo.

Thamar indi pręferuntur subnigri, seu
fu

fusci, lucidi, molles, recētes, pingues ceu villis quibusdam; & radiculis intertexti, dulcissimi, seu ex dulcibus acidi, & vinoso sapore. Improbantur sicci, carne prunorum adulterati: in quibus nigredo est obscura, & prunorum odor & sapor.

Pruna passa, vel acida sunt, vel dulcia: utraque sunt ampla & plana: carne intus multa, succulenta, firma: osse exiguo, foris vel melle aërio incrustata; vel nigra, sed citra abluitionem: non rancida, nec situlenta, nec puluerulenta.

Damascena & armenia magis ad aluū subducēdā, & dulcia alia humidaq; sunt eligēda Mesuæ q̃ acida, vel horū media. Sēna folliculo (cuius præcipuus est vsus) sit subnigro, in viride inclinante, modicè amaro & astringēte, à natura cōpleto, recēti, semine intus amplo compressioque. Deterior est subalbus, nondum iustæ magnitudinis, aut maturitatis. Folia secūdu tenent locum si viridia sint, & plena, non subalba, aut tenuia: surculi inutiles purgationi, ob id abiiciēdi. Mirū est hodie tam oblitos sui & Mesuæ pharmacopolas, ut folia pluris & faciant & vendāt quā folliculos. Nostras verò hortensis senna inefficacior est orientali, ut vocant, tamen non inutilis vsu quotidiano exploratur.

Mesuæ

¶ Vuae passæ, pingues, carnosæ, cortice tenui sunt præstantiores libro 2. alimentorum. nobis sunt Damascenæ, Corinthiæ, vulgares.

¶ Damascenæ sunt deligendæ ample, fulvæ, transparentes, carnosæ, seminibus paucis, parvis, sapore vinoso.

¶ Corinthiæ omnium minimæ sine seminibus, colore purpurascente, sapore delicatissimo, raræ, & pretiosissimæ.

¶ Vulgares huc afferuntur, vel ex Provincia capsulis abletinis, vel ex Hispania calathis spartaceis. Provinciales omnium post dicta duo genera, Damascenas intelligo & Corinthias, præstantissimæ, præsertim quæ prunellatæ vulgo indigenis vocantur, opinor quoddacino sint pruni æmulo; hoc est nigro, sed quem ros cæruleus intexit. Non incelebres fulvæ, Picardatæ iisdem dictæ, Damascenis toto habitu proximæ, nisi minores essent, & carne parcior, minusque solida. Ambæ in palmitibus sicantur intorto pediculo: hæ si pinguescant immodicè, & ob id digitis hæreant, farina aspersa vitium indigenæ regunt. Qui dolus est frequentissimus in Hispanis omnium ignobilissimis. Quas enim habet Hispania optimas sibi servat, viles in alias Septentrionis regiones transmittit.

Delectus

DELECTVS LIGNORVM.

Dios.

A Gallochum lignum, sit maculatum, odoratum, gustu astringēs, & subamarum, cute verius quā cortice aliquātum versicolore, halitum mansu cōmendans, suffumētis expetitur thuris vice, eīusque modo in igne liquefcens, sed tardius, & aquæ iniectum mōx subsideat, & bullulas edat. Xylaloē dicitur Aëtio & Actuatio, id est lignum aloēs arboris, non herbæ, cuius tamen succum nigredine & amaritudine pauca, & succo intus gūmoso nonnihil representat: vnde opinor illi nomen hoc accessit. Crudum vbiq̃ Mesues requirit: quod enim à quibuscūq̃ coctum est excipiendi odoris gratia, vim amisit. Quod verò ostendunt officinæ, verius est aspalathum: quod si optimum sit, graue & detractō cortice, rubens aut purpascens, densum, odoratū, gustatu amarum: alterum deterius candidum, lignosum, inodorum. Sunt tamen qui eius loco elix arboris matricem substituunt. Lignum Galaci, siue ebeni species est, ut mihi videtur, quia ebenum toto habitu & viribus à Galeno scriptis refert, siue aliud lignum sit, eligatur colore fuscum & flauum, cortice ipsi ligno sitmiter hærente, densum, graue, bene habitum ex

Dios.

arbore ætatis mediæ, si potest recentissimū (quo enim recentius, eo est succulentius & vegetius) aut alioqui gūmosum. ac in eo nō excorticato rami mediocres præferūtur, si verò vetustus est truncus, (modo nō sit putris aut cariosus, vel aliter vitiatus, ut sæpe videmus) quia ob crassitiē & duritiem dissolutioni suī magis resistit, pinguior manet quā rami: cortex verò ficcior. Contrā verò recētis cortex internus pinguior, & succulentus magis, quia alimēti plantæ vehiculum ferē fuit. Eligatur itē sapore dulci, amaro, acri, ex insula meridiana S. Ioannis, temperata, irrigua, resinofius: ex insula autem S. Domini in zona torrida, aridius.

Palus S. quibusdam videtur ramus gaciaci, cui lignosarum fibrarum implexu vario, matrice nigra hodie in ebeni locum substitui solita, viribus deniq; proximus est, sed valentior si recens est: imbecillior verò & ob tenuitatem citius exiccatus, si vetus, ut in aliarum plantarum ramis, & præcipuē surculis. Aliis diuersus videtur quod albescat magis suo cortice, & aliis quibusdam de causis. Iudicium his permitto, qui arbores ipsas cædunt, viribus certē ambo sunt proxima.

Santalum citrinum, optimum, & maximum

mè aromaticum, sed inuentu rarum etiam Plateario.

Album pessimum, rubrum medium bonitate est: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo. Quæ tamen sunt in officinis, acri sapore linguam mordent, præsertim cirinum, ob id non vtenda.

Xylobalsamum probatur recens, samento tenui, fuluum, odoratum, opobalsamum nonnihil spirans. *Dios.*

Calamus aromaticus, quem officinæ ostendunt, radix videtur & rei alterius quàm calami, tamē viribus proximis polere odor & sapor indicat: subalbus, odore & sapore aromatico, non puluerulentus inter frangendum. triennio seruetur.

CORTICVM DELECTVS.

Cinamonum deligatur tenuium partium, odoratissimū, seu indicibili quadam suauissimi odoris gratia, super alia omnia præditū, gustatu acre, & valde mordax, admodūq; calidū, nō tamen adeo vt molestē rodat, mansum verò rursū olere videtur, color illi est lacteus, cū giluo & cyaneo mixtus, seu cineritius, virgulis gracilibus, nodis frequentibus, læue, confringi facile. Leptocinamomū. i. tenue cinamomū pro optimo vocatur Actuário. Quod verò cannellā vocamus, vel casia

*Gal. lo-
cus va-
rius.*

est, vel pseudoëinamomum, quanquam principum cinamomorū sex ipsi sint differentiae generales. ad nos triginta seruatum sit imbecillius, nec putes diutius seruari posse integris viribus, toto habitu corticisque tenuitate.

Casia quo cinamomo est similior, ac odore & gustu propior, eò est præstatioꝛ. Est autem rufa, rosam expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens, & aromaticum modo vehementer odora, vnde casia syrix, id est fistulosa & casia syrix fistula sæpe apud Gal. dicitur. à purgatrice & Ægyptiā res diuersa, vt prius in fructibus admonui. illa corticem exteriorē, quem & fistulam dicunt, odoratu & gustatu valentem habet: quod autem intus est maximè imbecillū, ob id inutile.

Macis sit rufum aut flauū, aromaticū, odore suauī, sapore subacri, & minimū amaro: quoq; recentius & succulentius, eò melius, ne putes cum quibusdā annos decē efficax seruari. Succ^o ex hoc expressus gūmi hæderæ figura, q̄ ipsum macis est valentius. Macer hodie desideratur. Tamaricis cortex sit verus ex Gallia Narbonensi potius q̄ ex fonte bellæ aquæ paradiso regia prope Melodunū. Hic cū sit nostras & passim luxuriet, vel lippis & t^o soribus

forib. not⁹ est, vt cortex radicis cappar^{is}.

Thuris cortex fit crassus, pinguis, odoratus, recēs, læuis, non scaber, sine membranis: adulteratur misto cortice pini aut nucis pineæ: sed hi sine odore fumāt, nō incenduntur, sed thuris cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem iaculatur, ferē in glebis thuris mist⁹ inuenitur.

SYCCORVM DELECTVS.

Oleum ex oliuis maturis expressum colore rufō, purum, perlucidum, tenuē, odore exiguo sed grato, sapore dulci, subacri, & iudicibili, ecēs, aut non ita vetustū, nisi vetusto egeatur. In quo trigenziū trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimo valētius, vbiq; crassius, graucolentius, calidius, acrius.

Oleum virgo quod vocatur, est præstissimum: paucum fit, ob id pretiosum.

Oleum omphacinū ex immaturis oliuis expressum ad viride inclinat, recēs fit odoratū, morsus expers, sapore acerbū. Huius penuria ablutum capiendum est. Vinum deligitur varium pro scopis medicorum variis. Colore autem, odore, sapore, consistentia ferē probatur.

Azetum album, tenuius, ob id valētius nigro & medio, præferunt si æquē sit acre & vetustum.

Mel sit Mel optimum sit purum adeò, vt totū
vernū perluceat, odorū, flauū, acerrimum, dul-
ant esti cissimūq; gustanti, & iucūdisimū: cōsi-
nū non stentia nec crassa nec liquida, sed tā sibi
hyber- cohærēs, vt continuitatē suā quasi linea
num. lōgissima nō intercisum seruet, si digito
Auic. attollitur. Idē coquendo paucam spumā
 emittit, nec thymum immodicē olet.

Albū etiam colore si fuerit, modo no-
 tarū bonitatis aliarum nulla desit, nihilò
 deterius fuerit. Quin Hispani & Narbo-
 nēses mittūt albissimū, & longē præstā-
 tissimum, idemq; prædurū, quale etiam
 flauū hic præferūt liquido: quippe quod
 humore aliquo est vitiatum.

Mes. Aëromeli autem, id est, mel aërium seu
 māna Arabibus dicta, siue liquida sit, siue
 granulosa, eligatur alba, recēs, dulcis, pu-
 ra, & excrementorū, quoad licet, expers
 ex plantis odoratis & homini salubrib.
 collecta, qualis laricea hodie probatur,
 anno seruetur. Sola ppē granulosa in usu
 est, liquida, inuentū rara, quæ in lapides
 incidit deterior, & hac peior cineritia:
 pessima fusca, cœnosa, antiqua, saccharo
 & folliculis sēnæ adulterata: sed hæc tē-
 pore mollescit, & lique scit, dolūq; p̄dit.
 Cera sit flauissima, odorata, pinguis, co-
 acta, leuis, pura, & aliena omni materia
 carens.

carens. Maurica tingendis flauo colore aliis quanquam nigricat, expetitur: alba, vel natura, vel ablutione fit: viridis mista æruginē: rubea immissa anchusæ radice, cinnabrio tamen sæpe tingitur.

Saccharum est præstantissimum, quod durum, solidum, & mutuo metarū allisu sonorum est, ligni ficci & solidi modo, tamen ob siccitatē & imperceptam raritatē leue, dulcissimū, candidissimū, & niuis in morē scintillans, coherens, quale Valentinū in metas pyramydū æmulas (panes vocant) coactum, paruas ponderis libræ vnius & dimidię, vel circiter: carissimum, & confecturis siccis aptissimum, penidiis ob siccitatem nimis friabilem, ineptum.

Illi donibus istis & pretio est proximum quod Madere appellāt, sed in metas ponderis librarum. 6. 7. 8. 9. decem formatur, confecturis expetitur, quia minus preciosum, non multo tamen imperfectius.

Tertium statuitur lentile, album quidem sed pinguius, ob id vilius neque cōfecturis siccis aptū, sed penidiis idoneū.

Quartum ex Canariis nunc dictis insulis, olim Fortunatis, aduehitur, etiā intus albicans, bonitate inferius prædictis, præstantius sequenti, metis constat maximis, pondere lib. 10. 12.

Quintum ignobilissimū S. Audomari dictum, foris albidum, intus subrubrum, tanquam alio factū, & foris dolo rectum, metis æqualibus, omnium glutinosissimum, condituris siccis ineptissimū, liquidis seruit & syrups, opiatis, confervis, & similibus, quia vilissimum, & vilitatē tegit aliorū mistura. Id si mare seruit (nam eo naues ob gravitatē saburrant) rubrum vulgō dictum sit, quāquam sunt qui rubrum spumam & spurciā omnis sacchari se coquendo purgantis existimant. Ex micis horum collisu elisis etiā metas hic quidam cogūt, quæ simplicium naturam sequuntur. Ex his quod generosissimum minimam coctionem sustinet ne puluerescat, ignobilissimum contrā cetera pro accessu, aut recessu variant.

Dios.
Mes.

Acacia nostras, modo non putruerit, aut situlenta evaserit, bona adhuc fuerit vetusta, nisi recentem medicus exigit ob scopum aliquem. Aloë optima sit pinguis, glutinosa, friabilis digitis, facile liquescens, ex rubro rufa hepatis modo, coacta & intus foueata, proinde minus gravis, bono odore, myrrham emulante, licet planta tota odore sit recte, eximie amaritudinis, sincera, nitida, transparent, arenularum & calculorum expers, qua-

lis

lis est indica. Adulteratur Mesuæ & aliis,
& notas istas non habet.

Elateriū, & Glaucium & Lycium si ha-
bebuntur, notas ex Dioscoride require.

Glycyrrizæ succus ex Creta optimus,
hoc est, dulcissimus, mollis, recens, purus,
tenax, & qui contractus splendescat, ni-
gerrimus, & qui linguæ subditus tapdē
totus eliqueſcat.

Hypocisthis licet quædam flaua, alia vi-
rens, alia cādida Dioscoridi dicatur, ante
præparationem intelligitur. In offas enim
conformata est nigra, lenta, sapore astrin-
gente, odore non ingrato.

Diosc.

Ladanum probatur odoratum, subuiri-
de, facile mollescens, pingue, resinofum,
quod arenas non collegit, nec squalore
oblitum est, quale Cyprium; sed Arabicū
& Lybicum est vilius.

LIQVORVM DELECTVS.

Opus est liquor ex planta vulnerata,
rerebrata, scarificata, castrata, spon-
tè defluens, sed suavi gustu.

Opus Cyrenaicus sit acer, mordax, mo-
dicè rufus, nō porraceo colore, trāsflucēs,
myrrhæ æmulus, odoratus, & qui dilutus
cito albescat. Ex Taprobana insula in ma-
ri Indico maxima hodie à Lusitanis con-
uehitur, belzoe indigenis dictus, & nobis
inde

inde belzoin. (Nam indicus etiā Mesu æ laudatur) corruptius bēcoin. Assa aromatica & odorata, quibus corruptè etiam dicitur, nomine à lasere herba detorto, à qua plāta hic liquor defluit, vt etiam assa fœtida à lasere Parthico & Persico, & cū Mesue à Medico & Syriaco, cuius liquor virus & putrilaginem olet Dioscoridi.

Dios.

Opiū dictū, quod nigri *μῆκων* ♂, id est, papaueris, sit opos, id est, liquor, vt meconiu eiusdē succus laudabatur olim Thebaicū & Hispanum, nūc Apulum in vsu esse frequentiore audio. Opium habetur optimū, graue, dēsum, gustu amarū, odoratu, soporiferum, quod faciliè aqua diluitur, læue, cādīdum, neq; asperum, neq; glutinosum, quōdq; inter colandū nō vt cætera coëat, & in sole diffundatur, deinde admotum lucernis nō atra luceat flāma, extinctum deniq; odoris vim seruet.

*Dios.
Me-
sues.*

Opo balsamum probatur recens, validi odoris, sincerum, nō ad acorē vetgens, dilui facile, læue, astringens, mordens gustu modicè, in lancam vestē effusum nec maculam facit, nec si eluatur notā relinquit, lac coagulāt, in aqua, aut lacte celestrimē liquatur, & colore lactescit. Idē senescens crassescit, deteriusq; habetur Diosc.

Opopanax, id est, panacis heraclij radicis

cis incisæ, vel caulis liquor, candidus, dū
 recēs est, dum aruit, colore foris croceo,
 aut subflauo, intus cādido, odore graui,
 seu cum Mesue odore bono, sed succo
 amarissimus, læuis, pinguis, friabilis, te- *Diosc.*
 ner, facilè in aqua liquefcens. Damnatur *Gal.*
 niger admodum, & mollis.

Euphorbium sit lacteum, causticum, &
 vrens, tenuium partiū, vel orobi magnitu-
 dine, farco collē modo emicās, vel in ouil-
 lis aut hēdinis vētriculis exceptum & cō-
 cretum, vitreū, translucens, acre, recēs, al-
 bissimum, vbi calorem multo & igneo ege-
 tur: vbi modico, luteum & vetus. Recens
 enim albius est, & calidius, & leui gustatu
 os accēsū diutius sic tenet, vt cætera gu-
 stata euphorbiū respiciant. Color autē hic
 caducus est, & citò euanidus, sitq; vetusta-
 te cineritiū, pallidius, aut flauius, & modi-
 cè calidū. Bimum aut trimum adhuc me-
 dioctē viribus est, & interdum quadrimū
 quinto autē aut sexto anno exoluitur, p-
 cedentēq; tempore totū elāguescit, ne pu-
 tes cum vulgo annis decem posse integrū
 seruari, etiā cum milio, lētibus, fabis. Re-
 cens verò quia viribus est violētis, nō vtē-
 dū, nisi medici optimi cōsilio, præsertim
 sumendo remedio. Mesuæ verò optimū
 est leue, fragile, pallidū, clarū, acerrimū,
 odor

odore mordax, annotinum: nam recētius igneum est & venenosum.

Galbanū laudatur ligno purū, aliquid tamē seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, pingue, in Ammoniaci aut thuris similitudinem chartilaginosum, humidum & aridū medium.

Ammoniacum probatur purum, ligno, arenis, terra, sordibus, bene coloratum, odore castorii, sapore amaro, prædēsū, & in thuris masculi similitudinem minutis glebis chartilaginosum.

Gale.

libr. I.

Anti.

Sagapenum laudatur perucidū, foris rufum, intus cādidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorē & galbanum, quibus adulteratur: galbano albiori est simile. Nam spumosa, cohærens, albior, lenisque pars galbani in sagapenū degenerat. Altera dēsior, & multo quā aliud galbanum cōstrictior, sit galbanum optimum, sagapenum resipiens, eaque tanquam præstantissima utendum. si verū est, vino aut aqua statim soluitur, adulteratum nō liquefit. Mesuæ verò optimū sagapenum censetur ex albo rubescēs, odore porri, non omnino laseris, nec galbani, quibus adulteratur, spissum, sed tamen leue, facile in aqua resolubile.

Ibid.

Scammonia vel scammonium ex Myfia

7060

Aiani

Asiatica defertur laudatissimum, hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini vel gummi colore simillimum, & clarum, linguam parū vehementer vtens, linguæ saluosa tactu vel humoris alicuius albescens in fragmentis, & lactescens, tenerum fractu, ac pulueratu facillimum, odore bono sed siccō, non autem fcedo, Syriacum & Iudaicū graue & densum improbantur: tamen Antiochenum Mefues commendat, si vero linguam vehementer exurat, tithymalli succo vitiatum iudicatur.

RESINARVM DELECTVS.

MASTICHE laudatissima fulgore quodam ignis splendida, cādore ceræ Tyrrhenicæ, ampla, retorrída, friabilis, stridens friando, odorata, minimum acris, Chia, id est ex Chio insula, calida sicca ordine secundo, parum astringens.

*Diosc.
Gal.*

Deterior est viridis & nigra, Aegyptia dicta aut pontica, bitumini nigredine similis. Est autem lentisci arboris resina.

Terebinthina resina ex terebintho arbore defluēs, optima est alba, vel cerulea, vel colore vitri, plucida, odorata, terebinthi olēs, subamara, chia, asperæ arteriæ & ori mordax, liquida. Huic primatum inter resinas dat Diosc. secundas tribuit mastiche, contra

cōtra Gal. ob id eam statuimus primam.

Hodie ex Cypro insula & liquida, & per
siccationē coactior aduehitur nō cōrem-
nenda. Huic proxima est larix dicta seu la-
ricea ex larice arbore, in qua mannā ferē
colligūt. Larici bonitate & tota natura est
affinis abietina, quę hodie ppē sola pro
terebinthina, ab omnib⁹ officinis suppo-
nitur magno errore, cū sit multō inferior
terebinthina. Quod si Gal. nō modo tere-
binthinā exigebat, sed Chiam tanquam
omniū pręstātissimā requirebat, qua nō
dico ignominia sed pœna mulctādi sunt
rhopolæ, q̄ sciētes abietinā p̄ terebin-
thina vendunt, vsurpātq; non sine medi-
corū id permittentium infamia & culpa.

Pręter has picea, pinea, strobilina, cypa-
rissina, Dioscoridi & Galeno memoran-
tur, & liquida ē pinu, & picea, quę quōd
olim à Colophone vrbe Asię minoris pe-
tebatur, colophoniam vocabatur: nūc nes-
cio, qua ratione fecem terebinthinę di-
stillatę solam vocent Colophoniam.

GUMMIVM DELECTVS.

GUMMI ex acacia Ægypti spina, Ara-
bicum, vulgo dictum, & gummi ab-
soluē, laudatur vermiculorum in speciē
contractum, vitri modo perlucidum, pu-
rum, refrigerat, densat.

Cácamum Arabicæ arboris lachryma
vulgò gummi lacca, præstantius est ex
Dioscor. legendum.

Caphura Indicæ arboris ferulaceæ la-
chryma: solis Arabibus & Græcis recēti-
oribus cognita, eligatur quæ igni vel sole
ex rubro albescit, perlucet, friabilis est. Ea
enim est melior & tenuior & duranti-
or: eadem pani calido imposita madescit, si
sincera est: arescit verò, si spuria.

Deterior est crassa, fusca, nigra, assulis
ligni sui implicata, vase eburneo cum se-
mine psyllij aut lini, annos quadraginta
servari posse quidam affirmant.

Gummi oleæ Ethiopicæ corrūptè elē-
mi dictum, melius est scammonio simile:
saluum, stillis exilibus cōstans, mordax.
Dānatur Ammoniaco vel gummi Ara-
bico simile colore nigricans, morsus ex-
pers. Quod pferūt officinæ est resinæ pi-
ceæ aut pinus, quā Burgūdicā vocamus,
colore & cōsistētia & odore primo, dein-
de tamen valentissimo & multis gravi.

Gūmi iuniperi vulgò Vernix, quia ver-
no tempore exudat & legitur, bonum est
recens, perlucidum, pallidum dū vetera-
uit, flavescit, & fit friabile mastiches mo-
do: quam toto habitu multum mentitur.
In vſu frequētiore tamen est scriptoribus

& pictoribus quàm medicis. præterquam,
in suffutibus. quæ autē ratione non video
cum ipsum vt & thus, caput grauet, & va-
pore crasso & calido repleat. *studios.*

Myrrha arboris Arabicæ lachryma eli-
gēda, recēs, squallore & situ obducta, le-
uis, tota concolor, & quæ confecta, vn-
guinum modo & læues venas ostēdat, gle-
bis minutis, amara, acris, odorata. Omni-
bus antefertur Troglodytica ex Aphrica
viridis, perlucida, mordax: odoris gratissi-
mi, nullo viriata liquore. Post hanc secū-
da est tenuis, bdellij modo facile sub digi-
to mollescēs, odore grauiuscula, apricis
nāscens. Mala, nigra, aut colore picis, gra-
uis, retorrída, maturitate maximè exoletu-

Omniū pessima, pingui carens, cano-
situ obducta, acris, ad gummi imaginē
vergens, & viribus eius proxima. Ob id
adulteratur gūmi macerato aqua, in qua
myrrha maduit. Vera enim est rara inuē-
tu, præcipuè sinceta. Nā in optima myrrha
opocarpas inuenitur: ab optima myr-
rha diuersum, vt in nostris simplicibus
abunde docuimus: propter quod & alia,
myrrhæ in sumēdis parū tutus est vsus.

Myrrha stacte, id est, ex myrrha recen-
te, pingui, & solo latiore nata exudans, &
stillās, quæ ex aqua pauca tusa, deinde ma-
china

china exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, pretiosissima, minima portione efficacissima, multo rarior ipsa myrrha. Nā quæ styrax liquida vulgò dicitur, si vera esset, myrrha fuerit stacte: sed cum odore sit teterrimo, à myrrha alienissima res est.

Quod stillis illis expressis magna myrrha superest, vulgò quoque styrax rubra dicitur.

Bdellium lachryma arboris Sarracenicæ, vel Sembrachenicæ cum Heromlao, optimum est carens cortice, ligno, sordibus, ut taurinum gluten, translucens & clarum, odore vnguis marini incensum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu subigitur mollescit.

Scythicum est atius, resinosius, molliùs magis. Arabicum resinosum, liuescens, lucidum, magis sicans, nisi recens sit & humidum, & tundendo facile mollescens. Indicum, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum.

Adulteratur gumini, sed id minus est amarum, & minus suffitu odoratum.

Styrax lachryma arboris Syriacæ probatur flavus, pinguis, resinosus, sordescens, albicantibus grumis, acer admodum, & amarus, quamplurimum in sua odoris fra-

gratia permanens, & qui subactus mel-
leū reddat liquore. Deterior, niger, surfu-
rosus, friabilis, cano situ obductus. Adul-
teratur multis modis Dios. sed dolus his
notis deprehenditur. Pretiosissimus erat &
paucissimus Gal. etate, qui ex Pamphylia
in calamis & in arudinibus afferebatur.
Vnde opinor quiuis alius calamites ho-
die quoque dicitur. Accipe autem quod
calidissimum, & odore & gustu valen-
tissimum est.

De styracis duobus aliis generibus sup-
positiis in myrrha diximus.

Sarcocolla arboris Persicæ lachryma,
pollini thuris similis, rufa, emplastica,
subamara sine motu, siccans Mesuæ.
Item valétior est flaua quam alba, & quo
amarior, eo melior. Adulteratur gum-
mi misto, puluerata etiam suspecta est
adulterij. Vera enim rara est inuentu.

Dios.

Succinum vel Electrū est lachryma
ex pinei generis arboribus exudans au-
tūno ex Germania septentrionali & insu-
lis maris Germanici, larga mitti solita, in-
cesa pineam aperte olet charabe vulgō
& ambra dicitur medicis in vſu raro.

Ambar verō seu ambarum seu ambra
Arabibus & Græcis recētioribus est odo-
ramēti genus cineritio colore. Arabica,
subal

subalba, Indica, rufa, pinguis, odorata, succinum orientale dicta Hermolao. Nigra omnium pessima.

Thus lachryma arboris Arabicæ, pinguius, albius, emplasticū: flavi⁹ est siccus & antiquatū magis. Quod fœmininū vocāt resinofum magis est ac molle, citò ardēs: quod masculū, primum albicat, tandem etiam rufescit & flauescit. Perlucidū est, si præsertim guttarum formam retinet. Adulteratur resina piceæ & gummi, sed thus ardet, gummi nō inflammatur, resina in fumum abit.

Mannā seu mannā thuris Græci propriè vocant micas thuris, ex magnis fasciculis concussu elisas cum fragmentis quibusdam exiguis corticis thuris arboris.

Tragacātha laudatur alba, perlucēs, gracilis, lenis, sincera, subdulcis. Saliva in ore diu lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallescit primū, deinde rufescit, tandē etiā flauescit: qđ lachrymis ppè omnib; cōmune est: sitq; tragacātha hæc annis amara, ob idq; calidior, dulciū cæterorum more. Ob id etiā vulgus tragacanthā flavam antidoto aureæ Alexandri, antidoto Hadriani & diacurcumenæ maiori, & aliis quibusdam cōpositis miscet, quæ calida sunt præsertim vbi cocta sunt, & vbi di-

cunt fermentata, post annum scilicet dimidium: aliis verò frigidis aut temperatis albam aut pallidam.

METALLICORVM ET TER-

reorum delectus.

AVRVM & argentū indice lapide exploratur & probatur, colore scilicet flauo in lapide relicto. Igni quoq; & aliis explorantur fabris aurariis.

Lithargyros auri omnium optima, præcipuè foliata, aureo colore. Liquatur vterque, sed non mox, vt lib. sequentē in liquatione audies: materiæ solius in emplastris rationem obtrinet. Seruatur vase vitreo, plumbeo, stanneo, argenteo: si quidem aliam omnem materiam exedit, & defluere facit, Diosc.

Lithargyros argenti & plumbi deterior. Est autem horum metallorum se igni purgantium vitium, seu feruescentiam spuma.

Arsenicum id est auripigmentum optimum est, aureo colore, nulli materie permistum, crustosum, & in squamas tanquam bracteolas fissile. Alterum globosum, glandis effigie, pallidum, & colore sandarachæ imitans: vtrumque causticum est. In eisdem metallicis fodinis quibus

san

sandaracha gignitur, in Ponto & Capadocia.

Sandaracha arsenico affinis natalibus & natura, quin & in eam arsenicum ystione degenerat: ob id auripigmentum & arsenicum rubrum quibusdam dicitur: probatur colore rufo, saturatior ceu cinnabaris rubro, sulfuris virus redolens, friabilis, aliena materia carens, causticum est. Ne ergo posthac sandarchæ nomine gummi iuniperi accipias in compositionibus Græcorum.

Aes ystum probatur rubrum, & quod *Dios.* tritum colore cinnabarim imitatur, nigrum verò plusquam decet exustum est.

Squamma æris laudatur crassa, rufa, *Ibidem* præsertim si aceti resperfu æruginem contrahat.

Flos æris æte fuso, & aqua effusa exilit subito milij effigie & numero: optimus est brevis, gravis, splendens: cum teritur rufus, friabilis. adulteratur æris squamma aut limatura, sed hæc dentibus dilatatur.

Diphryges quasi bis rostum, est perfecti æris velut sex subsidens & coherens inæ fornacum parti: ablato ære visitur, acre est ut æs ystum. præfertur quod saporem æris & æruginis habet, astingens & vehementer siccas linguâ, quod exusta ochra

sibi non vendicat, quæ tamen diphrygis vice venditur: adulteratur enim oera vsta.

Scoria est metallorum omnium velut sterens, scoria plumbi optima est, densa, fractu contumax, cerussam planè repræsentans, nihil plumbo sum habens, ad luteum colorem accedens, vitri splendorem imitatur.

Ærugo est æris velut rubigo, acris est & mordax & caustica. Flos æris Guidoni & sæpe idiotis aliis malè dicitur.

Ærugo sincera compressu digitorum diffunditur, dentium quoque appressu cedit, lævis est ac æqualis, & sine asperitate. post fossilem præfertur rasilis, nobis hodie sola in usu.

Sori, chalcitis, misy, & ex transmissa per hæc aqua & ficcata chalcanthum, acria sunt, & vrendo escharas inducunt.

Sori in fodina infimum, crassissimum, lapidosius, vehementius compactum, in humore non liquecit, friando nigrius, cœu melantheria apparet, ac scintillat, vt misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue astringens est.

Misy summum grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, & friando auri colorem repræsentans, &
stellæ

stellæ modo splendens, ægrè liquefcit. Cyprium ad ocularia medicamenta optimum, ad cætera remedia Aegyptium efficacius. Diosc.

Chalcitis firu & natura horum media, æri similis, friabilis, non lapidosa, nec inueterata intercurfantibus oblongis venis, splendētibûsq; pröptissimè liquefcit.

Chalcanthum optimum est molle, cöcretum, graue, cæruleum, translucens, quale est stillatitium, concreto & coctili præstantius.

Melanteria præstat, sulfuris colore, lauis, pura, æquabilis, aquæ contactu confestim nigrescens, misyos modo caustica. Diosc.

Cadmia fornacaria melior est botryitis, id est, racemosa, in summo fornacis ærariæ affixa, densa, modicè grauis, in leuitatem magis inclinans, colore spodij, & quæ fracta cinerulenta & æruginosa est.

Cadmia, lapis calaminaris vulgò dicitur, cuius puluere æs rubrum pallore tingunt, & argent etiam hodie fabri ærarij. Is alieno sapore mandenti est, & in farinam tritus, aceto subactus, in sole seccatus coit in lapidem, in igne manet, & fuliginem edit luteam, vel æream. quæ lapidi cuidam in lapidum fodinis inuento à nō

nullo modo pro cadmia supposito non conueniunt. Diosc. Id quod dum fit, pompholyx seu fuligo quædam alba tenuis summæ fornacis cameræ adhærens, parietibusque actectis, & spodos illi per similis, sed grauior, in pauimentum recidit. Vtriusque magnam nobis copiam suppeditant fornaces ærariæ Parisiis, in via diui Martini prope Budæi, piæ vitæ functi, ædes.

Cerussa olim Rhodiaca Corinthia, & quæ Puteolis in Italia fiebat, cæteris albiior, leuior, tenuiorum partium, ad emplastra alba maximè commendabatur.

Sulfur viuum est optimum, præsertim si ne tedulè, seu fulguris modo splendeat & perluceat, nec sit lapidosum, vltimum vero est melius virens ac præpingue.

Sulfur enim ignem expertum, quo viuentius, oleosius, pinguius, eo melius.

Alumen scissile non in fila tantum, sed digitis friabile, vulgò plumæ, omnium substantia est tenuissimum & pretiosissimum, aquæ innatat, linguæ, cuti integræ mordacissimum, igni liquatur vt alia alumina: quibus notis tribus ab amianto lapide pro ipso supponi solito facile secer nitur. Liquidum maximè crassarum est partium, & vilissimi pretij, quia in omnibus

bus regionibus inuentu est facile, crustæ & lateris figura: quia faciliè opinor liquatur, liquidum dicitur.

Rotundum & astragali figura in medio est amborum.

Gypsum viendo, seu vt vocant coquendo, vt petra in calcem viendo coquitur, fit emplasticum: vltum vero præterea, vt cum in fornace & camino lapides iungit, aut calcinatum vt vocant, minus est emplasticum.

Spuma nitri, aphroniti ū, nitrum videri defierat, nec probo salei petrae ipsorum loco medicamenti misceri: mallem nitrum candidum, quod mihi ex agro Nauarrae datum est, minimum, salsum.

Nitrum præstantius est album, rubro permistum, lucidum, in fracturis laminosum, fragile, læue, spongiosum, salsum, mordax, naturale.

Sal fossilius, vulgò sal gemma, quibusdā videtur, sed Mesuæ sal naphthicus, omnium valentissimus, secundo loco sal gemma, tertio mineralis, infirmissimus est marinus.

Sal Armeniacus, Ammoniacus quoq; Dioscoridi & Galeno dici videtur, subacer est ac leuissimus.

Stimmi vel stibiū, vulgò antimonium, *Diosc.*
opti

Diosc.

optimum, splendidissimū, & modo nitedularum emicans, contractu crustosum, terræ & sordium expers, friabile.

Chrysocola laudatissima est armenica, colorem porri quā umillimum reddens, pura, terræ & calculorum expers.

Cyanus, in cuius fracturis velut stellæ quædam aureæ scintillant, vnde lapis stellatus Mesuæ dicitur, & vstione fit cæruleus magis: probatur maximè saturatus colore nominis sui Diosc. Mesuæ verò est colore viridior & cæruleus, maculis aureis interceptus, grauis, metallorum expers.

Armenius lapis præfertur lævis, perquam æquabilis, calculi expers, colore cæruleo, friabilis Diosc. colore ex viridi obscurus, terreus, & indus, maculis viridibus & nigris distinctus, tactu lævis, & asperitatis expers, nondum exactè lapsus, sed friabilis & pulueratu facilis Mes.

Ochra eligenda leuissima, & omnino lutea, friabilis, non lapidosa, vritur & lauatur vt cadmia Diosc.

Lapidum in medicamentis Græcorum rarissimus est vsus.

Iaspidem viridem Galenus, omnem iaspidem medicamentoſum tradit Diosc.

Arabes quoque compositis quibusdam

dam cardiacis faphyros, hyacinthos, granatos, sardines, margaritas commendant. De his Albertus magnus, Serapio & alij plerique multa prodiderunt, quam verè æstimato.

Diosc.

Hæmatites probatur friabilis, saturato colore, niger, durus, & suapte natura æqualis, nulla sorde admista, nulloque zonarum discursu.

Diosc.

Magnes ferrum promptè trahat, sit colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Lapis iudaicus meræ striatæ forma, tener & friabilis.

Corallus lapis Actuarius dicitur, aliis arbor lapidosa, ruber & niger est Dios. Nobis etiam albus & aliter coloratus. Visus mihi foris albus, intus ruber.

Sigillum Lemniū, in placentulas quædam exiguas formatum characteribus turcicis signatum, colore nunc pallido, nunc rufo, sapore parum astringente.

Bolus armenia colore ochra, id est, pallida vel lutea, promptissime in summum læuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore, arenosa substantia caret. Tam callide hæc ut sigillum Lennium, & alia pleraque adulterantur hodie, ut pro veris recipienda non sint,

sint, nisi ab eo qui collegerit, fides sinceritatis fiat.

PARTIVM AB ANIMALIBVS

sumptarum delectas.

Sanguis hirci quadrimi, bene habitus, aliquandiu nutriti vino albo & herbis, calculum frangentibus, vt sceniculo, fese-
 li, lauro, Augusto mense iugulati, medijs effluens eligatur: nam primus tenuior, postremus crassior putatur. Vase vitreo receptus linteo raro rectus, sole siccetur.

Sanguis draconis veterum, hodie ignoratur. Qui vero ostenditur, factius est ex hirci sanguine, bolo armenia, & succo sorborum, vel alijs.

Lac vaccae, caprae, asinae iuuenis, aliquandiu post partum exercita, & bene pastae, praesertim idoneis sibi pascuis, verum largius, sed humidius, aut autumnale parcius, siccus, & butyro diu seruando aptius. sit autem quatenus lacti datum est, dulcissimum, albissimum, consistencia mediocri, si vaccinum est: tenuiori, si asinum vel caprinum.

Serum lactis caprae iuuenis nigrae, salubribus alimentis nutritae paulo ante foetae praefertur Mesurae, secundas tenet serum lactis omni.

Adeps

Adeps ex animali florente autumnò lectus, reponitur vel incuratus, lotus, ficcatus in vmbra, vel exemptis pelliculis fuscus sole vel igni, in vase duplici. Alij rosto in veru animali cadentem excipiunt.

Medulla vradeps sumatur à fine æstatis, ad hyemis initiũ, ex florēti animali: & reponatur loco sicco & edito, & septētrionem spectāte: reponatur cum foliis laurī ficcis, ne putrescat, aut situm ducat. Recēs etiam tenerorum animalium vsurpatur.

Cerebella passerū vere & autumnò captorum reponuntur, cum vitello oui & melle, vel sole, aut cinere calido ficcata. Cornu Rhinocerotis eligatur legitimum.

Mumia Serapionis, cum sit Dioscoridis pissasphaltum, id est pix & bitumen, ex horum notis noscitur. Quod verò nobis hodie est mumia, liquamē est hominū aloē, myrrha, & si datur balsamo in sepulchro conditorum. Carnes enim cum humanis ossibus retorridæ ad nos afferuntur.

Tunicam interiorem ventriculi gallinarum, quia inutilem confirmat Galēnus, de illa ne labora.

Iecur lupi si potes florentis, & bene habitum, aut etiā teneri potius, & recēs, quam ficcātū est præstantius. Potest tamē ficcātū in multos dies seruari, vt pulmo vulpis.

Diosc. Renes scincorum, qui crocodili sunt terrestres, siccati seruentur, corpulenti & non strigosi.

Diosc. Castorium elige, id est castoris testes, qui ex vno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore graui, & virus olentè, gustu acri & mordaci, recens tamen melius veteri quibusdam est. Nigrum autem foetidum, rancidum, die vno necare sumptum affirmat Auicenna de venenis.

Æsypus, id est succidarum lanarum pinguitudo seruetur purus, ex omnibus integris, non scabiosis. Hyslopus humida ineptè vulgò dicitur. Ambra quam habeat originem ignoratur adhuc: præstantissima tamen fuerit rara, levis, habitu rha Barbari, sed fusca magis interdum & cineritia, & alba, odoris gratia multum commendabilis, nigra autem reiicienda, & quam vulpes deuorant & vomuerint.

Moschus melior est sublauius quam nigricans, & qui pelui humectatae immisus leuior euadat, quam qui grauior. Ex Catai tamen niger præstantissimus hodie offertur. Ferrugineus ferè est noster, non quem Auicenna probat citrinus, Alexandrinum vocas, est in odore in opum Cyrenai

renaicum inclinante sed valentiore, præter summam aliam in eo fragrantiam glebulis exiguis constat, seruaturn melius pyxide plumbæa cera obturata per se. si autem odoris gratiã perdidit reponere vase vitreo aperto, & suspende in cloaca. sic enim recuperabit, si Plateario credimus.

••••• Cantharides probantur in frumento *Diosc.* inuenta, versicolores, & quæ luteas in albis transversas habent lineas, corpore longo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris. Capiantur vere, & phiala seruentur: necentur autem ut iubet Diosc.

••••• Gallus ad ius purgatorium eligatur, *Mes.* rufus, plurimum annosus, sed tamen adhuc ad motum, pugnam, coitum, alacer: & in dimicando validus, macri & pinguis medius, hoc est bene carnosus: præparatio autem eius ex Mesue repetenda.

••••• Unguis odoratus, Blatus Bizantis Aethiario, blatta bizantia vulgò, conchylij tegumentum est odore castorium referente, ad suffitus idoneum: ipsa enim testa mox liquatur igni bituminis modo, & etiam improbè ipsa olet, quidam albicantem odoratam magis commendant.

••••• Uniones seu margaritæ ex quodam concharum genere auulsæ, sint corpulenti,

integri non perforati. Sunt qui à natura perforatos præferant, quòd per foramen excrementis sint purgata.

De viperarum delectu lib. 4. nostra methòdus in theriacis compositione; quantum satis est diximus.
 21. Ladanum sit nigrum; molle; glutinosum; graue; odoratum: friabile autem vetustate elanguit.

Ex prædictis aromata sunt; amomum; cinamomum; cassia; calamus odoratus; nardus Gallica & Indica; partes balsami; crocus; folium; folium malòpathri; ladanum; aspalathum; xylaloe; macis & recen-
 22. sionibus Ambra; moschus; vnguis odoratus; caplura; cubeba; doronicum; galanga; caryophyllum; macis; nux moschata; santalum triplex; cornu monocerotis; zedoaria. In his quæ odorata magis sunt, in suo genere sunt præstantiora. Sapore autem si explorabis, per multa continenter ne gusta; sed vel os interea abluce, vel papyrum inde; vel tempus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, ut non prioris reliquiae iudicium tibi falsum afferat posterioris aromatis. Hæc cū sint essentiae tenuiores, celerius exanimantur, præsertim aere calido; parum fideliter operculata & inuoluta; aut etiam iam commi-

nuta. Ob id vtenda cum vigētissima sunt, nondum verò cariosa, foraminulenta, exoleta, exanimata, emortua.

Ex his item purgantia sunt agaticus, colocynthis, cucumer agrestis, elleborus yterque; rithymali; daphnoides, opopanax, polypodium, sagapenum, sarcocola, dracunculus, scammonium, euphorbium, cassia fistula, myrobalanus quintuplex. Hermodactylus, lapis cyanus & armenus, manna, rha barbarum, Thamar indi, turbith, senna, & alia quædam Mæsuæ & aliis tradita.

Quæ maiore cura & studio sunt diligenda, reponenda & seruanda: & quæ vi malefica sunt prædita, castiganda, vt libro sequenti dicemus.

Adulteria, quòd in primis ad delectum conferant, ob id in hunc librum reieci, eaque simplicibus ipsis dolo mentitis ascripsi, ne longius lectori disquirenda essent: fusius tamen hæc ipsa persequi nõ placuit ob dictas à nobis causas lib. 3. methodi medicamenta componendi, vnde in hunc librum si qua de adukera torù notis desiderabis, transferre potes.

Superest in hoc etiam primo describere analoga quæ vocant, & antuballomæna, quòd hæc ambo non parum ad medi-

camentorum delectum commodare existimem, ut libro sequenti agamus tantum de multiplici præparatione medicamentorum simplicium ad compositionem utili, vel etiam necessaria.

Cum nomen alicuius simplicis medicamenti commune multis scribitur sine additione, quod ex illis intelligendum sit, quia insignius vel rei propositæ aptius, ut ammi, anisum, anethum, apium, cnicus, cuminum, gith, lybisticum, nasturtium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt efficaciora. Ergo apium, ammi, anisum, anethum, id est semen. Adhæc, anisum Creticum, ammi Illyricum, melius.

Aloe optima qualis Gal, Indica, Mesue succotrina.

Acetum ex vino: Nam ex hydromelite, ceruisia, & aliis fit, sed inefficacius.

Agaricus, albus & foemininus & qui notas omnes optimi agarici à nobis præscriptas habeat, & in cæteris similiter.

Agnus, flos aut etiam semen.

Alumen scissile, quia præstantissimum.

Aristolochia rotunda. In ynguentis verò clematidis.

Amomum scythicum, & cum notis scriptis. Balsamum, opobalsamum.

Bryonia alba, potior quam nigra.

Buglossum

Buglossum vtrunq; id est, folia & flores.
Cassia vel cassia in libris Græcorum, nostrum vulgare cinnamomum, quæ in libris Arabum cassia lignea dicitur.

Cassia verò fistula ponitur quando medicamentum Arabum est purgatorium.

Cardamomum, minus.

Capparis, cortex radices.

Coriandrum, Cuminū Æthiopicū; semē.

Centaurium, in purgantibus, minus: in aliis maius.

Calaminthe montana: quia efficacior domestica.

Costus cum reuera vnius sit generis ambiguitatem non habet: Radix autem eligatur: Nam dulcis costus Arabum ignoratur.

Cypressus, pilulæ eius seu nuces recētes.
Cinnamomum, optimum & cum notis antescryptis.

Daucus, agrestis. Nam satius est pastinaca, alimentum potius quam medicamentum.

Elleborus albus Galeno, Niger Mesuæ.
Eruca, sylvestris quia efficacior.

Epithymum Atticum Græcis, Arabicum Arabicis cōpositionibus vsurpandum.

Fœniculus, semen: sed in collyriis, succus foliorum aut radicem.

Galla, solida: quia efficacior, q̄ perforata.
Granatum, acidum.

Gummi, Arabicum. Id enim omnium
perfectissimum.

Gluten, ichthyocolle his, aliis taurocol-
la, aliis mastiche intelligitur.

Hysopus, montana. hortensi melior. Cili-
ciam Dios. Creticam alij laudant.

Hycscyamus, albus, seu albū eius, semē.

Iris, radix ireos Illyricæ, Græcis: neoteri-
cis, florentinæ.

Lupin⁹, amarus. Nā dulcis esculētus est.
Laurus, folia.

Ligusticum, semen.

Lactuca, semē: sed in viâ ratione, folia.

Lapathū, oxylapathū efficacius rotundo.

Lithargyrus, auri, quod aliquādo rāmen
exprimitur.

Mastiche, Chia: aliis etiam Ægyptia.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel apum, Alterum aëromeli, seu māna.

Margaritæ, solidæ meliores pertusis, nisi
etiam sint flauæ, obscuræ: quia tunc so-
lidis sunt pares.

Medulla cetrina in valenti medicamen-
to: in minori, vitulina.

Nuclei pinii: aliis oliuæ, daſtyli Autēna.

Nux iuglans, vsualis vulgò & cōmunis.

Nasturtium, semen.

Oleum,

Oleum, olium, ex oliuis expressum.

Ozimum, in Arabibus Caryophyllatum.

Opium, Thebaicum, Tamen Apulum etiam hodie celebrari audio.

Petroelinum, Macedonicum: & in hoc Astreonicum, à loco in Macedonia ubi crescit optimum in præruptis: & huius maximè semen.

Pruna, si alius deicienda est, dulcia; si astringenda, acerba vel austera.

Papauer, album, semen.

Piper, album: quia acrius.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus medicamentis: sicca in siccantibus, epulonicis, glutinantibus.

Pæonia, mas, seu ipsius radix, vel semen.

Polypodium, quersum, murale ali.

Poliu, in antidotis, minus seu montanum quia acrius, amarius, ob id efficacius.

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola nigra, acanthus.

Quatuor semina frigida maiora, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli.

Quatuor semina frigida minora, lactuce, portulacæ, intybi, cichorii.

Quatuor semina calida maiora, cumini, cari, anisi, fœniculi.

Quatuor semina calida minora, apij, dauci, ameos, amomi.

Quinq; radices vreticæ, id est vrinā mouentes, apij, petroselini, alparagi, graminis, rusci seu apij veri & eleoselini. Resina, Galeno mastiche: Dioscoridi terebinthina.

Ruta, folia rutæ agrestis, sed ferè à Græcis exprimitur, aut alio nomine vocatur scilicet molybēfasa, harmola.

Raphanus, syluestris radix.

Rosmarinus, flos aut folia.

Rhus, cortex fructus, sumach dicti.

Stoechas, stoechados Arabicæ flos.

Syrax calamites, si haberi possit, aut saltem calidissimus & vegetissimus.

Santalum, flauum, quia odoratus.

Spica, nardi Indicæ.

Sulfur, viuum, & igni non exustum.

Tragacantha, alba in frigidis compositionibus: rufa in calidis miscetur.

Tres flores cordiales, violarum, buglossi vtriusque.

Thymum, Atticum, aut ex locis editis & siccis.

Viola, nigra, seu purpurea: vulgò martia & quadragesimalis: recens si haberi potest, & folia, si emolliendum est: flos, si corroborandum: semen, si purgandū.

Viscum quernum, ipsius baccæ recentis, aut recentis summa germina cum fo-

lius &

liis & cortice.

Zizipha seu iuinbæ, recentia & bene ma-
tura, aut saltem integra, non putria aut
vetustate exucca.

In summa, intelligatur omnia suis notis
prius dictis omnibus absoluta: inter
quas etiam ratio regionis vbi medica-
mentum educatum est habeatur. Ob id,

Alumen, Milesium	Anisum	} Cre- ticū.
Agaricus, Ponticus	Thymum.	
Castoriū, Pōticum	Daucus	
Misy, Cyprium	Amaracus	
Nitrum, Bereniciū	Glycyrrhiza	
Sinon, Syriacus	Origanum	}
Cuminum, Hispa- num & Æthiopi- cum.	Dictamnus	

Meum, Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia, Pōtica vel potius Cretica.

Phu, Ponticum.

Ærugo, cerussa, æs, æris squamma, ex Pu-
teolis vrbe Italiæ.

Lithargyros, optima Romana & Sicula.

Antiballomena seu medicamenta in lo-
cum alterius desiderati supposititia,
magis consentanea rationi sunt; loco

Aquæ pluuiæ, aqua fontana pura.

Acaciæ, succus & caro prunellorum agre-
stium.

- Afari, acorus vel carpesium.
 Absinthij, Abrotanum.
 Acanthæ Arabicæ seu Ægyptiæ herbæ
 (quæ succha dicitur Serapioni) acan-
 tha leuce nostras, eidē dicta bedegar.
 Alicacabi, semen solani.
 Asphalthij, pix liquida Brutia.
 Æthiopice olea lachrymæ, id est, gum-
 mi elemij, gummi acaciæ seu gummi
 Arabicum.
 Anchusæ, hyacinthus.
 Amyli, sicca farina.
 Arsenici, sandaracha.
 Amygdali amari, absinthium.
 Aristolochiæ cuiusvis, vna ex tribus.
 Adipis vulpini, vrsi.
 Adipis ceruini, anserinus.
 Aluminis, sal fossilius.
 Balauftij vice, malicorium.
 Buccinorum, ostreorum testa ysta.
 Balsami liquoris, myrrha, stacte vel ca-
 phureleon.
 Cinamomi loco, casia optimæ, vel car-
 pesij, vel amomi, vel seminis carda-
 momi sabinae duplum.
 Casia, seu casia corticis, cinamomum
 etiā ignobile, nisi optima casia requi-
 ratur, quæ cinamomo est proxima, vel
 nardus indica, vel malobathri folium.

Chama-

Chamemeli florum, duplum foliorum & radicum.

Costi, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri, vel radix helenij vel ireos.

Cimolix terre, recrementū ferri & molæ.

Ceruse, spodium, pompholyx.

Caphuræ rei incognitæ & sapore ingrati, santala alba & rubra.

Cardamomi maioris, minus.

Calaminthe omnis, mentastrum, pulegiū similia sunt facultatibus: ob id ianicem sunt antiballomena.

Croci, crocomagma.

Cyperij, ianipgius maior.

Cumini, semen rutæ vel agni.

Colocynthidis, semen ricini.

Capparis radicis corticis, cortex radicis

Tamaricis vel ericæ.

Dictamni loco, salvia, vel nepetha, vel

pulegium.

Doronici, caryophylli dimidium.

Dauci, pastinaca.

Elaterij vice, succus foliorum cucumeris

agrestis.

Ebeni, lignum gaiaci.

Eupatorii, Meluxæ, alari & absinthij, ana

dimidium.

Folij loco, folium caryophylli, vel nardus

indica, vel casia, vel macis.

Ferruginis, squamma ferri.

Fimi palumbini, fimus columbæ.

Fellis suilli, fel perdicis, vel piscium.

Gentianæ loto, asari & radicis capparis
ana dimidium.

Glycyrrhizæ succi, pulvis radicis.

Gnidij cœcci, semen lathyridis.

Galbani, sagapenum.

Ammoniaci loco, propolis.

Hermodactyli, folium anchusæ, & dimi-
dium bdellij foris admouetur dolenti
bus iuncturis.

Hederæ gummi, gummi perfici.

Iridis Illyricę loco, helenium odoratum.

Lapidis Assij, gagates.

Lapidis phrygij, magnes, pyrites.

Libystici feminis, semen dauci.

Lanariæ radicis, radix Veratri nigri.

Lycij, succus radicis centaurij magni.

Mellis loco, saccharum.

Malobathri, casia, nardus Indica.

Myrrhæ, smyrnium.

Myrrhæ Troglodyticæ, calamus odora-
tus.

Marrubij, melissophyllum.

Mespili tricoccia, id est, azaroli, mespilū
nostras quinque ossibus præditum.

Nasturtij feminis loco, folia eius sicca.

Nucis moschatæ, spica nardi.

Nardi syriacæ, iuncus odoratus seu schœnanthum.

Opopanacis loco, ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium.

Opij, meconium.

Ozimi caryophyllati, melissa in affectibus cordis.

Olei laurini, oleum cedrinū, vel cicinū.

Olei omphacini, ablutum oleum dulce.

Olei rosati, violatum, amygdalinum.

Olei cicini seu ricinini, raphaninum.

Opobalsami, opocalbason, vel myrrha stacte.

Orizæ, farina hordei.

Oesypi, medulla cervi.

Omphacij, succus rhois, id est sumach, vel vinum austerum.

Piperis longi loco, album.

Piperis albi, nigrum optimum, id est grauiissimum.

Petroselinii Macedonici in Theriaca, alterius regionis petroselinum.

Pompholygis, spodium & anispodium.

Rubiginis loco, scoria ferri.

Rhaphani seminis, succus.

Rosarum, flos ipsarum.

Rhois coriarij, rhus obsoniorum.

Staphydis agricæ loco, pyrethrum.

Struthij, in sternutamentis elleborus alb^{us}.

Spodij, antispodium aliquod pōpholyx.
 Styracis, castorium, nisi odor queritur.

Salis indi, saccharum candefactum.

Sagapeni, ammiacum.

Spumę nitri, nitrum, aphronitrum, modo
 non sit in corpus recipiendum.

Sulphuris viui, coctum & vltum.

Satyrij, semen erucę, scintus.

Sinapis, cardamomum, vel cardamum.

Scammonij, ricinus.

Stibij contusi, squamma zis, stannum
 vltum.

Sepię ossis, pumex.

Scillę, pancratium.

Terebinthinę loco, larix seu laricea re-
 sina.

Thapsię succi, cardami vel erucę semen
 foris, adhibetur.

Veratri albi loco, nigrum.

Vini Falerni, quoduis fuluū, tenue, perlu-
 scens, odorum vehementer.

Zingiberis loco, pyrethrum foris adhi-
 betur.

Qua autē ratione pro desideratis istis,
 alia hic ascripta supponi possunt: ita &
 contrā si quod horum suppositiorū de-
 sideretur & aliorum est potestas, in horū
 vicem ponentur. potest quivis alia mul-
 tō plura pro variis locis & affectibus &

homi

hominum proprietate lacere antiballo-
mena, sed nolim pharmacopœo licere
vel clementissimum mutare sine docti
medici consilio, ne audaculus fiat etiam
in alijs. Quomodo enim pluris est rex
ipse quàm princeps: si maiorum est viriũ
& cõpositioni proposita aptius simplex
quod à maioribus est ascriptum, quàm
quod illius penuria supponitur. Sit

itaque religiosus & formidolo.

-omissus in his permutationibus

-ob id tam medicus quàm

-omissus in pharmaco.

-omissus in poculo.



DE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



DE MEDICA-
MENTORVM SIM-
PLICIVM PRÆPARA-
TIONE, LIBER
SECVNDVS.

* * *



AE C pharmacopœiæ pars vilis & hominis eruditi ingenio indigna nemini debet videri, cum medicamentorū compositorum facultates propemodum totæ ab hac proficiuntur. Quæ enim vis, quis vsus simplicium medicamentorum citra trituram, coctionem, infusionem, & alia pleraq; post dicenda esse possit? Quæ mistio ad compositionem omnino necessaria sine his præparationum modis fiat? Quam autem facultates non simplicium modò, sed etiã compositorum varient, vel sola præparandi ratione tam apertè postea cõdisces, vt neque testibus, neque demonstratione longa opus sit. Quoque difficilior fuit rem à nemine hætenus tentatam ceu nouam excitare, & in hominum manus & animos ponere: eo mea sententia erit &

& præclarius. Quanquam enim Hippocrates, Galenus, aliique celebres medici, ut interim empiricos taceam, leuiter simplicium medicamentorum quorundam præparationem attigerunt, & nonnullos superiores medicos de præparandi ratione quædam scripsisse testetur Galen. tamen nullus hodie extat quem sciam, qui hac de re aliquid memoria dignum absoluerit: præterquàm quod pauca quædam, sed tamè legi dignissima, de quatuor præparandi generibus, tritura, coctione, vstione, infusione, Mesues in sua methodo diligendi medicamenta purgatoria & castigandi perstrinxit. Nam quæ Seruitor nescio quis partim ex Dioscoride deprauauit, partim ex indoctis collegit, quis ferat?

His nos rationibus comoti ex Hippo. Dio. Galeno, aliisque permultis quorundam simplicium præparationes passim dispersas, in ordinem congegimus, multas ipsi & inuenimus, & experti sumus, & à doctissimis hac ætate pharmacopœis didicimus. Quæ dum à nobis stylo mediocri scripta legis, candide lector, tecum reputa nos rudibus introducendis hæc scribere, quorum captui seruire malui res nudas docendo, quàm singulorum ra-

tionem prolixius afferre: quâvis & id ad
rē propositam felicius absoluendâ, pluri-
mum pertinere videatur. Porro præpara-
tionem exequi statui medicamentorum
simplicium tantum, non aliarum etiam
rerum, per quas omnes præparationis ra-
tio & virtus spargitur: vt nihil à natura gi-
gnatur, augeatur, aut alio quouis modo
moueatur citra præparationem: nihil ar-
tes tam mechanicæ quàm aliæ omnes
tentant non adhibita prius præparatione
aliqua, per quam ars sæpe naturam vin-
cere videtur.

Medicamenta præparare est, ipsa per ar-
tem vsui vel compositioni commodiora
reddere, hoc est, vel mitiora, vel valentio-
ra, vel gratiora, vel salubriora, vel magis
miscibilia, & vt paucis dicâ, meliora vel
ad vtendum vel ad componendum. Qua-
dam enim vbi à nobis sunt præparata,
etiam citra compositionem mox vsurpa-
mus. Plurima autem præparata ante vsum
ad compositionem veniunt. Ad præpara-
tionis quoque vim (de qua paulò post
dicam fusius) reducendum putamus cum
vnâ medicamenti facultatem nobis in-
præsens noxiam tollimus, vel optatam
detegimus, vel nouam acquirimus.

At verò medicamenta omnis generis
metalli

metallica inquā, plantas, animātia, vel ex
iisdem sepe alimenta, paramus interdum
adhuc viuentia, frequētius emortua. Ter
rā enim lemniā (quæ dum adhuc in colle
est ex quo effoditur, velut in matre viue
re videtur) sacerdos Dianæ dū sumit spār
so tritico & hordeo piamenta ritu patrio
faciens preparare videtur, vt hinc magnā
virium suarum partem, nisi etiam vires
suas omnes consequi putetur. Nonne ar
senicū in sandarachā, & sori in chalcitin,
chalcitis in misy prōptius in vena ipsā trā
sibit, si specū ipsum soli meridiano ape
rueris? Ratione eadē vomica hydrargyri
si in solē erūpat tenuior euaserit, & sulfur
in Vesouio vel alio monte vstum minus
quidē oleosum sed tenuius euadit. An nō
longa & asperissima hyeme qua vētres ac
viscēra terræ plus calidi habēt, metalla o
mnia largius gigni & plenius augeri re
cipimus? Nam & mihi aureæ quædā velut
arbores in durissimis quibusdā lapidibus
visæ sunt, & velut quædā arbores ex auro
& argēto rudimenta, vt nō ambigā quod
doctē Augerellus in chrysopœia scripsit,
metalla in momēta gigni, nutrirī, augeri,
perfici, etiam si puteus Hānibalis, & me
talla Iluē Tyrrheni maris insulæ inexhau
sta, & alia pleraque huius rei testimonia

dare, fidemque facere poterant.

Lib. 9 In fossam super collem in Cypro plu-
Simp. uia recepta per venam misyos, chaleiteos
 sorcos transfusa in specum subditum;
 quædam est chalcanthi præparatio aut
 verius generatio.

Mes. Viuentem raphanum insertis in eius ra-
in cano dicæ fibris aliquot ellebori nigri, purga-
nibus tricem facimus: & fructus arborum purga-
vinuer torios scarificato ipsarum cortice, quo te-
 pore salua conscendit & immisso in pla-
 gas scammonio, cerâque super vulnus
 data & deligata.

salibus. Tempus præterea expectamus idoneum
 donec matura sint vel vigentia, vel sicca
 quæ lecturi sumus, & cælum plantæ pro-
 pitium: sæpe etiam lunæ quadraturas spe-
 ctamus, ut efficacior sit planta tunc colle-
 cta, dum arbores ablaqueamus, dum vi-
 tes putamus, propagamus, sarrimus, deca-
 cuminamus, festucamus: harum planta-
 rum fructus non modo vberiores, sed
 etiam meliores reddimus.

Idonea victus ratione nutricis lac præ-
 paramus, vbi nutritius affectu aliquo la-
Lib. 3. borat, quomodo & asininum Galen. lib.
alimē. 7. Metho. & vaccinum recessu Tabiarum
 libro Method. quinto. Porcos, capros, a-
 rietes, tauros iuuenes castramus, ut eorum

caro

caro sit suauior, plenioris alimenti, coctu faciliior.

Glandulae mammarum praesertim vac- *Ibid.*
cinarum & suillarum, dum lacte suo tu-
ment, meliores quam exuccae: unde &
sumen porcae recens ferat a ganeonibus
laudatum legimus.

Coagulum in primo yentriculo anima-
lium lacte nutritorum ex lactis corru-
ptione genitum venatu animalis effica-
cius euadit, vt animalium propè omniū,
non solum ferorum caro.

Gallum veterem venatu quoque exer-
cemus, & meliorem ad purgandum cle-
menter suo succo nitroso reddimus.

Vulpes aetate florentes venatu multo
fatigatas, si bene habitas, si oleo incoqui-
mus, multò digerentius oleum effici-
mus. Si verò eas vis impinguatas post
vindemias capimus, esui sunt iucun-
diores.

Porci segetibus nutriti firma sunt car-
ne, glandibus verò praesertim faginis,
laxa & fluxili & promptè liquabili.

Hircum quadrimū dum mensibus ali-
quot antequā iugulemus, herbis nutri-
mus calculum fragentibus, & vino albo
generoso potamus, hoc modo sanguinē
eius ad calculos in renibus praesertim

comminuendos efficacissimum paramus.

Cancros dum Aescrion capiebat & v-
rebat post canis ortum, sole leonem in-
gresso, die vero Lunæ eius decimo octa-
uò, contra rabiem hac ratione efficacio-
res sperabat, hocque modo præparabat.

Viperas non mox ubi latebris ereps-
rant, sed iam exercitas, iam consueto ante
hyemæ alimento recreatas, iam suo exu-
vio inter lapidum coagmenta deposito,
velut rediuvas Galenus vult capi, sicque
præparare incipit.

- Pullas & capos iure & carne viperarum
cū panis subactis nutrit Mattheus Gra-
di, ad vsq; deplumationem curaturus ho-
rum esu elephanticos.

*Lib. 3.
alim.*

- Gallinæcos panis in lac æcidum & fero-
sum merso si antè nutrimus quàm iugu-
lemus, ut testes habeat gratissimos & præ-
stantissimos, & si antè contum ne virus ex
semine oleant. Sic enim boni sunt succi,
valide nutriunt, facile coquuntur.

Ibidem

- Hepar *ovine*, id est ficatum, præsertim
suum, ficis ficis multis nutritorum, est
præstantissimum. Sic pastum iecur anseris
albi, seu iecur anseris nutriti alimentis la-
cte imbutis suavius, coctū facilius, me-
lioris succi.

Ibidem

Capra aut aliud animal scammoniū aut
tithy

tithymalos depastum, lac reddit phlegma
gogum, & quod aluo pituitam deducat.

Stercus pueri ad anginam idoneis ali-
mentis, & stercus canis ad alia esu ossium
in viuis ipsis animalibus præparamus, & *Ibidem*
alia in his generibus plurima. Sed ad hanc *Lib. 3.*
rem hæc sufficiant ad probandum quæ- *alim.*
dam nos cum natura viuis adhuc medi- *Lib. 2.*
camentis præparare. Cum verò hæc præ- *simpl.*
parandi ratio, licet sit efficacior, tamen
haud ita crebro in vsum venit, vt fortasse
quis etiam præparationis nomine nō ef-
fic accipiendam contendere possit: ob id
de altera eius specie agamus, quæ omni-
no latissimè patet in singulis medicamen-
torum simplicium generibus. Fit autem
hæc generatim quidem additione & abla-
tione, nunc substantiæ, nunc facultatis,
nunc vtriusque: particulatim verò tritu-
ra, coctione, afflatione, vstione, & cæteris
post scribendis.

Ad ablationem verò reduci volo sepä-
rationem partiũ nunc simul manentium,
vt in tritu: a: nunc à se inuicem abeuntium,
vt in despumatione, destillatione, succo-
rum & liquorum extractione.

In singulis autè differētis quæ additio
aut ablatio, aut ablatio & additio, vel sub-
stantiæ vel qualitatis, & eius vel vnius, vel

multiplicis fiat, abūde postea docebimus.

Nunc hæ omnes præparandi differentiæ quam facultatem habeant, & quibus modis perficiantur, singulatim dicamus: primūque de tritura omnibus propè communi non simplicibus solis, sed etiā aliis præparationibus, postea de his quæ calore perficiuntur, deinde frigore, post hæc siccatione, hinc humectatione & cæteris post elencho comprehensis.

DE MEDICAMENTORVM

simplicium tritura.

*Mes.
in cano
nib.*

Medicamenta teruntur, hoc est, comminuuntur, percussu vel friatu idoneo, vt simul misceri exactius possint. vel vt facultas ipsis noua conquiratur, vel vt malefica tollatur. Quos tres terendi scopos in methodo medicamenta componendi fusius explicauimus. Terendi autem modus plurimum est varius. Primū quòd plurima pistillo ferreo, æreo, plumbeo, vitreo, ligneo, vel alia constante materia in mortario ferè simili materia conflato terūtur: sed pistillus ferreus & æreus mortario ferreo & æreo magis seruiunt: iisdem & lapideo & vitreo mortario etiā ligneus, sed plumbeus plumbeo, vitreus vitreo est aptior.

Secundo loco multa teruntur diu ducta super lapidem durum & marmoreū, porphyrium vulgò dictum : marinum, quem maris squammam vocant. Ducuntur autem simili lapide, sed paruo, & manu concepto, quem molulam vulgò vocamus, quòd molæ parvæ is effigiem habeat, vt lapis suppositus magnæ.

Tertio teruntur medicamenta quædam molis trusatilibus vel versatilibus, vt quædam etiam moletrinarum molis, qui modus Lugduni est frequens in terendis aromatibus, quibus constant pulvis minutarum specierum, & pulvis selectus, quem finem vocant, & alij permulti suo cuique more commisti. De hoc non sum dicturus, sed de primo præsertim, & pauca de secundo.

Nec omittendum mortarij operculum saltem simplex, aut etiam duplex, quale veteribus in usu fuisse in nostra componendi medicamenta methodo commemorauimus, præsertim puluerantibus. Nā humida hoc non indigere videntur. Ad trituram quæ præparandi species reducendæ sint, ceu ipsi affines, postèrius audies: vt quòd quædam rapaci serra minuuntur, alia minutim conciduntur, vt promptius teri possint, vel humori cui

incoquantur vires suas tradere.

Non modò autem instrumentis variat terendi modus, sed etiam ipsius percussio- nis vigore & tempore, & rerum terenda- rum situ, & connexione, & futura confi- stentia. Quædã enim per se omnino sunt terenda, alia cum aliis quibusdam, ipso- rum trituram sæpè etiam facultatem iu- uantibus: alia tum per se, tum cū quibusuis teri possunt: & hæc omnia tenuissimè vel crassius. Item quædam diu terenda sunt, alia trituram breuem vti & decoctionem sustinent. Item alia valenter tundèda, alia tantùm clemèter frianda, ducto per mor- tarium molliter & nunc celeriter, nunc segniter pistillo, interdum & valenter.

Præterea attritu cuiq; moderato, non autem vehementiore aut immodico sunt verberanda. Violento enim ictu, & nimis diuturno exanimantur, viribûsque disso- lutis languent, magis tamen tenuia, rara, facultatem imbecillem, aut superficiariã sortita, minus contraria.

De his autem omnibus agam singula- rim, vbi docuero quibus horum modis, & quot singula medicamentorum sim- plicium genera terantur, initio à radici- bus sumpto.

Radices, si crassæ sint, nec adeò siccæ, in
parti

partículas sectæ, & aliis sicciorib. particu- *Comu-*
 latim adiectæ, multis scilicet paucę, pulue- *nis tri-*
 rantur cum ipsis: si autē sicciores sunt, aut *tura ra-*
 per se, aut simul puluerari possunt, sed an- *dici.*
 tē vel cultello concisæ, aut forficibus, aut
 manibus fractæ, nisi si quas antē ad siccā-
 di necessitatem excideramus in taleolas.
 Diutius autē terendæ sunt quæ crassæ,
 duræ, solidę, densę, nervosæ, membrano-
 sę, & fractu contumaces, si in pulverem
 mollissimum continui consiliū est. In-
 terdum enim minus refi volumus, præser-
 tim dum ad coctionem tantum eas appa-
 ramus. Tales ferē sunt radix acori vtrius-
 que, omnis aristolochiæ, althiæ, bryo-
 niæ, costi, helenii, gentianæ, polypodij.
 Parum diu verō terantur contrariæ, e-
 tiam si tenuissimum pulverem requiris:
 quales sunt radix calami odorati offici-
 narum, ellebóri vtriusque, herniodacty-
 lorum, pyrethri, & mediocriter quæ in ha-
 rum sunt medio radices, vt apij, asparagi,
 turbiti, behen vtriusque, dictamni vulga-
 ris, doronici, feniculi, galangæ, glycy-
 rhizę, graminis, ireos, petroselini, peronię
 vtriusque, itha Barbari.

Herbæ item teruntur, nunc virides, nunc *Herba*
 siccę: & ambæ vel crudę, vel coctę, vel cru- *tum.*
 dæ semel, iterū post coctionem, idque in
 vsus

usus varios. Nam virides ferè teruntur in succū vel cataplasma crudum: coctæ verò terūtur, vt vel in apozema exprimantur, vel in cataplasma cernantur, præsertim si quid durum aut lignosum sint sortitæ. At siccæ terūtur nunc in coctionem, sed negligentius: nunc in puluerē, diutius quidē crassæ, duræ, densæ, lignosæ, lentæ minus contrariæ. Quæ dum ad consistentiā, qua cerni possint cribro hoc illo, pro scopis medicorū variis, puenerint, teri desinunt.

Herbæ tamē propemodum omnes antè vel siccantur, vel manibus franguntur quàm terātur: terunturq; ferè mediocriter, & cum folijs interdum, etiam cum floribus. Sed tunc paulò minus diu terendæ, vti & adianta omnia, calaminthe, maiorana, origanum, rosmarinus, thymū, præsertim cum hæc postrema sunt florulēta.

Florū.

Flores propè omnes siccari, parum diu terendi, quia citò puluerantur, & faciliè puluerando examinantur ac exhalant.

Vt crocus, Nymphææ ytriusq;
Epithymum Græco- Periclymeni,
rum & Arabum, Rosarum omnium
Genistæ flos, Schœnuanthos, si
Leucoiorū omniū, ipsum haberi
Melilori, possit.
Rorismarini,

Si

Si verò cum herbis ipsis expetatur, flores paulò diutius propter herbas & harum surculos, quibus heret adhuc, terendi sunt, quam si ab his essent secreti, ut absinthij coma, anethi coma, abrotani coma, chamædrys, chamæpitys, eufrasia, melilotus.

Adde quòd floris nomine hoc loco venit non modo quod in medio est, magna ex parte croci capillamentis simile, sed etiam folia id ipsum ambientia, nunc alba, ut in chamæmelo; nymphaea alba, rosa alba & moschata: nunc lutea, ut in nymphaea lutea, chrysanthemo: nunc rubra, ut in rosa rubra, in balaustio, nisi quòd croci nomine tantum capillamenta (quòd ea in usu sint sola) intelliguntur: uti & Galenus sæpe in compo. ph. p. florem rosarum appellat, non folia illa ampla, sed in medio capillamenta.

Multum autem terenda sunt chamæmelum, quanquam id essentiae tenuis sit, quia tamen densum est, & odore vegeto ac diuturno: ac etiam stœchas Arabica vulgò dicta, ut etiam cum primis, ut Turbith, cœpta teri, ad postremum adhuc semitrita appareat: & item heliochrysos, stœchas citri vulgò appellata, & spica nardi, in quacumque plantarum parte reponatur, etiam si prius minutissimè incidatur.

Balaustium quoque, diu teri debet ob lignosa sua folia: quod autem intus est fibrosum, si per se terendum sit, promptius multò dissoluitur.

Capparis flos, siue adhuc gemma sit, siue iam apertus, siue iam in fructum seminis plenum excreuit, ferè muria conditus in vsum venit: & eius loco flos genistæ aceto & sale conditus.

Si tamen siccatur, mediocriter diu teretur: & flos lupi salictarij foliosus, qualis etiam vlmus est.

Caryophylla crassæ substantiæ ægrè teruntur, siue flores sint, siue aliud.

Rosæ igni vel sole inter papyros siccatæ, forficibus minutim concisæ, per se aut cum aliis teruntur: cum aliis autem etiam citra siccationem illam, atq; adeò recentes solum sectæ, quomodo & quosdam incidere, non terere tamen, vt saccharum rosatum fiat, scribit Mesues. Cum verò specimen edis, ne sicca: sed cum aliis tere, vt vites calumoliam.

*Fru-
ctuum
& se-
min.*

Semina propè vniuersa medio inter radices & herbas modo puluerari desiderât. Ob id cum omnia hæc simul terenda veniunt radicibus iam ceptis cōminui, semina iniiciantur, quibus etiam abundè iam comminutus, herba minutim concisæ

adici

adiiciuntur, & omnia simul conteruntur.

Talia sunt

Eruum,	Erysimum,
Agnus, Apium,	Fcenum Græcum,
Amomum,	Linum,
Anifum,	Lithospermum,
Anethum,	Lupinus,
Ammi,	Lens,
Basilicum,	Melanthium,
Carum,	Psyllium,
Cardamomum,	Papaver,
Coriandrum,	Seseli,
Cuminum, quâdo autē	Staphis agria,
viaticū volumus mul-	Sinapi,
tum teritur	Thlaspi,
Coccus baphica,	Vrtica,
Eruca,	

Et ex fructibus pillulæ cupressi, colocynthidis medulla siccata, & minutim secta, Carpobalsamum, cubebæ, galla, nux moschata, piper: & præter has dactyli, iuniperi bacca, ficus, zizipha, myxa, pruna passa, vuæ passæ: quanquā fructus hi molles sint, purgati tamen nucleo & incisi cū aliis quo dixi ordine teruntur, si in compositionem veniant: & in puluerem abeunt, si pauci siccioribus multis miscentur, aut triti cernuntur per cribrum magnum, aut cochleari ad mollem medicamenti formam, vt dactyli in diaphœnico,

Myrobalanos verò omnes multum tenuiter conteri iubet Mesues, quando earum substantiam in corpus rapi volumus, & viscera ipsa astringere, & contrahendo velut obstruere consilium est. Eadem ratione rhubarbaturum.

Siccata diu in sole semina cucumeris, cucurbitæ, melonū, & similia, quæ postea cultello concidi docebimus, per se in farinam puluerantur.

Ex seminibus autem coriandrum, cardamomum tam maius, id est, granum paradisi, quàm minus, lithospermum, & cuminum, ut sit vetricū, & ex fructibus myrobalani Arabum omnes, ut nuper dixi, ac folliculi sennæ tam diu quàm radices ipsæ teri postulât: ob id cū ipsis iniicienda.

Quæ verò seminū vel fructuum medullæ sunt oleosæ, vel cultello super papyrus identidem mutandâ incidantur, vel cum saccharo purissimo & siccissimo paucò seorsum terantur. Tales sunt medullæ seminis cucumeris, cucurbitæ, citreoli, melonis, bōbæcis, cnici, staphydos agricæ, & fructuū medullæ, amygdalarū, anacardorum, balani myreplicæ, pineorum nucleorum, pistaciorum, castaneæ, auellane.

Nux autē moschata ferè postrema iniicitur, ut in puluerem minutarū specierū.

Nam

Nam si prima iniiciatur, reliqua puluerari prohibet, suo lentore oleagino.

Semina prædicta incidi solita, si humidis miscenda sunt, per se teri possunt: si siccis, cum horum multa copia semina hæc pauca teri possunt, ut succus glycyrrhizæ, bdellium, succi. liquores prius particulatim concisi, possunt etiam (ut dixi) diu insolati per se puluerari.

In diapruno quoque semina frigida maiora & similia si addantur, cum saccharo multo hæc pauca teri possunt: sic in diaphœnico amygdalæ possunt incidi, vel cum saccharo teri. Sic papaueris semen quidam per se parum prius in mortario quassant, ut verberatum excipiat cultelli. Deinde cultello, ut prædicta, incidunt.

Hæc verò medullæ si compositis cardiacis sint miscendæ, ut edicti tempore inciduntur & misceantur potius quam cum aliis terantur. Nam vix bene menssem vnum seruantur integræ, sed rancescunt, & compositum vitiant, nisi parcum sit compositum, & mox absumendum.

Succi ficcati, liquores, gummi, resinae si recentes sunt, ob id humidi & molles, electariis mollibus, catapotiiis, vnguētis, ceratis, emplastris per se misceri possunt, vel cum aliis mollita & subacta, vel aliquo

Succorum & aliarum plantarum partium tritura.

his remediis idoneo humore soluta.

Vbi verò iā paulò mediocribus sicciores euaserūt, vt iam comminui possint, in mortario, interdum quidam horū friantur magis attritu blādo pistilli, præserūm calfacti clementérque ducti per fundum & latera mortarij, quàm verberando tundantur. Nam sub violento ictu lateſcunt mortarióq; contumaciter hærent lentore omnibus communi, his tamen maiore quàm illis, ac exhalant, exanimanturq;. Quod si immodicè siccata sint, quanquā tunc facilius puluerantur, tamē velut exanimata, & viribus priuata reiciuntur.

De moderatè siccis igitur aut paulò siccioribus nobis sermo est futurus.

Scammonium igitur (est enim id aliquando succus, vt etiam Mesues docuit, sed multò inferius scammonio liquore) & si qui similes succi ad consistentiā tam corpulentam siccando ducuntur, per se friando in mortario teri possunt: sed ferè longius requirunt tempus, & si parua sit copia, bonam sui partem mortario affixā relinquūt: quod damnum in magna mole negligimus, tamen multò satius est in eo mortario prius amygdalas triuisse, præsertim vetustate oleaginas, quæ suo lentore liquido succos adhærere prohibeant.

beant. Id quod pistillus oleo intinctus, vel oleum paucum mortario infusum & aliquandiu pistillo ductum per mortarij fundum, & latera præstabit diutius & felicius. Sit autem oleum vel dulce, vel amygdalarum dulcium, nisi succus astringens omphacinum magis postularit. Id verò oleum succos adhærere non modò prohibet, sed virtutē ipsorum exhalare, & pollinem tenuissimū euolare non permittit. Adde quod trituram & breuiorem & commodiorem & faciliorem reddit. Qualem vim Galenus opobalsamo tribuit in terenda Theriace. Acacia tamen nostrās etiā ficcior frangi contumax est, ut minutim sit potius concidenda, & particulatim miscenda puluerandis aliis.

Aloë verò cum friando teratur, percutiendo autem hæreat mortario, verum est Mesuæ de ipsa dictum, quòd friabilis sit simul & tenax ac glutinosa, quod etiam digitis explorabis. His enim friabilis est, ac his hæret ante & post friationem.

Succus glycyrrhizæ, & hypocisthis, & lycium nostrās pistillo calfacto siccatur & friatur, nisi admodum sint recentia & præhumida, vel minutim secta, tunc additur & cum aliis puluerisatur, cū ea sunt

iam cerni apta, alioqui semitrita in composito apparent.

Ex liquoribus quoque qui sunt sicciores ac minus glutinosi, per se friari possunt, ut opus Cyrenaicus, euphorbiū, thapsia, & (ut dixi) scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur, non teritur.

Opium verò cum aliis siccioribus particulatim iniectum cōmuinuitur, ut cum humidiorib. dissolvitur, quomodo opopanax, galbanum, hāmmoniacum, sagapenū. si pauca quantitate multis aliis siccioribus particulatim coniiciantur, cum his puluerantur, ut in hiera diacolo cynthidos sicca, alioqui humore aliquo idoneo, ut aceto, vino dissoluenda, & calfacta colantur, post percoquuntur ad competentem rei propositæ consistentiam.

Purgata eadem à lignis & cæteris excrementis pistillo calido quibusdam molliuntur ad fingenda catapotia, & emplastra: sed hoc modo ferè impuram reddūt compositionem. Vel dissoluuntur humore idoneo, & colantur per stamen. Sed tunc quantum excrementi colando sit abiiciendum coniecta, & ob id largiora quàm scriptura postulabit dissolue.

Lachrymæ denique tam resinosæ, ut mastichæ, terebinthina, pinea, laricea, abietina,

etina, strobilina, colophonia : quàm gū-
mosæ, vt gummi Arabicum, tragacantha,
cancamum, myrrha, bdellium, styrax, sar-
cocolla, thus, succinū, gummi amygdalo-
rum amborum, cerasi, pruni, hederæ, iu-
niperi, multū siccata, friando per se, aut
cū aliis excepta mastiche & pinea, pulue-
rantur: vt caphura quóq; siue ea sit gūmi,
siue succus, siue factitium aliquid. Eedem
verò lachrymæ recentes aliis liquidiori-
bus excepta mastiche, mistæ dissoluūtur,
vel medicamenta alia paulò ficciora dis-
soluūt. Quod si lachrymarū aliquæ suo
lentore mortario hæreant, oleo pauco i-
psam prius illinendū est, vt si myrrhā ve-
ram nec verustate ita exuccā teris : nobis
enim consuetior myrrha, maximè est per
se puluerabilis. Adde quòd mastichæ fic-
ciori ne exhalet aut euolet, aquæ rosacæ
paululum affundi potest, & aliis horū ob
siccitatem maximè friabilibus. In empla-
stra tamē satius est mastichen & myrrhā
puluerare.

Ad hæc gummi Arabicum & tragacan-
tha, si prius pistillum & mortarium cale-
feceris, multò promptius friando pulue-
rantur. Citius adhuc si paucum aquæ vi-
tæ immittas.

Thus teritur solum, non resoluitur

quibusdam : sed aqua & aceto resolui in emplastri consistentiam & oleo, sed tunc coalescere grumis non potuit.

Mastiche teritur cum paucō oleo in catapotis Hermetis ex trochiscis colocynthydis.

Myrrha vera primo die crassius teritur, post die tenuissimè pulueratur : sic bdellium, thus, vtrunque siccius, sarcocolla, styrax, euphorbium, ladanum tempore aut pistillo & mortario calido siccaturum pulueratur, recens verò soluitur oleo calente, vel alio liquore idoneo.

TRITURA LIGNORVM

& Corticum.

Ligna vt agallochum, aspalathum, gallicum, santala, xylobalsamum : & lignorum cortices, vt cinamomum, casia, cortex radicis oxyacanthæ, tamaricis, caparis, quantum radices teri postulant : stipitum eadem ratio est & malicorij, quod est mali granati cortex lignosus : sed maceis, moschatae nucis cortex mediocriter diu terendus est.

Corticis autem radicum apij, petroselinij, fœniculi, raphani, similium herbarum tritura in herbis ipsis est declarata. Turbith mediocriter terendum Mesuæ est.

Ne

Ne mireris autem cinamomum omnium æquè calidorum tenuissima substantia præditum, diu terendum. Id enim fit, quia interno cortice multum fibroso & nervoso est fractu contumaci.

METALLICORVM ET TER-

reorum Tritura.

Metallica omnia quia terrestria sunt *Lib. 3.*
substantiæ ob id crassarum partium, *c. ph. g.*
in profundum, ut ad punctum neruum penetrare non possunt.

Quapropter illis tenuitatem comparamus, subigentes diu in sole æstiuo cum aceto vetustissimo, acerrimo, tenuissimo (quod fit ex vino non austero) vini qualitatem, nihil vel minimū gustu referente: quæ quanto pluribus diebus teruntur, tanto sunt tenuiora, ob id melius purgant, tenuant, siccant.

Ex vino autem similiter trita, dein siccata sole, vel si aliud est tempus, igni, sunt meliora ducendis cicatricibus.

Lithargyros friatur, non tunditur, ne plumbum eius si chrysitis est parcius, si argyritis largius lateſcat, quod cernendo per pannum rarissimum remanet: scoria autem eius lotionē separatur, & sic emplastra fiunt alba.

Lapis armenus si inuenitur, ad lotionē

teratur in mortario lapideo, idq; diu satis: sed lapis cyaneus seu stellatus longiorē sustinet trituram Mesuæ. Teruntur in mortario marmoreo albo prius per se vniones, corallia, ne odorē, colorē, saporē alienū trahāt. Lapidū preciosorū saphyri, hyacinthi, granati, smaragdi fragmenta postea super lapidem porphyrium affusa pauca aqua rosarū, vel borraginis vel buglossi tenuissimè friantur. Sic enim fit vt promptè distribui possint, nec obstruant, adhæc nullam mortarij partem terendo deradunt, quæ puluerem augeat. Qua de causâ etiam Gal. simplicia ad theriacam in pila Ægyptia durissima conteri iubet. Per se etiam teretur vnguis odoratus.

Tritura par Partes animalium, aut animalia tota si
tiū ani assatione, vel vstione, vel aliter multū sic
malu. catæ sint, puluerantur aliorū modo: si humidæ & molles sunt, pauca cum multis siccioribus teri possunt, aut sine his teruntur, & per cribrum cochleari cernuntur. Quædā etiam liquari possunt, vt adipēs, medullæ, corymbus, deinde colari.

Stercus canum, luporum, infantū siccum etiam puluerabile est, & cantharides repositæ & castoriū siccior, sed inefficacius, & cancri fluuiatiles vsti, hirūdines vstæ, lepus vstus, renes scincorum sicci, iecur

iecur lupi siccatur, pulmo vulpis siccatus.

Fel autem ferè alijs siccioribus dissol-
uendis miscetur, rarò siccatus.

De vnionibus qui sunt velut concha-
rum quarundam partes dictum prius est,
& de vngue odorato.

Sanguis hirci siccatus facillè pulueratur.

Dentes apri, lucij, elephantis limandi aut
radendi, post terendi potius quàm vrendi, si
vires eorù integriores postulas: si ossa a-
lia & cornua, vngulæ. Tamen hæc vren-
da interdum, vt in vstione audies.

Ambra interdum minutim concisa in-
jicitur in humorem calidum, vt in eo li-
quetur, vt in Antid. diacoccu baphices: in-
terdum teritur, deinde dissoluitur affusa
aqua rosarum, vt in Anti. alepto moscha-
ta, & in alijs multis: interdum prius in
mortario teruntur duæ vel tres amyg-
dalæ, sic moschus, caphura.

Os à corde cerui, ebur, pudendum cer-
ui, tauri, cornu cerui, rhinocerotis, & si-
mililia prius rasa, post concisa minutim
cum alijs teruntur, quædam etiam vsta
promptè puluerantur.

NUNC AD ID QVOD INITIO

proposuimus reuertamur.

Teren-

PER se terenda sunt primum metalli-
ca omnia & terrea, vt lithargyros, se.

arsenicon, sandaracha, æs vstum, squama æris, scoria æris, ærugo, chalcitis, fori, misy, melanteria, chalcanthum, cadmia, pompholyx, spodiũ, si hæc duo non sunt satis læuia, plumbum vstum, cerussa, sulfur, alumen, nitrum, sal quiuis; stummi, chrysocola, gypsum, pumex, cyanus lapis, armenus lapis, calx, lapis spongiæ, iudaicus, smyris, etites, magnes, hematites, amethystus, amianthus, gagates, iaspis, saphyrus, hyacinthus, pyropus, eranus, sigillum lemnium, terra Cimolia, Cretica, Armenia, corallium quoduis. Potes tamen simul metallica multa aut terrea terere, nõ autẽ cum partibus plantarum, aut animalium. Hæc autem ferẽ teruntur super marmoreum lapidem, aut porphyrium, aut marinum, aut alium similiter durum.

Possunt tamen & in mortario teri partes plantarum similiter duræ, anacardi in confectiõne anacardina Mesuæ.

Aloë, scammonium, saccharum & saccharata penidia: nam alia reddit glutinosa saccharũ, & ea teri prohibet mastiche. Rha barbarum.

Spodium Arabum.

Caphura.

Gummi Arabicum & sarcocola.

Tragacantha, thus magis, sed tragacantha incisa etiã cum alijs teritur ne euolet.

Ambra,

Ambra, moschus, Schœnuanthos & festu-
cago, crocus.

Semina pusilla, vt papaueris, hyoscyami,
maioranæ, portulacæ, amomi vulgaris.
Hæc enim si cum aliis terantur, pistillum
eludūt, præsertim quæ cum paruitate sunt
læuia, & propè integra manent. Illorum
autē pars bona, si cum aliis durioribus &
teri contumacibus terātur, euolant & ex-
halāt, priusquam sint probè comminuta.

Animalium partes duræ vstæ, vel rasæ
vel limatæ, ossa, dentes, cornua, ungulæ
ebur, spodiū vulgi vel est ebur, vel os ele-
phantis, vel alterius grādis animalis vstū,
ventriculus interior gallinarum, res Gal.
dānata, cerebella passerum siccata, iecur
lupi siccatum, pulmo vulpis siccatus, ster-
cus cānum, & loporū & infantis, mumia,
pissasphaltum Dioscoridis putata, san-
guis hirci siccatus, sanguis draconis di-
ctus, cantharides, sericum vstū, vel inci-
sum, moschus, margaritæ, testæ ouorum,
ostreorum vstæ, vel limatæ per se terūtur.

Cum aliis quibusdam sæpe ipsorum tri-
turam, sæpè etiam facultatem, colorem,
odorem inuantibus terūtur simplicia plu-
rima, & cōposita quædam, vt moschus,
ambar, mastiche siccior, & alia eiusdē ge-
neris ob siccitatē friabilia: teruntur aqua

rosacca pauca affusa, ne portio tenuior euolet. Sunt qui & mastichæ oleum nuncum affundunt, vt in catapotiiis Hermetis apud Mesuen.

Gummi Arabicum & tragacantha citius teruntur aqua dulci, rosata, vini seu vitæ pauca affusa, si affectus non repugnet: aut pistillo & mortario calefactis ad promptiorem siccationem, hincque albiora euadunt.

Tragacantha etiam, vt os à corde cerui, rasura eboris, cornu cerui & similia minutim concisa, etiam cum aliis siccioribus teri potest.

Tragacantha verò & penidia si mortario & pistillo bene siccis cum aliis teruntur, minus eorum perit & exilit.

Myrobalani siccae quales ad nos ferè aduehuntur, affuso paucò oleo, meliores redduntur, non exhalant, promptius teruntur: yuæ item passæ & mel cum ipsis tritum ne ventri hæreant & ipsum corrugent, impediunt.

Scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur.

Colocynthidis medulla prius modicè pistillo fracta, vel potius minutim forficibus incisa teritur affuso paulatim oleo paucò dulci, vel amygdalarum dulcium, vel rosato.

rosato. Sunt qui ipsum pistillo vel mortario allinunt, alij amygdalas aliquot prius in mortario terunt, alij papyro inuolutam sole ardentem vel igni è longinquo parum diu siccant, vt crocum, rosas. Postea etiã per se facilius puluerant, vel cum aliis siccis siccata, forficibusq; sectam terunt. Alij in trochiscos prius fingunt, quales alandal Arabes vocat, priusquam puluerent.

Quæ necessitas agarico adest. prius enim serra quadam rapaci negligenter separatur, post cum vino albo paucò quozingiber purgatum sit maceratum in trochiscos formatur, siccatur in vmbra, pyxide vitrea reponitur, & cum opus est friando læuissimè pulueratur.

Caphura teritur in mortario, cui duæ aut tres amygdalæ prius fuerint affictæ, aut in eo tritæ, aut ipsarum oleum pistillo & mortario paucum sit illitum, ne terendo euolet ac exhalet.

Turbith quia per se tritum latefcit (est enim gummosum si legitimum est) vbi est modicè confractum, alia ei sicciora sunt miscenda cum quibus teratur, vt piper, zingiber, & cætera in diaphœnico & electario Indo vtroque. Per se autem cū amygdalis, vel oleo amygdalino paucò teritur ne exhalet.

Sericum crudum, incisum facillè teritur mistis tribus aut quatuor amygdalis, ipsum ne subter fugiat lentore suo continentibus, & pistillo sistentibus. Sunt qui papyro inuolutum sole vel igni parū siccant, post minutim cōcidunt: & cum aliis leuissimè terunt.

Cinamomum cū paucis amygdalis terunt quidam in Hippocraticum quod vocant vinum, ne odoris gratia expiret.

Florū.

Rha barbarum cum amygdalis facilius quidē teritur, nec euolat nec exhalat, sed minus fit purgatorium: vt crocus iura minus tingit si ex oleo teratur, id quod quibusdam pro secreto est. Crocū enim ad iurium, carniū & aliorum ciborum condimentum, vel etiam ad frōtes librorum tingendas nouo quodā modo terūt. Papyro enim interpositum, vel sine hac sartagini impositum igniq; admotum longulè, sed parū diu, vel soli diutius siccant, vt villosa eius natura promptius terēdo rūpatur. Ne verò exhalet, ac vt promptius teratur, & coloratio euadat, olei dulcis pauxillum vt guttas 4.5. in uncias singulas affundunt, vel pistillo illinunt interdum tam largiter vt improbè rubeat, ob idq; ab archiparmacis damnatur. Sed vt sit coloratio, minus tamē tingere putatur quā

quàm qui sine oleo tritus sit.

Opulentis verò cum saccharo paucò potius teritur, si verò humorem alium olei loco acceperit, etiam coloratior euadit, sed humore in vaporem soluto flauitiem naturā repetit, & minus vulgo probatur. Verumtamen croco nostrati hoc mangonio ad coloris gratiam opus est, ceu parum cocto ob soli & cæli naturā frigidiorē. Qui verò crocus à Galenō laudatus est colore flauissimo, odore vegetissimo, etiam diu postquā seruari cœpit, acquisititio hoc colore non indiget. Crocus verò ut spica, macis, colocynthis, sericum, rosa, & alia plurima ante trituram inciditur.

Euphorbium dum teritur per se puluisculo acerrimo in nares euolâte & oculos, has partes valenter mordet, sternutamentòq; implacato hominē torquet, ob id ea molestia nouitios fatigat, ut sæpè illis nares sanguine fluant, plurimis caput vehementer doleat. Has autē ab euphorbio noxas prohibebis, si oleum paucum aut amygdalas miscueris, quæ lētores quoque etiam puluisculum illigent ac retineant.

Sunt qui myrrham, bdellium, cancamum, gummi hederæ etiā ex oleo terant, ne tenuior portio euolet ac virtus exhalet,

halet, néve mortario hæreant.

Opopanax, galbanum, ammoniacum, sagapenum, bdellium, ladanum, acacia vulgaris, opium, hypocystis, asphaltum, ficcior terebinthina, qualis frequens Venetias conuehitur, & alia non pauca succorum liquorum & lachrymarum genera, vel minus siccata, quam vt per se puluerari queant, vel nervosa & velut membranosa & coriacea, & fractu contumacia cum alijs ficcioribus teruntur, sed prius incisa, vel aliter in portiones paruas redacta, quantitate tamen parua multitudini aliorum ficciorum immista paulatim cum illis puluerantur, vt in hiera diacolocynthidos, & alijs compositionibus multis. sic Crocus, flores etiam recentes buglossi vtriusque, rosarum & cæterorum. Sic Trochisci Galliae moschatæ & alij, sic Dactyli intus & foris purgati, ficus, vuæ passæ, myxa, zizypha passa, baccæ lauri, myrti, iuniperi, oxyacanthæ, visci quercini, anacardi, amygdalæ, auellana, strobili, pistacia, nucum reliqua genera & gladium, semen cucurbitæ, cucumeris, melonum, citreoli, citri, cydoniorum, Sinapis, Cannabis, Cnici, Xyli, Cerasi, Pysyllij, Lini, & similia. Sic sericum, Lana, Pili minimum concisa cum alijs ficcioribus teruntur

tur potius quàm vsta eadem per se: Nam vrendo vires amittunt priores, & nouas ab igne, & iis quibuscum vruntur acquirunt, ob id non vrenda, nisi medicus doctus iusserit, vti nec ebur, cornu Cerui, caprae rhinocerotis, pudendum Tauri, Cerui, siccatum. Hæc enim vel in longū rasa & incisa, vel etiam limata, vulgari lima, aut rapaci serra cum alijs siccioribus puluerantur.

Adde quòd quædam aut per se, aut cū humore aliquo teruntur, & cum eodem bibuntur vel aliter vsurpantur, vt vinca, coma amaranthi cum vino, seseli, satyrion, pœonia, gnaphalium ex vino austero teruntur & bibuntur.

Aristolochia rotunda lupini ex aqua cum posca bibuntur, aut cum melle linguntur, & alia permulta eius generis exēpla apud Diosc. & Galen. in medicamentis simplicibus & compositis inuenies.

Sic bdellium saliuā matutina & hominis ieiuni subactum digitis in emplastri consistentiā vsurpatur, & alia alio modo in vsum veniunt cum humore aliquo trita, vt in compositis latius leges.

Ad aurium vlcera vino, vel dulci, vel *Lib. 3.*
austero, vel veteri, vel medio ætate, vel *c. pl. p.*
aceto, & eo acido, vinoso, acri, pro scopis

variis ipsorum, remedia non simplicia solum, sed & composita teruntur: sic ad oculorum affectus collyria sicca ex humore idoneo teruntur, & applicantur, & in aliarum partium affectibus similiter.

Clementer frianda in mortario quorum virtus attritu violento promptè exhalat, aut substantia sub ictu valido latefcit & mortario hæret, aut quæ multum sunt friabilia vt caphura, ambra, moschus, mastiche, myrrha, bdellium, thus, gummi iuniperi (vernitem vocant) cancamum, farco colla, opus cyrenaicus, euphorbiũ, aloë, scammonium, styrax calamites, bolus Armenia, terra lénia, & terra propè reliqua, & metallica, amylum, cerussa (quin hæc duo sæpe tantum cribro affricamus) saccharum, sanguis draconis, castorium, radix ari, draconij, hermodactylorum, ellebori vtriusque, turbith, rhabarbarum, spodium, Arabum, trochisci agarici, dum scilicet quæ aliquando humida fuerunt, iam siccata sunt.

Quorum si qua adhuc sint paulò humidiora, pistillo & mortario calefactis mox siccantur, & simul puluerantur, friando continèter. Quod auxilium succis, liquoribus, gummis, resinis etiam mediocriter fluidis confert: sed eò frequentius & diu-

tius calefacienda & terenda quo illa fuerint humidiora, vt spes fit etiam oleum ipsum & terebinthinam venetam hoc ingenio pulueratum iri, atque adeò argentum viuum cum saluiae succo.

Sed lapides pretiosi & metallica scilicet puluerantur super lapidem marmoreum, porphyrium, aut marinum per molulam ducta, liquore idoneo pauco, ne puluisculum cuolet, identidem affuso qui postea euaporet.

Argentum viuum sublimatum & precipitatum, cinnabrium vulgare, alumen scissile, quia cæteris tenuius sit puluerantur, vel etiam in mortario metallicorum aliorum modo.

Valenter tundenda reliqua vt quæ ob duritiam, crassitiem, lentorem, densitatē ægrè separantur, vt radicum corticum, lignorum, herbarum seminum plurima.

Qualia sunt radices althææ, apiij, asparagi, aristolochiæ, asari, asphodeli, bryoniæ, behen, centaurij magni, cyperij, cyclaminis, costi, calami aromatici, cucumeris agrestis, dauci, doronici, dictamni vulgaris, helenij, eryngij, fœniculi, filicis, galangæ, gentianæ, glycyrrhizæ, graminis, iridis, mandragoræ, nardi, petroselinij, pyrethri, pæoniæ vtriusque, polypodij,

zingiberis, cortex radice caparis & tamaricis, & alij, & ligna omnia. herbae ite omnes praesertim siccae, flores chamemeli, schœnuanthos, & eius festucago nobis consueta pro flore, spica nardi, balauistiū, caryophyllum, & flores reliqui tam recentes quam sicci, semina anisi, anethi, cari, cumini, coriandri, foeniculi, foenigræci, lini, lupini, & reliqua, folliculi sennæ & fructus reliqui, succi, liquores gummi, resinae in particulas sectae, & aliis inter terendum particulatim adiecti.

Limaturæ & rasuræ, & rapturæ ossium, cornuum, pudendorum.

Quaedam parum diu sunt terenda, quia rara, tenuia, friabilia, virtutem superficialiam aut imbecillam sortita, quæ paucā sustinere trituram vulgus ait, viribus scilicet integris, de quorum quibusdā sic Galenus scribit lib. 4. c. ph. g.

Quæ ex succis & liquoribus, & lachrymis resiceatis proueniunt, ut myrrha, aloë, acacia (scilicet vera) & quæ his sunt finitima, *ωλεσίστα* sunt, & facile læuia fiunt, ac promptè in puluerē molliissimum abeunt, ob id non diu terenda, ne ipsorum & virtus exhalet; & substantia tenuior euolet, ut eaphura, ambra, moschus, & alia propè vniuersa, quæ clemēter terēda scripsimus.

Quin

Quin & euphorbium parum diu terendum Mesuæ est, & spodium Arabum ex cannarum vltis radicibus: nam ex ebore vsto spodium, quod vocant, mediocriter terendum. Quod autem Græcis est spodiū, id est cinerula, & huic affinis (sed præstantior) pompholyx non teritur, tantum linteo cernitur per lotionem, aut etiam sine lotionem.

Adhæc quæ acria & facile inflammabilia sunt, vt resinæ, liquores, gummi, quædam parum diu terenda. Nam tenuem horum substantiam calor motu accensus dissipat, & reliquum inflammat.

Sunt præterea quædam tam friabilia, vt etiam digitis attrita læuigentur: vt agarius bonus, ari & dracunculi radix siccata, asphodeli radix vsta, quanquam illas multam coctionem sustinere dicat Mesues: Nam recentes intelligit non siccas. Sic amylum, cerussa, calx ex teneriori lapide. Nam ex duriori vix hora post vna, etiam affusa aqua solui incipit, ea quæ ad lithocollam multò præstantior iudicatur, quanquam minus multò alba est.

Quædam multum diuque terenda sunt, vt compositioni sint apta, vt quæ crassa densa, dura, lenta, virtutem profundâ aut validam, & ægrè solubilem sortita, quæ

multam sustinere trituram dicimus, viribus seruatis, vt metallica, lapidosa, lignosa, neruosa, membranosa: quæ tamen ob scopos medici varios nunc crassius, nunc in pollinem mollissimum terenda sunt, vt cum oculis applicanda, vel vreticis miscenda. Sic enim asarum, cuminum, & alia permulta læuissimè terenda sunt, cum per hæc obstructa expedire, distributionem alimenti in corpus iuuare, vrinas mouere consilium est.

Myrobalanos quoque omnes quando per earum substantiã viscera contrahi & roborari volumus, mollissimè teri iubet Mesues. Eadem ratione rha barbarum, quanquã tunc etiam magis vreticum est, vt purgatorium magis, si crassius teratur. Quod autem purum est ac probatissimũ intellige: nam rarius & laxius à vehementi & diuturna contritione resolutum examinatur, virtutemque perdit Mesuæ. Sic radices aliæ etiam aromaticæ vt exactè puluerentur, diu terendæ sunt, acorus, aristolochia, bryonia, centaurium maius, cyclaminus, cucumis agrestis Mesuæ, coctus, cyperus, enula, galanga, iris, præonia, pyrethrum, polypodium, zingiber. Pauca autem tritura sunt læuia, agaricus trochiscatus, & radices aliæ clementer friandæ.

Metal

Metallica quoq; (inquit Galenus lib. 4. c. ph. g.) galla, cytinus, malicorium, Ægyptiæ spinę fructus, & id genus omnia sunt *Ανελήνια*, id est ægrè leuia, & tenuia puluerando euadāt. Metallica autem illa intelliguntur, lithargyros, arsenicum, sanda racha, æs vstum, ærugo, chalcitis, chalcanthum, cadmia, tam fornacaria quàm lapidosa, plumbum vstum, molybdena, sulfur, alumen, stummi, chrysocola natua (factitia enim facilius pulueratur) gypsum, cyanus lapis, & armenius : sed ille magis, & lapides reliqui, & bona pars aliorum quę per se terenda diximus.

Colocynthis accuratissimè debet teri ob causam à Mesue dictā, in simplicium purgatoriorum facultatibus, etiam si ea ob valentem vim purgatricem prius vacuari, quàm amaritudo eius agat, & tergeat, dicatur Galen.

Scammonium quoque exactè terendum, nisi cum in catapotia venit. Tunc enim crassius tritum diutius in ventriculo manet, potentiùsque agit.

Sic ossa, cornua, etiam vsta, pili, lana, sericum.

Plenam quoq; triturā sustinet centaurium paruum, etiam cum floribus Mesuę herbę, etiam alię quę siccę seruantur.

Mediocriter puluerando terenda sunt propè cetera, vt radices apiij, asparagi, asari, nisi mouendū sit lotium, cichorium, calamus aromaticus officinarū non teredinosus, dōronicū, dictamnus vulgaris, fœniculum, glycyrrhiza, gentiana, gramen, hermodactylus, iris Illyrica & Florentina, meū, radix mandragoræ, nardi, cœnāthes, petroselini, plantaginis, phu, rubiæ, rusci, raphani, rhapontici, zingiber, zurūber: sic herbæ acres & aromaticę, vt hyssopus, thymus, nisi mouere menses, aut vrinās volumus, & ob id diutius terimus.

In summa, quæ diu coqui possunt, debent etiam & teri: quæ parum diu coquenda, parum diu terenda: quæ mediocriter illud, hoc mediocriter ferunt, ob id trituram nonnihil clariorem tibi reddet coctionis cognitio.

Nec te moueat quòd quædam audis parum & mediocriter, vel multum & mediocriter terenda. Nam cū huius mediij magna sit latitudo, in ea quædam sunt extremis tam propinqua, vt vix secerni queant. Sic agaricum mediocre sustinere trituram Mesues scribit, aliis placet paucam, non tamen paucissimam. Quæ ratione etiam de primarum qualitatum ordinibus dissidia scriptorum illustrium

concilianda scripsimus in methodo medicamenta componendi.

Quædam tenuissimè sunt terenda, vt promptius id actu fiant quod esse potestate dicuntur, vt quæ celerius in partes omnes afficiendi corporis permeent, siue fermentationē (vt dicunt) quærimus, siue firmationem, & robur, siue materiarum incisionem, tenuationem, terfionem, vacuationē per vrinas, menses, sudores, insensilem transpirationē: Sic cordi, hepati, & partibus cæteris internis, præsertim longè ab ore distitis roborandis idonea, ab his vacuatura, obstructiones liberatura, vrinas aut menses motura tenuissimè pulueramus, vt essentia quadã tenuitate inde acquisita, & corporis sui mole exigua, promptius per oscula vasorū angusta, & per corporis habitus poros sensum latentes permeent, agantq; citius quod agere nata sunt: Ob id species omnes in hiera Galeni picra mollissimè terantur, & cribro serico cernantur, vt aloës, & aliorum vis in angustos ventriculi & partium vicinarum meatus penetret. Sic in theriaca, Mithridatio, aurea Alexandri antidoto, & similibus polychrestis cōpositionibus leuissimè terenda, vt promptius in se agendo & patiando, velut fermententur citius,

& sint vsui. Dum enim recentia sunt hæc opiata medicamenta, stupefaciendi vim præpollentem retinent. Non tamen omnino tenuissimè sunt pulueranda: nam sic eorum vis aromatica exhalaret.

Omnia stupefacientia dictis Antidotis, vel aliis miscenda, aut etiam per se vtenda sunt tenuissimè pulueranda, vt in paruos meatus, & longè positas, profundasque partes stupefaciendas penetrare, aut pertrahi possint.

Affectibus hepatis puluerata tenuiter debètur, tenuius lienis, tenuissimè renū & vesicæ affectibus, vt per ora vasorū angusta subeant. Sic thymus, asarum, cuminū, & similia tenuissimè teruntur in aurea, in hēmagogo, in diacurcuma maiore, in dialachā maiore, & aliis similibus: in aluum verò subducētibus diospolirico, cōfectio ne Hamech, electario Indo maiore crassius eadē sunt terēda. Omnino etiam tenuissimè puluerentur debita affectibus oculorū, ne si crassiusculus sit puluis, aspera inæqualitate, & attactu oculi tunicas eximiē sentientes dolore afficiat: præsertim si metallica sunt, aut lapides, aut similiter dura & sicca corpora. Saccharum enim candidū, bolus Armenia, etiā si minus exactè trita oculo imponūtur, humore ex

te ex ipso delachrymâte mox soluuntur.

Terenda quoq; in puluerem mollissimū, quibus crassius tritis vis noxia & malefica inest, ut ea terendo vanescat, ut in colocynthide. Crassius enim trita cum sit spongiosa, humore superfluo imbuta tumescit, negotiūmq; tunc magnū facessit pōdere, mole, moriū partibus quibus incubuit. Quæ incommoda puluisculis eius accidere nequeunt, quia humoris non sunt capacia. Crassius tamen terēda cum in trochiscos alandā est formāda, sed ter quaterq; puluerandi trochisci & reformādi, ut ea tenuissimè tandem pulueretur. Eadem ratio est de agarico, substantia illi simili. Sed cum sit non paulò clementior, trituram minus accuratam postulat.

Rha barbarum quoque curiosè terendum, quando viscera astringendo roborare, aut etiam urinas mouere oportet, uti & myrobalani.

Quædam crassius terenda, quæ in ventre diutius morari volumus, nec promptè vasorum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, ut in ventrem partē minus principē, & vacuationi expositissimam ex corpore reliquo trahāt. Nō autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant, cum ad has facultate,
aut

aut saltem vapore ferri, vel quod plurimum sit, portione paucissima sufficiat.

Crassius etiam teruntur, quorum virtutem multa tritura dissipari metuimus: sic scammonium vim purgatricem multa tritura perdit.

Eadem ratione stomachica crassius terenda, ut mora in ventriculo longa coctionem facilius iunent, neque cibo facile vis eorum obtundatur. Quæ præterea sunt aromata virtutem colato datura, & odoris ac saporis gratiam, non auctura substantiam: sic cinamomum negligentius terimus, quo quæ colantur aromatzamus: & cardamomum, zingiber, caryophyllum, macis, lignum aloës, spicâ, crocum negligentius teris: per hæc & pannum rarum colaturus ænomeli.

Quæ item flatus dissipatura sunt, eadem ratione crassius puluerâda sunt, ut in diosporitico seu diacymino simplicia et purgēt, & diutius in flatus agât, licet tardius & imbecillius quàm si tenuata magis eisset. Id quod si fieret, parum diu flatus dissiparent, tum quòd vires citius eis frangeretur, tum quòd per vrinas mox secederēt.

Diosc. tur, tum quòd per vrinas mox secederēt.
Gal. li. easq; mouerēt, cum calida sint & tenuia.
4.c. ph. Quædam præterea tantum crassius sunt
3. frangenda ad vstionem futuram, ut lithargyros

gyros vrendus frágitur in partes magnitudinis iuglandis: lapis phrygius vrendus in partes nuci auellanae æquales.

Quædam etiam teruntur vt purius lauentur, de quibus in lotionibus abundè.

Ex his patet eadem medicamenta, nunc tenuius, nunc crassius terenda pro variis medicorum scopis, vt rha barbarum, asa-rum, nitrum, thymum, calaminthen, irin, hyssopum, pulegium, origanum, cuminum, curiosissimè teri volumus cum Galeno & Mesue, quando his vrinas mouere nobis studium est: negligenter verò, cum aluum mouere constituimus.

Sic scammonium, colocinthis, & alia valenter purgátia, nunc crassius cum illud in pillulas, hæc in trochiscos transit: nunc tenuius ob dictas prius rationes. Rha barbarum tamen ferè tenuius teritur, vt colocynthis tenuissimè, cum mox & citra aliam per trochiscos trituram sumenda. Scammoniū quoq; crassius teritur, si coquendum est cum aliis, aut diu ante vsum seruari debet medicamentum. Iq; ne vis eius coctione per ignem aut longuā fermentationem exhalet.

Et quæ partes remotissimas petere volumus, leuissimè: si eadem ventriculo, intestinis, & primis venis, hæere diutius,

cras

crassiusculè terenda sint.

Ex his omnibus simplicium simul terendorum ordo quidam instituitur, vt prima iniiciantur mortario, & terantur crassa, dura, lenta, vt radices, baccae quædam. Semina propè omnia, vt quæ etiam glutinosa medulla constant. Paulo posterius aromatica etiam æquè teri contumacia, vt iuncus odoratus, calamus odoratus, zedoaria, zingiber, galanga, iris Illyrica & Florentina, seu nostrâs alba, costus, & cardamomum, carpobalsamum, cubebe, piper, nux moschata. Post hæc autem simul cum his xyloaloë, xylobalsamum, cassia, cinamomum, caryophylla.

Deinde succi, liquores, lachrymæ puluerabiles cum aliis de quibus antè, & quæcû quibus aut per se terenda sint, diximus.

Semina verò oleosa, vt cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, cnici, cidonij, pistacia, strobili, amygdalæ, & similia sunt excorticanda, deinde incidenda scalpro, vt mox audies, ne puluerè reliquũ glutinèt, & per cribrum transmitti prohibeât.

Mineralia etiam ferè per se & seorsum teruntur, affusa interdum ob eorum siccitatem aqua pauca, ne substantia eorum tenuior euolet, aut vis exhalet, vt antè docuimus. Chalcitis autem, chalcáthum, z-

rugo,

ruco, sulfur, sandaracha, & alia quædam adhuc nō nihil humida, humectari nolūt.

De succis, liquoribus, lachrymis, & animalium partibus abundè prius est dictū.

Mortarium papyro vel corio etiam interdum duplici est tegendum (vt in Theriaces compositione diximus) interdum ne puluis tenuior, præsertim preciosus foras euolet ac pereat: interdum ne is qualitate malefica præditus nares batuentis mordendo malè habeat, vt in Euphorbio & Turbith, & aliis non paucis euenit.

Ad trituram præparant, vel trituræ loco sunt, attritio in cote medica, mansio, sectio, fractio, rasio, limatio, raptura.

Atteruntur in cote medica (qualis est tonsoria) cum albuminis oui liquido, vel lacte, vel succo rosarum, vel seminis fenigræci, aut cydoniorum, aut maluæ, aut althææ, ipsa collyria sicca, siue iam in pastillos formata, siue adhuc integra: sed tamen atteri apta, vt materia hæc tenuior & mollior contactu suo dolentem oculum non exasperet.

Ad attritionem confricatio amyli, aut cerusæ ad cribrum facta, vt puluerentur, est referenda.

Manduntur ad oris partium, faucium, asperæ arteriæ, pulmonis, œsophagi, ven-

triculi affectus, vt ad dentium dolorem
vinca, ligustri folia & germina, radix che-
lidonij, plantaginis, anemones, Galeno
manduntur in simplicibus.

Secantur radices crassiores, longiores
herbæ, virentes albæ aut siccæ, & flores
magni, vt nymphææ, rosarū, croci, & me-
dulla colocynthidis, & acacia nostrâs, &
troch. Galliæ: & capillatia, vt sericum, pili,
lana: & ligna, vt gaiacum, santala, berfi-
lium: & ramenta & velut bractæ olæ ferra-
mento abrasæ, cornuum, vngularum, os-
sium, eboris, pudendorū, coriorum, ich-
thyocollæ, taurocollæ, & similia.

Secantur autem quouis ferramēto in-
cidente & forficibus: ligna autem etiam
ligneo pistillo acies ferreas acutas haben-
te. Horum verò quædam post sectionem
in decocta & infecturas veniūt, vt gaiacū,
berfiliū, & quæ ex aliis voles. Alia, vt fœ-
licius & citius puluerentur, antè radun-
tur, post secantur. Sic de fractione, rasione,
rosione, raptione, limatione cēsendū est.
Ea scilicet nunc ad trituram interuenire,
nunc ad coctionē tantum, vel vsum aliū.

Scalpro autē sutorio huc illuc inclinato
identidem ac reclinato, vel cultelli verbe-
ratu crebro, vel duobus tribusue cultellis
inter digitos manus, vel alterius tantum,
vel

vel vtriusq; præhensis inciduntur minutissimè semina oleosa & maiuscula, quia sub ictu pistilli lateſcunt & pingueſcunt. Inciduntur autem per se, prius tamen depellata, aut cum paucò saccharo, ne etiã sic immodicè pingueſcant & oleosa fiãt: supponitur autè iis folium papyri purũ, sæpe mutandũ quãdo scilicet iam discissum est, & huic folio lignũ leue & politũ.

Sunt verò secunda hoc modo semina cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, bombacis, cerasi, pruni, amygdalarũ, pistaciorum, strobilorum, anacardorũ, balani myrepſicæ, castaneæ, auellaneæ, iuglãdis, tribuli aquatici, cnici, staphydis agriæ quæ aliter quoque teri posse prius docuimus in seminum tritura vniuersali.

Dactylos quoque intus & foris curiosè purgatos similiter incidimus, si condita cardiaca ingrediuntur.

Est tamen quando eos negligenter incisos cum aliis ficcioribus terendos iniicimus, præsertim si pauci sunt & multum ficii: aliquando tantum aceto horas aliquot vt 12. maceramus, terimus, per cribrum cochleari, vel manu impellente cernimus, vt in diaphœcnico, in quo etiam amygdalas cultello depellatas cũ dactylis aceto maceratis quidã terunt & cernunt.

Frangimus manibus tenera & minuta, vt herbarum pugillos intorquendo digitis abrumpimus, & radices pusillas & fragiles, cortices parum frangi cōtumaces. Ægrè enim fragilia ferramētis secamus, aut pistillis tundimus.

Radūtur vt ante dixi, ebur, cornua, & vngulæ, pudenda siccata, coria siccata, ichthyocolla, taurocolla siccior, lignum gaiaci, berfilium, & quædam alia vt facilius vel coquendo vim suam humori cui incoquantur, impartiantur vel terantur. Raditur & cortex turbith exterior, donec albū appareat Mes. Sic radix glycyrrhizę ante triturā raditur, & aliæ radices, & ipsarū vt aliorū cortices, sed id ad purgationem magis pertinet, de qua postea dicemus. Raduntur quoque rapaci serra, lotus, lignum gaiaci, buxum, suber, ebur, & dura alia quæ etiam dum serra vulgari secantur, scobem reddunt non dissimilem illi quam rapaces serræ ac veluti rudes & crassæ limæ elidunt.

Ferri præterea albi lamina tenui, curuata, foraminibus multis exasperata cōminuimus affricando agaricum, nucem moschatam, zingiber. Mala item cydonia, vt succi hoc plus reddant, quàm si in mortario terantur.

Limatur

Limatur præterea aurū, argentum, æs, ferrum, chalybs, plumbum: quædam ut vrantur, postea terantur: alia ut etiam citra vstionem in usum veniant, ut aurum, argentum, sed horum duorum limaturæ loco satius est auri & argenti foliis uti. Limantur quoque ligna prædura, gaia-cum, santala, berfilium, ossa crânij huma-ni, dentes & maxillæ lucij, dentes apri ex-erti, & castoris, cornua cerui, capri, rhino-cerotis, & ungulæ quorundam ex his, ac-cubur. Pudendum quoque tauri, cerui, ich-thyocolla, taurocolla, quæ etiam radi & secari docuimus.

Ratio autē limationi finitima est, sed samēta sunt maiora limaturis, quia horū instrumēta sunt insignius, sed rarius den-tata quàm limæ. Radēdi quoque modus est alius in lignis edolandis, qui ad tritu-ram quoque, & coctiones vsui esse possit.

DE CRIBRATIONE.

His terendi differentiis ordine opti-mo succedit cribratio; qua purū & minutius secernimus, quomodo pistorēs similaginem, & farinæ florem puriorem ac tenuiorē à fursurea & crassiore sepa-rāt. Cribrationis ratio eadē est quæ tritu-ræ, ob id quæ tenuiter puluerāda, tenuio-re cribro sunt cernenda: quæ tenuissimē,

tenuissimo, vt pulueres dicti cordiales cri-
bro sericeo, tafetum vocat vulgus, inter
manus agitando cribratur metallica, ad
oculos tenuissimè terenda, & cribro te-
nuissimo cernenda: sic vrinas mouentia,
obstructiones liberantia. Cōtrā verò quæ
aluū mouere & purgare volumus, cras-
sius terenda, & cribro crassiore ac ratio-
ne cribranda sunt. Et quæ per se teruntur
si cribranda sint: per se cribrantur, vt me-
tallica quæ aliis mista citius, & ante iu-
stam puluerationem descendunt.

Cribramus autē interdum ad trituram
meliorem, frequentius ad misturā aptio-
rem rerum iam mole minimarum. Quæ
enim cribrum non permeauerūt, trituræ
reddūtur: quæ crassius terenda sunt ratio-
re, vt dixi, cribro cernenda: quæ tenuius,
densiore, vnde varia cribrorum multitu-
do fuit necessaria. Quædam enim cortice
tiliaceo, angusto, sed æquali, cancellatim
connexo constant, cribrando scobe gaia-
ci, vel agarico insectorū, & similiter cras-
siusculè tritis idonea. Vidi & ex assiculo
terebella passim pertuso cribrum argillæ
colandæ idoneum, alia his minus lata ha-
bent foramina, neque vt hæc quadrata
sed rotunda, vel oblonga in pergamena
circulo ligneo subsuta, quibus triticum,
hordeum

hordeum & alia cerealia, sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minutioribus purgamus. Hæc enim per lata foramina ob paruitatem facile descendunt: semina bona foraminibus maiora retinētur.

Alia seta equina in telæ modum cancellatim contexta constant, circulis duobus ligneis vtrinq̃ue tensa, quorum inferiore hæc præhenduntur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continentur. horum verò cribrorum copia & differentia magna est, & usus plurimus. Quædã enim solum in medio ligneorum circulorum habent velut telam illam equinam, & his manu tantum molliter succussis, pulvis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum descendit, superna eius parte interim papyro tectane pulvis euolet. Eoque utimur in pulueribus parum pretiosis.

Alia præterea fundum & operculum habet exemptile, sed vtrunque corio uicino clausum: illo pulvis per cribrum transmissus excipitur, & probè ne exhalet aut euolet cohibetur, hoc ne portio cernenda exhalet, aut euolet prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentia, quarum singularū suus est usus, nō modò ad medicamentorum te-

rendorum genera, sed etiam ad componendorum speciē variam constituendā.

In his item quædā telæ equinę loco fericum habēt (tasērum vulgus vocat) & id vel album pulueribus electariorū alborum, vt diatragacāthi, diairis destinatum vel rubrum debitum, pulueribus electariorum rubrorum, vt diarhodi, dia trium santalorum, diacubebe, diamargariton.

Vsurpatur itaque id cribrorum genus aliis pretiosius, ad pulueres etiam pretiosos, & vt vocant cordiales, neque vt præcedentia seta cea lignę mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succussando, sed manibus tantum mollissimè versantur, vt sine violentia puluis tantum tenuissimus descendat.

Est etiam linteum magis minus, rarū, densum, cribrum loco in metallicis præsertim, & terreis corporibus: Latius autē id est, remque cernendā comprehendit, ac inter pyxidis alicuius lignę vel alterius, sed grandiusculæ operculum & corpus concluditur & constringitur, deinde vna manu ferè violentius succutitur super abacum pharmacarium, vncia vel simili pondere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso, vt id suo motu & pondere res has cerni difficiles acceleret, quem cernendi.

cernendi modum cicotrinizare vulgus vocat, voce ex *λεοντις*, id est, cribrare corrupta, & in id contorta.

Vt autem radices, herbae, semina, fructus & alia pleraque cruda, & cocta teruntur, etiam cribrantur: sed ferè vi manus aut cochlearis quomodo cassiam & thamarindos sine tritura cernimus: sic radices eryngij, satyriorum, raphani, dracontij coctae, tritae, cribrantur in diasatyrio.

Sed haec cribratio immoto fit cribro, quae verò puluerum est cribratio, ferè fit cribris abaco incussis valenter, sed nume rose, vt taratantara audire videaris. Alia cribro manu suspensa agitato, alia vt cardiaci cribro inter manus versato, non in abacum incusso, ne etiam horum partes crassiusculae vi impactae per cribrum permeent. Alia pyxide duro corpori manu vna valenter allisa.

Cerusa & amyllum, & cerusa serpentaria cribro affricantur manibus: sic quae citra trituram cernuntur.

Quae autem cribrum non superauerunt ob crassitiem, teruntur donec ob tenuitatem tota cernantur: nisi quod dum paucissimum superat, idque tenuissimo proximum, cæteris iam cretis commisceri solet aut seruari, vt aliis eiusdem generis, vt postea

terendis & cernendis iterum misceatur.

Colatio cribrationi licet genere & natura sit affinis, quia tamen nō est siccorum, sed magis liquidorum, ob id in alium locū referenda fuit, tanquā dissolutioni, coctioni, infusioni, clarificationi, & aliis plerisque præparationū differētiis necessaria.

DE DISSOLVTIONE.

Dissolutio autem seu dilutio tritura quædam esse videtur, quod per hæc medicamenta tam simplicia quàm composita læuia fiant, sed adiecto humore aliquo, non etiam sicca permaneant si prius erant, vt se ad trituram habeat hæc, quomodo colatio ad cribrationem.

Solutio igitur seu dissolutiō, seu dilutio est medicamenti vel simplicis, vel cōpositi consistentia crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistentiam, vel mediocrem, vel paulò hac crassiorem aut liquidiozem, pro medicamenti soluendi, & humoris soluturi quantitate & cōsistentia, & aliis medici scopis.

Quod enim minus erat crassum & humore perliquido, eodémque largo est solutum, erit liquidius, cōtrarium crassius.

Huius autem dissolutionis multæ sunt causæ. nunc enim dissoluimus vt medicamentum facilius & iucundius deuoretur,

& citius distribuatur & subducatur, cum facilius sit & iucundius sumere liquida quàm crassa: vt facilius & gratus est impleri potu quàm cibo. Sic opiatas, cassiã & alia plurima quotidie dissoluimus.

Nunc vt aliis ad compositionē promptius misceantur, & vnà cum his aut etiã per se coqui possint, quòd sicciõra ipsa promptè vrerentur. sic succos, liquores, lachrymas frequenter dissoluimus, vt euphorbium recens oleo dissoluitur, vetus autem fortasse non dissoluitur Mes.

Nunc vt in partem affectam possit medicamentum penetrare, aut illi applicari & adhærere. Sic in aurem iniicienda, in intestina, in vterum, in vesicam, in sinum aliquem liquidiora reddimus.

Sic ladanum oleo largiore soluimus in capillato aut etiam modicè tonso quàm in raso.

Nunc vt colari & colando purgari ab excrementis possit, vt liquores, aceto vel alio humore idoneo soluti colantur, & purgãtur, Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenũ: Sic succi siccati, gummi, resinæ recentes aliquãdo & veteratæ ad electariorũ mollium, catapotiorum, linimẽtorum, vnguentorum, ceratorum, emplastrorum misionem, sed lachrymæ

resinosæ, oleosis: gummosæ, aquosis humoribus melius solvuntur: vel ipsæ recentes alia sicciora dissolunt, sed vt dixi similia magis, idque dum molle medicamentum est futurum, in quem usum multa quoque huius generis coquantur. Eadem portione parua cum multis siccioribus teruntur, vt in puluere hieræ diacolocynthidos.

Lib. 8. Lycium aqua diluitur Galeno ad hæmorrhagiam.

Lib. 4. Pix liquida cum melle lingitur.

c. ph. p. Tragacantha in oui albumine soluitur in arteriacam.

Fel scari piscis cum myrrha stacte miscetur, stomatica medicamenta dissoluntur aqua vel malsa ad gargarizandum, dissoluntur humore quouis & sine calore, promptius cum calore.

Bolus Armenia vera, terra lemnia vera, calx, sal, saccharum, saccharata omnia, manna, cerussa post longam velut bullitionem, chalcitis, chalcanthum, ærugo, rubigo: sed hæc oleo citius mollescit.

Dissoluntur aceto forti, præsertim destillato vel succo limonum vniones seu margaritæ testæ ouorū, lapides renū, vesicæ, coraliū vtrunque, eaque post siccata promptè friantur. Præcipitatu & sublima

tum

tū & cinabriū, in argentū viuum redeūt.

Etiā aurum & argentū & metalla alia suis valentibus aquis dissoluūt chymistę.

Soluuntur ergo simplicia quidē ammoniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, thus masculum, opium, scammonium, aloë, hypocistis, succus glycyrrhizę, pissasphaltum, mumiam intelligo, aqua simplici, aqua vini, vino, aceto, similibus & his frigidis, sed longiore tempore quàm calidis. Feruentibus enim his humoribus prædicta citò soluantur: priora quinque in lacteum quēdam succum, posteriora totidem in nigrum.

Opium soluit sapa Galenus in trochiscis dia opiu.

In oleo frigido prædicta etiam horis 6. non mollescunt quidem, in calente opium, scammonium, aloë, hypocistis, succus glycyrrhizę, etiam soluantur: cætera mollescunt tātum, postea durantur, præsertim Ammoniacum. In eodem oleo & prædictis humoribus etiam calentibus ladanum, mastiche, myrrha, bdelliū, sarcocolla, styrax, gummi arabicum. Sarcocolla in aqua rosarum dissoluitur in pilulis sarcocollę.

Castorium, mumia, mollescunt statim: tragacantha tardius, sed in oleo hæc mol
lita

lita non multò post dureſcunt præter maſtichea, quæ ſoluitur in oleum: nec ad naturam redit niſi igne valentiore coquatur, vt docet oleum maſtichinum.

Acacia noſtrâs, ſulfur, gagates in his omnibus humoribus etiam feruentibus, nihil mutantur, ſed acacia paulatim piſtillo ex humore aliquo friata ſoluitur, vt ſucci alij & liquores, ſulfur & gagates igni liquantur, vt liquores omnes, opium, ladanum, chalcitis, chalcanthum, alumen omne, xylaloë vera, vnguis odoratus.

Soluuntur humore quouis calido chalcæthum, chalcitis, & hæc etiã aceto frigido.

Ærugo, ſori, nitrum, alumen, in aceto frigido non liqueſcunt, vt nec creta: ſed hæc multum diùque feruet, fitque multò fragilior, vt & prædicta.

† Saccharum, māna, quouis humore ſoluntur. Saccharū autem ad ſyrupos, iulepos, apozemata, electaria ſolida, penidia, trochiſcos, & alia opera plurima variè ſoluitur vt in antidotis Meſuæ leges. Saccharum aqua & melle ſoluitur Meſuæ in diazingibere: Manna verò fere ſoluitur iuſculo xalente, & colatur ad foliorum laticis in qua frequentior colligitur, & aliorum excrementorum ſeparationem.

Māna, caſſia, thamar indi in ſuccis purgatis

gatis dissoluuntur & colantur in diamāna, & in aliis, melius sic miscentur quàm coctione. Manna dissolvitur in succo rosarum rubrarum in electario mānæ. Moschus, ambra, caphura, ferè humore aliquo soluta aliis miscentur.

Tartarum vstum, in oleum vi frigidi solvitur, alio solutionis modo.

Sed vide ne dum acetum vel humorẽ alium quo ammoniacum vel alium liquorem solvisti, coquendo consumis, salaris. Nam sæpe humorem alium ex se remittunt: quem si consumere pergis, ipsorum liquorum humidum consumis: fiuntq; hi siccissimi, & exucci, & emplastro ob id inepti.

Quæ verò composita quibus humoribus solvantur, non est operis præsentis docere, sed ad modum componendi singula medicamenta pertinet.

Composita tamen plurima, vt electuaria purgatoria, cùm aut ingrata sint aut egrè deutorantur, aut citius descendere volumus, neque nausea metuitur, ptissanæ aqua, hydromelite, vino, vel alio humore idoneo dissoluimus. Trochiscos in cote medica ex humore idoneo etiam in collyria humida sæpè dissoluimus. eclegmata in ore salivæ solvuntur.

Ex his constat solutionis nomen hic minus latè patere quàm cap. 6. libr. 4. meteororum, vbi ad mollitionem & liquationem quoque extenditur.

DE MOLLITIONE.

MOLLITIO solutioni & liquationi proxima, fit cum medicamenta tã simplicia quàm composita redduntur molliora, idq; vel affuso humore aliquo sed paucò, vel solo calore nostro, solis, ignis id vulgus malaxare vocat, verbo de torto ex futuro *μαλάξω*, verbi *μαλάττω*, id est mollio & subigo: quæ duo per malaxare etiam intelligunt, nec eo libenter vtuntur alibi quàm tum in catapotiiis cū succo aut syrupo aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris oleo, adipe, vel simili emolliendis.

Calore mollescunt cornua, vngulæ, pili, succi, liquores, lachrymæ, vt etiam digitis calentibus tantum tractatæ, ceræ modo ductiles fiant tanquam à frigido concretæ non solū sicco duratæ. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla immodico liquantur.

Zitho (qui porus erat Alexandrinorū, nostræ ceruisiæ similis) ebur mollescit.

Vniones, corallia aceto destillato mollescunt, & vt dixi, solvuntur.

DE DURATIONE.

DURATIO mollitioni contraria nobis interdum est in usu in cōditis, electariis, ceratis, emplastris, gelatinis ut vocamus. Ea autem sit nunc mistis siccioribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem postea fusius agemus adhibenda medicamentis plurimis, non ut durecant, sed ut seruari possint, & ob causas alias inibi dicendas. De calfactione quoque & refrigeratione paulò post. dicemus, quarum tractatio durationem abundè illustrabit.

DE LIQVATIONE.

LIQVATIO seu fusio est eorum quæ à frigido cōcreuerunt in liquidiorè & fluxilem consistentiâ à calore facta resolutio: ita, ut quæ à frigore imbecillo aut non diuturno sunt concreta, ut mel, cera, oleum hybernium, butyrū, adipēs, medullæ, resinæ à calore moderato glaciæ, niuis & grādinis modo liquētur. Quæ verò à vehementi & diuturno frigore concreta obriguerūt, ægrè multo calore funduntur, ut aurum, ferrum ægerrimè, argentum, æs facilius, stannum his facilius, facillimè plumbum, stimmi, arsenicum, sandaracha, sulphur, alumen omne (quamuis scissile tantum mollescere videatur

non

non etiam liquari & fluere) chalcitis, chalcanthum, misy & ærugo tardius, tardissimè soli (quia terreum & saxum) vt lithargyros. Is tamen cum ærugine vel oxelæo duplo citius liquefcit quàm cum hydrelæo duplo.

His promptius liquantur gagates, succinum, vnguis odoratus, id est blatta bizantia, asphaltum, pissasphaltum (mumiâ intelligo) xylaloë.

His promptius, ladanum, Oesypus, castorium, sanguis hirci, gummi arabicum, tragacantha, cancamum, caphura, myrrha, bdellium, styrax, mastiche, sarcocolla, gummi hederæ, iuniperi, cerasi, pruni, amygdalarum.

Resinæ his facilius. Aequè autem facile liquores, opium, euphorbiû, ammoniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, scammoniû & succus glycyrrhizæ, hipocisthis, aloë, elaterium, lycium nostrâs.

Cera omnium facillimè: Mel, aëromeli seu manna, saccharum, humore etiam frigido vt sal soluntur.

Acacia nostrâs & sæpe non liquantur, sed humore aliquo cum pistillo, aut cochleari aut manu paulatim soluntur.

Prædicta quoque omnia) succos, liquores, gummi, resinas intelligo) calenti humore,

more, vt dixi mollescunt: quædam etiam soluuntur: nonnulla item liquantur.

Ambra minutim concisa liquefcit Me-
sux in E. diacoccubaphices.

Porrò liquationis necessitas magnâ est
ad mistionem electariorum, catapotio-
rum, vnguentorû, ceratorum, emplastro-
rum, & reliquorum propè compositorû.

Quoniam in superioribus præparandi
differètiis virium caloris, frigoris, hume-
ctationis, & siccationis meminimus, & in
sequentibus eorundem mentio frequens
nobis est futura, prius de his est nobis a-
gendum, quàm ad infusionem, coctionē,
assationem, ystionem & alia multa, calo-
ris & aliarum primarum qualitatum ope-
ra transeamus.

DE CALFACTIONE.

DE calfactione autē agemus, nō qua-
tenus soluit, mollit, liquat, coquit,
assat, vrit, vel aliud insigne opus præstat,
sed quatenus calorem rebus præbet mo-
deratum, mistioni necessarium, vel etiam
alicui præparationum differentiæ, vel
ipsi denique medicamentorum simpli-
cium, vel compositorum vsui dextro.

Calefit in sole meridiano acopum Gal.
populeum lib. 4. sanat. ruendæ, vt fermenten-
tentur & probius misceantur eorû vires.

In sole teri vult Galen. metallica, vel lauanda, vel in aliud vtenda.

Colanda calfactione tenuantur, vt promptius permeent: frigida enim velut cōcreta non percolantur, nisi sint multū aquosa & liquida, vt oxymeli Galeni, calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calida colanda. Tepidam damus aquam, vt sit vomitoria.

Calidas modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, vreticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim cœlo frigido & ventriculo frigidiorē natura, aut ex morbo.

Calefacimus aquam & alia omnia quæ aqua fluente, aut niue circumposita volumus frigidiora reddere, quòd in humorem calore rarefactū frigus se altius insinuat, vt ferrum candens aqua frigida & astringente temperatur, vt sit durius.

Calefacimus modicè infundenda, vt vires suas promptius in humore, cui infunduntur, transmittant. Calfactus enim humor tenuatur & infusa res rarefit, quibus fit, vt eorum vis calore promptius trahatur. Alia propè innumerabilia calfactione egent, sed admonendi gratia magis quàm docen

docendi calfactionis, refrigerationis & humectationis meminimus: siccationis autem maior est necessitas.

Refrigeramus aqua fluente, aut niue, aut glacie etiam prius calefacta, quæ febriliū vehementia, aut aëris intēperiei calidę opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, ut ius carniū glutinosarū in gelatinā vulgò dictā.

Refrigeramus omnia calore præparata priusquam reponamus.

Refrigeramus quę calore soluta frigore volumus concrefcere, & durescere, ut electaria sicca, cerata, emplastra.

Quæ calfaciunt, & refrigerant etiā per accidens siccant, ob id ordine bono iam de siccantibus agamus.

DE SICCATIONE.

SICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxię, aut excrementosę, ob id nauseabundę, vel promptē putrentis, vel puluerari prohibentis, vel caliditatē quę sitam obruentis. Absumitur interdum, & naturę humiditatis aliquid, plurimum autem in assatione & vstione.

Scillę partes maximē medię direptis viuo tenuis tunicis, frustatim confectę coquantur, mutata sæpe aqua, donec ipsa nec amaritudinē, nec acrimoniā habeat,

traiectaque lino frustra illa sic, vt se non contingant, siccantur in vmbra dies 40. His segmentis ad oleum, vinum, acetum scillinum, vtimur. Hæc Diosc. vbi neque cukri ex ligno pini vel cupressi scillam diuisuri meminit, neque acus lignæ, cum Mesue in aceto scillite, nec medium eius abiiciendum iubet, (quod hodie solenni quodam more fieri ab omnibus video) sed tantum tunicas externas ad vsque viuas & integras.

Triticum electum negligenter tritum aqua per noctem maceratum, postridie manibus expressum reddit cremorē: qui dū resederit, inclinato vase quod superna tat sensim effundendum, reliquum bombace vel sole æstiuo mox siccandum, ne accescat: repositum operculetur metu vermiū: hoc amyliū, hyeme igni siccetur. Sic ex oriza & hordeo, & aliis fieri potest.

Rosæ mediocriter apertæ sereno cœlo mane lectæ eodem die vt sunt siccantur sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix vmbra siccauerit, quanquam id esset optatius, siccatas auelle, & reconde vase vitreo operculato, vt odor & color perseuerent. Meliores montanæ cāpestribus & minus minuūtur siccando, cum ex harū libris decē siccatis lib. vnica supersit quibusdam,

busdam, idem de violis. Scilla siccatur in eclegmate Mesuæ ad asthma, ad saccharum rosatum & violatum, rosas & violas modicè siccatur Mesues: hyssopus in eclegmate sano, métha in eclegmate aromaticum, ruta in altero diacymino Mesuæ, ut in Galeni diosporirico, sed modicè. Nam supra modum siccata, acrior, amarior, calidior euadit, non siccata flatu minus discutit, quia humorem quendam excrementosum nondum percoctum retinet.

Herbæ itē reliquæ umbra siccantur, nisi utendi necessitas cogat te quasdam igni vel sole siccare. Nā in manipulis ligatæ in granario pensæ siccantur: ubi siccatae sunt, sacculis cannabinis ibidem reponuntur.

Radices herbarum lotæ, à lignosa matrice secretæ, mox insolentur, nocte in aëre sicco perflatili seruentur, iterum soli reddantur, donec erunt probè siccatae. Quod si cælum est nubilum, sicca fumo, aut potius prope ignem, in calathio stramentitio, vel saligno: aut si utendi celeritas urget, sartagini calfactæ, & ab igni remotæ ipsas toties impone identidem vertendo, & sartaginem recalfaciendo exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccatae. sic radix enulæ, valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fru-

ticum, vt capp. tamaricis : & arborum , vt fraxini, mori, faciendum est.

Radices iam ficcatae si ægrè puluerantur, papyro insertae igni siccantur, vel calidae sartagini imponuntur , & igni exponuntur: igni autè vel in sartagine vel papyro, vel furno, vel supra, aut intra furnum, à quo panis extractus est. Radices eadè, & aliae magnae recètes, lotae, radiculis purgatae, ac per tessellas incisae, filoque transfixe paruis interuallis, ne se tangant , in aëre ventoso & perflatili siccantur , vt radices ireos , aristolochiae rotundae & longae, bryoniae, & similium : quae tamen etiam citra diuisionem probè siccantur, vt radix ari, dracunculi, cyclamini, asphodeli , vti eliginatae prius istae, mandragorae, eryngij apij, petroselini, foeniculi, rusci, turbiti, ellebori vtriusque , dictamni vulgaris, thapsiae. Paruae radices aliae citra eliginationem in vmbra quoque siccantur , vt asari, asparagi , graminis.

Mes. Colocynthis septembri legitur dum flauescit, maxima, & cum aliis multis producta: insolatur diu, quia ægrè siccatur , & nocte in aëre perflatili reponitur, aut si caelum est nubilum, filo transfixa fumo siccatur, post excorticatur, vt teratur, item quarta parte horae inuoluta papyro insolatur,

latur, vel igni, aut fumo admouetur.

Aloë decocto aromatum imbuta sicca- *Ibidem*
tur, primo in vmbra, deinde in sole: sic
myrobalani tritæ oleo amygdalarū dul-
cium, æstate triduo conficatæ, & quoties
opus erat irrigatæ siccantur primū in
vmbra, deinde in sole. Trochisci tamen
ex his facti in vmbra tantū siccantur.

Pulmo vulpis sanæ, venatu captæ, iuue-
nis, aqua abluatur, incidatur secundū ar-
teriam venosam, & magis multò secundū
venam arteriosam, sanguine purgetur, vi-
no albo, odoro, modicè calido lauetur, ol-
læ impositus clibano parum calido sicce-
tur, refrigeratus, & foliis absinthij inuolu-
tus reponatur. Plura de his leges in fine;
in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdalæ & nuclei pinei cortice te-
nui ablato in pelui super prunas ignitas
per se, vel potius cum fursure ducatur, &
succutiatur donec humiditas rancida, aut
excrementosa cōsumatur, alioqui pecto-
ri nocent, & rullim excitant qualitate ran-
cida. Pruna, ficus, vua, zizipha, myxa, py-
ra, & alij fructus multi sole feruidissimo,
aut eius penuria igne siccantur: sed vua
oxyacanthæ vmbra siccatur.

Fructus quoq; rubi immaturi clibano
siccantur ad maiorem astringentiæ, & mo-

ra viridia, aut subrubentia. Fella in folliculo parum cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parum salita insolatu siccata servantur.

DE HYMECTATIONE.

Hymectantur nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore medicamenta, non modò simplicia, ut scilicet & innocentius in compositionem vel usum veniant, sed sæpe etiã composita, ut cum crassa humore diluimus, quò facilius & iucundius deurentur.

Caryophyllū, zingiber, myrobalanos, cepulas, & emblicas ad condituram, qua industria humectes, docet Mesues initio libri sui de antidotis, & in simplicibus.

Mastiche, moschos, ambra, terendo humectantur aqua rosata.

Gummi Arabicum, tragacantha, aqua etiam vini, myrobalani, scammonium, colocynthis, caphura, turbith, sericum, crocus, euphorbium, & alia pleraque, terendo humectantur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdalæ, strobili, pistacia, parum humectantur aqua dulci aut rosata ad meliorem trituram & saporem delicatum, si emulsionem, amygdalarum, marcipanes, facturus es, alioqui pinguescunt, & palato ingr

ingratae fiunt & ventriculo, vt etiam nauseabundae fiant.

DE INFUSIONE.

HVmectationi proxima est infusio: in hac enim medicamenta parum trita aut concisa, nisi minuta sint, macerantur, & temperantur humore aliquo scopis nostris apto, eo magis minus calido à sole vel igni potius quam frigido. Tēpus autem quo id fit varium est. Nam nunc infunduntur semihoram, nunc horā, nunc horas plures, dies, mēses, pro varia medicamenti natura, & aliis medicorum scopis. Vt enim quaedam parum diu terenda & coquenda, sic infundenda, quòd virtutem habēt vel imbecillem, vel superficialiam, & rara sint admodū. Contraria diutius infundenda. Varij præterea scopi medicorum faciunt, vt nunc minus diu, nūc diutius quaedam sint infundenda, & quaedam (vt nuper distinxi) minimo aut mediocri, aut valido calore in id fouenda. Medicamenta infundimus, vt facultatem eorum maleficam quidem auferamus vel castigemus: bona verò augeamus vel in humorem ipsam vtendam transferamus, quos tres infusionis scopos præcipuos abundè Mesues docuit lib.1. & nos lib.3. de ratione componendi medicamenta.

Infunduntur autem hodie potissimum purgátia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syrupos, olea, & alias compositorum medicamentorú differentias.

Humor verò cui infunduntur maximè varius est, pro scopis variis, purgantia tamen frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum, alia humoribus aliis, ut pòst audies.

Mes. Thymelææ fructum aut folia, & tithymalorum, & similiter lactariarum aceto infundimus.

Turbith lacti recens mulso infusum & siccatum ventrem turbare desinit.

Aloë decocto aromatum vel specierú hieræ, & aliorum quorundam calidorum macerata, citius etiam in ventriculi tunicas altè recepta vacuat: illi autem decocto si colocynthis aut turbith addatur, etiam à longinquo trahet aloë facultate acquisititia, non insita.

Ibidem Myrobalani obstruere desinunt si infundantur in serum lactis vel succum fumarie, addito præsertim absinthio, vel agarico, vel rha barbaro.

Senna cōtrita horis vigintiquatuor in succis maceratur, semel aut bis feruefit, colatur, exprimitur in syrup. Saporis.

Manna maceratur succo intybi, feruefit,

fit, manibus fricatur, colatur in syrup. acido ex manna.

Rha barbarum infunditur aquæ cichorii, vel intybi, vel apij, vel pantaginis, adiecto interdum vino albo pauco, & cum Mesue spica, pro variis medici scopis. Id autē ante infusionem scalp pro aut cultello in tenuia velut in folia incidatur, potius q̃ vulgi more teratur, ne vis eius exhalet.

Thamar Indi infunduntur sero capri- no, aut succo fumarix, vel lupuli: modos eorum infundendo varios lege in simplicibus Mesuæ.

Rosæ & violæ infunduntur aquæ aliquoties, vt syrupus inde purgatorius coquatur: infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Alia propē omnia simplicia purgantia variē infundi docet Mesues in simplicib.

Cyminū in diospolitico seu diacymino maceratur vigintiquatuor horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & siccatur: id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat.

Radices vreticæ calentes eadem ratione aceto 24. horis ante vsum macerantur: si autem postea sint coquendæ ex aqua, satis est prius horas sex aceto macerasse; Eadem ratione semen anisi, anethi, apij,

ameos, amomi, cari, fœniculi.

In oxymelite melanogogo simplicia macerat Mesues horis vigintiquatuor aceto albo, aqua, succo buglossi.

Coriandrū aceto cui incoctus sit sam-psuchus maceratum rectè corrigitur.

Gal.li. Dactyli aceto macerantur triduo in dia-
& simp. phœnico Mesuæ.

Semen erysimi aqua macerandum est, ad obtundendam igneam eius caliditatē, priusquam eclegmatis misceatur.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, ut acrimoniam in ea exuat. In E. Hamech simplicia infunduntur sero lactis quinq; dies Mesuæ. Lupini aqua fluviali diebus 6. 7. 8. macerati mitescunt & dulcescunt, uti aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mesuæ, & siccantur in pulvere impinguante. Cicera aquæ incoquuntur in diasatyrio secundo, utrunque sit ut pars eius nitrosa & tergens, in lac. & aquam transferatur, reliqua eius substantia seruetur.

lib. 4. Semen abietis & flores populi mace-
sanit. rat dies quadraginta oleo Galenus, sæpe tres, quatuor & plures menses, postea exprimit oleum digerens & acopum.

Sericum crudum cocco baphica tin-
ctum

Etum maceratur succo pomorum, succo granatorum, decocto corticum citri & aliis syrupis ex succis simplicibus & compositis, donec ij succi rubeant, & serici simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamenti vel maleficam emendauit, vel bonam auxit, aut in humorem transtulit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, ut præparatio quædam sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquândiu macerata passim reperiens, imò & post coctionem, ante ipsam colationem, præsertim dum vis quæsitæ ægrè in humorem trahi potest ex materia dura, crassa, densa. Sic lignū gaiaci, ebeni, buxi, fraxini, genistæ, iuniperi etiam tritum aut limatum diu, etiam ad triduum ante coctionem humore aliquo idoneo maceramus, ut vires eius incidentes, tenuantes, tergentes tandem in decoctum trahantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infusionis loco: & quæ infudimus sæpe semel aut bis seruescimus ante expressionem aut colationem.

Infunduntur præterea quædam tantum, ut tenerescant, idque ad condituram vel coctionem celeriore.

*Mes. in
simpli.
& con
ditu. li.
7.c. ph.
p. &
Mes. in
antida-
tu.*

Sic Mesues myrobalanos ad conditu-
ram aqua & hydromelite humectat, &
dies octo sero caprino macerat, post se-
mel feruescit.

Capita papaueris forficibus minutim
concisa macerantur cum semine aqua
pluuia vel fontana die vno: vel si iam sic-
ciora sunt, etiam biduo & triduo, vt tene-
rescant ad diacodij compositionem.

Myrobalani oleo amygdalarum dul-
cium, vel violato, vel rosato, vel sesamino
imbuuntur & irrigantur, postea siccantur:
id quod ipsis infusio, seu affusio, seu per-
fusio quædã est. Dum item hæ tritæ oleo
amygdalarum dulcium triduo per æsta-
tem confricantur affuso oleo quoties opus
est, deinde siccantur. Altero autem triduo
similiter in sole confricantur ex aqua sac-
charata, vel sero saccharato, vt postea for-
mētur in trochiscos Mesuæ, nisi nutritio-
nem esse mauis, de qua mox dicemus, vti
& dum species hieræ Hermetis tritas in-
uoluit bis succo cucumeris agrestis, & sic-
cat, vt eius succi vires pulvis in se trahat.

Alia infunduntur, vt dissolui possint: sic
Ammoniacum, opopanax, galbanum, sa-
gapenum, & liquores alij aceto vel hu-
more alio super cineres calidos ferè in-
funduntur, vt soluantur. Fractos eosdem
hydro

hydromelite infundit in hiera Archigenis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera Hermetis, in hiera autem diacolocynthidos Ruffi, myrrham solam vino infundit: sagapenum & opopanax cum aliis terit, vt nos hodie in hiera diacolocynthidis Paccij facimus: in qua tamen Scribonius opopanax & sagapenum in mortario terit, adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo. Infunduntur eadem ratione gummi & ichthyocola, vt dissolui possint, vel vt in muccaginem abeat, quo sine etiam femina & radices lentore aliquo praeditae, humore calfacto macerantur. Sed de his in succorum extractioe mox audies.

Ad infusionem reducitur infectio seu tinctura, vt sericum succo cocci baphicę tinctum ad compositionem cardiacam celebrem diacoccu baphices, & in syr. de pomis, & de granatis, & de corticibus citri. Quanquam idem sericum tinctum praeterea succis illis infundatur, donec succi rubeant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

– Filum purpura marina tinctum, si postea viperam strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Gal.

DE NUTRITIONE.

Nutritio quoque quam vocant, fuerit infusionis species: sic autem est appellata

pellata hæc præparationis differentia loquentibus abusiue, quòd quemadmodũ per veram nutritionem fit vacuati repletio, & etiam incrementum, quandiu scilicet id fieri ex partiũ sequaci mollitie potest: sic medicamenta quę humore aliquo imbuta, macerata, tribulata, confricata, præsertim calfacto velut augentur.

Sarcocolla alba, magnis glebis constans, lacte muliebri nutritur, sed pauco: Nam multo lacte operta liquescit, & lac ipsum priusquam sarcocolla siccet, accescit: paucũ igitur ex māmīs ipsis irrigandum cōfestim sole siccet, iterum & tertio, quarto, quinto similiter irroretur & sic cetur, & tandẽ reponatur. Aspergi etiã asinæ, capræ, equæ lacte vel alio potest. Semẽ cari calfactũ lacte caprino horas duas quidã nutriunt in vase mũdo, exemptum siccatũque reponunt ad fluorem alui.

Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo cydonioũr, vel alio humore dũ irrigat, macerat, fricat, frigit. Mesues clementer, & his humoribus imbuunt vel ad condituram, vel ad noxas earum castigandas, siue solæ vtendæ, siue in cōposita veniant, vt trypheram sarracenicam persiccam, trypheram Galeni, elect. stomachicum Mesuæ, & elect. alhari & sequens

quens, quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoque seminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partis tertiae consumptionem, hocque decocto paulatim affuso sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriri dicitur sagapenum: eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulae campanae, aut rutae, aut feniculi cum felle paucio autum rapacium, & spica & mastiche ad dimidium cocto & colato idem fieri potest.

Folia etiam thymelaeae aceto nutriuntur in elec. diaphysalidon. Eadem in aceto infundit, & siccat in pilulis thymelaeae, ut eadem sint vel saltem omnino proxima infusio & nutritio. Ambae enim humore sunt & calore blando, qualis ad nutritionem veram est aptissimus, cum immoderatio vrat, imbecillior sit inefficax.

Metallica ferè in aëre calido non tamen super ignem nutriuntur.

Metallica etiam saepe nutriuntur humore aliquo, ut dissoluantur promptius, vel etiam liquentur, vel pinguescant, & velut aucta tumescant.

Scoria ferri in aceto dies quinque in

tryphera minore Mesuq, & tryphera moschata, & tryphera Galeni.

Lithargyros nutritur ex oleo sic, vt vnciæ eius triti quatuor tādē olei libram vnā, aceti quartaria quinque ac eo plus ebibant, idq; omnino sine igne, multum diūq; pistillum per mortarium ducendo. Nam lithargyro etiam vncia vna corpus dat plurimum, vt etiam sine cera emplastrū perficiat: sed initio diu tere primum cum paucō oleo, postea affuso vicissim paucō aceto. Nam multo sic mergitur, vt corpus non assequatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiā crassio-rem friando assecuta, tum largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quod per initia potes aliquantisper cessare, vt interim velut in otio largius cōbibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & crugo, & metallica cetera ex oxaleo in vnguēti formā diu friādo duxi, sed bibacissima est lithargyros: opinor, qā siccis. & rara modicē.

DE EXPRESSIONE.

Expressio est humidæ & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido compressu facta. fit autē sæpe torculati & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimunt, & quale pinxit

pinxit Mesues in oleo amygdalarum dul-
cium, quale item vsurpamus in exprimē-
dis oleis, & succis aliis, & decoctis, & car-
nibus, & similibus: siue id torcular est, si-
ue prælum librariū, vt in oleo amygdal.
dolcium Mesuæ diximus. Ferè autem ex-
primenda, ne diffuant, aut dissiliant, in-
uoluimus panno forti, vt cannabino, ca-
prino, setaceo. Est quando tantum capri-
no aut lineo inuoluimus, & manibus ac
digitis prælorum loco vtimur, vt dum
medicamenta purgantia infusa exprimi-
mus. Adde quod nunc denso, nunc raro
panno exprimimus, interdum clemen-
tèr, interdum valenter pro scopis medi-
corum variis: quædam item frigida expri-
mimus, alia etiā calida: quædam solum
calida exprimi possunt, vt oleum amygda-
larum dulcium, & similia in Mesue. Sic
portulacæ, cotyledonis, semperuiui, bu-
glossi succum exprimimus calètem, aliàs
humore aliquo liquidiore affuso, vt di-
cemus in succorum extractione.

Expressionis vsus igitur latissimè patet
in infusis, apozematibus, & coctionibus
propè omnibus, in syrupis, in oleis, & id
genus aliis: quo autè instrumento & qua-
tenus calidū, aut frigidū vnū quodq; est
exprimendū, in singulis compositorū re-

mediorum differentiis melius cōdisces.
 Neque solum colationi succedit expressio, imò eam sæpe præcedit: & quando eam sequitur, blāda admodum est faciēda, ne quod crassum & terreum colo adheret, id totum vi in subiectum humorem colatum elidamus.

DE CONFRICTIONE.

Confrictio rerum infusarum, aut etiam cōctarum manibus facta colationem & expressionem adiuvat, ob id ante has sæpe obitur: interdum expressio-
 nis vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter coquendum, infricatur in syr. Saporis, de pomis & quibusdam aliis compositis.

Manna succo intybi macerata fricatur manibus ante colationem in syrupo acido ex manna.

Rha barbarū pāno lineo ligatum fricatur, & exprimitur in syr. eichorij cōposito. Scammoniū panno tenui ligatū sæpe confricatur in syr. acetato cholagogo.

Elleborus niger nodulo lineo ligatus in oxymelite melanogogo sæpe confricatur.

Medulla enici, turbith, zingiberis, panno lineo ligata confricantur sæpe in oxymelite phlegmagogo.

Ellebo-

Elleborum nigrum, agaricum, salem Indum fricat Mesues in apozemate epithymi: cassiam verò manibus fricat ante colaturam in apozemate adianti: colocynthis forficibus incisa in oleo rosato fricatur ad componendos ex ipsa trochiscos. Mesue in trochisc. & simpl.

Sic manibus fricantur, & post dolantur simplicia in electario Hamech. Simplicia in succis macerata fricantur & colantur in elec. diaphysalidon. Simplicia pilularum aromaticarum post coctionem fricantur & colantur.

Ferè autem hic nodulus in medicamento humido manet. Sic scammonium panno lineo raro ligatum suspenditur in syrupo fumariz, & noduli aromata continentes, & compositum condientes in ipso suspensi manent, ut post leges, titulo de aromatizatione. Quam consuetudinem hodie plerisque servari video in syrups purgantibus, præsertim contra morbum longum, aut in hominis delicati gratiam compositis.

Aliquando tamen ubi vis eius noduli *Gal. li. 7. c. ph.* tota in compositum confricando est expressa, abiicitur. Sic Soranus cum melle & capitibus papaveris myrrhâ, crocum, hypocistidē, acaciam nodulo ligata in-

coquebat, post ubi vires suas diacodio
 impresserant, tollebat. Quod exemplum
 eò ascripti, ne id nouum putes, & Arabi-

In sim.

Mes.

Alia tamen est confricatio, quæ ad in-
 fundendum, imbuendum, molliendū, &
 humectandum magis pertinet, vt cum
 myrobalani omnes butyro vaccino fri-
 catur, cæteræ species oleo amygdalarum
 dulcium inuoluuntur. in tryphera sarra-
 cenica, & Phenonis. easdem ne partes
 nutritorias valenti astrictione sua exaspe-
 rent, oleo amygdalarum dulcium vel ro-
 sato, vel violato, vel sesamino, vel aliis le-
 nientibus tritas mergit, confricat, & lu-
 bricas facit. Possis tamen non modò ma-
 nibus fricare, sed etiam in sole aut igni
 clementiore frigere, cū alioqui nec ipsæ
 rarefient, nec butyrum, aut oleum quod-
 uis liquabitur, vt ipsas promptè totas per-
 meet, ac imbuat. ob id in tryphera mino-
 re Phenonis, myrobalani assentur in bu-
 tyro vaccino, legimus. & nos in tryphera
 sequente: hæ butyro vaccino inuolutæ
 frigantur, vtriusq; ubi legebatur, fricen-
 tur, & alibi aliquoties. Vbi (vt dixi) etiam
 fricentur legere possis, cum vtrunque pa-
 tiantur, hoc est manū fricentur, & sarra-
 gine, aut vase alio blandè frignantur.

Et

Et in Elec. à nobis inuento, frige bis
vertimus pro frica: tamen potes si libet le-
ctionem priorem retinere: vel istam, præ-
sertim cum in simili Elec. alcanzi, myro-
balanos, & simplicia alia bis feruefaciat.

Friguntur tamen verè quædam, vt cu-
minum aceto maceratū frigitur Gal. lib.
4. sanat. tuēdæ, in vase terreo bene cocto.
Plura huius exempla leges in assatione.

DE SUCCORVM EX-

tractione.

Q Vanquam loco hoc coctionem in-
fusioni (vt ante memini) viribus &
præparationis modo proximam, docere
exigit ordo rei: quia tamen rerum ante
tractatarum cōsecutione quadam in ex-
pressionē transiuimus, succorum autem
extractio tritura cōstat & expressione, iu-
re optimo succos exprimēdi modum hic
interferimus. *χρᾶ* autem (vt in simplici-
bus ex Galeno abūdē docuimus) nunc is
est humor, qui virentibus herbis, aut fru-
ctibus humidis, aut seminibus oleaginis
trititis exprimitur, & viscago ceu muccago
quædam ex glutinosis seminibus, radici-
bus, gūmis, partium nervosarum ramen-
tis, humore aliquo calfacto maceratis ex-
tracta. De his omnibus hoc loco agam.

Succus ex omnibus foliis virētibz per

se tritis exprimi potest, præter quã quòd quædam ob siccitatem vix succum aliquem reddunt si per se terantur, vt folia lauri, saluiæ, thymi, rorismarini, sabinæ, & quæ plantarum sunt syluestrium, & ex locis editioribus ac siccioribus, & æstate calida sicca, atque adeò post meridiem succum parciorem reddunt: aliæ ob len- torẽ, vt buglossum vtrunque, cotyledon, & aliæ quædam pòst dicendæ: sed vtrun- que genus misto eget humore liquido, ad succi expressionem.

Ad varios verò auriũ & partiũ aliarum affectus adhibet Gal. in simplicibus, & li. c. ph. p. succos recentes hippuris, cucurbi- tæ, canabis viridis, hederæ, polygoni ma- ris, præsij, stœbes, absinthij, fœniculi, dra- cõij, lactucæ agrestis, fumaricæ, centaurij parui, chelidoniij, libanotidum, anagalli- dum, anemonarũ, peucedani, betæ, brassi- cæ, calaminthes, foliorũ ficus, cynoglossi: floribus populi albæ, floribus spondyliij, floribus rosarum, violarum: radicibus cæ- pæ, allij, porri, cyclamini, scillæ.

Ex fructibus etiam vt pomis cydoniis, granatis, vuis, & aliis permultis: de qui- bus abundẽ nobis dictum ex Galeno in Mesue est, sectione prima & secunda.

Quo autem modo albẽ, scammonium, glaucium,

glaucium, hypocisthis, acacia & externi alij plantarū succi extrahantur, cum plantas ipsas nō habeamus, didicisse parui est momenti, cum praesertim ex Dioscoride repetere possis: quāquam aloë nobis iam frequens satis est, sed pēsilis ferè ad pompam, attilis nulla, propterea non quævis aloë succum laudabilem reddit, vt Dioscorides & Gal. docuerunt.

Acacia verò nostrās fit ex prunis agrestibus aqua maceratis, igni lento coctis ad dissolutionem: colatum ex his siccat igni vel solē, complanatum in tessellas secatur, rubentes & astringentes magis, si immatura erant: nigras & dulces magis, si matura.

Lycium nostrās sic fit in libello, cui titulus est de dynamibus, id est, facultatibus, & Gal. tribuitur. Periclymeni (quod caprifoliū vocant) baccas mense Septembri tere, torquendo exprime, in solatu sicca, repone. Alterum autem verum hodie desideratur.

Radices glycyrrhizæ recentes, præhumidæ, Iulio mense tritæ ex aqua coctæ, ad crassitiem colantur & exprimuntur: expressum igni vel sole siccat.

Oleum omphacinum ex oliuis immaturis; dulce, ex maturis exprimere in Gal.

lia Narbonensi vulgare est.

Sicomphacium, ex vuis immaturis & natura acerbis: vinum, ex maturis & dulcioribus exprimere cuius notum est. Pomorum agrestium tritorū succo expresso parum salso vtuntur Septentrionales omphacij vice.

Ex sicciorebus verò foliis seu natura seu cœli & soli ratione, vt succū aliquem extrahas, vinū aqua vel humor alius proposito, idoneus (vt dixi) miscetur inter tundendum: qui propè totus cum succi portione aliqua exprimendo reddetur.

Eodem modo ex portulaca, cotyledone, semperuiuo, buglosso vtroque, & similiter glutinosum succum sortitis, Galenus docet succū illū affuso humore idoneo extrahendum. Ex his tamen sine externo humore succum extrahis, si parum calefcunt ipsæ, mortariū, pistillus, succus, prælum, vel si rursū citra calorem calatho saligno impositæ, loco frigido, vt in cella vinaria repositæ sint. Nam in catinū subiectum humor satis multus paulatim defluet. Portulaca tamen erratica & quæ vitibus est familiaris quàm hortensis, & buglossum tenerū quàm vetustate iam pinguius, & folia borraginis quàm caulis succum facilius remittunt.

Cucurbi-

Cucurbitam maza pinſita inuolutam, clibano coquit Meſues, deinde ſuccum exprimit in ſyrupum cucurbitæ.

Ex ſcilla ſuccus extrahitur optimè diebus canicularibus 40. quibus ea particulatim digitis diſcerpta vaſi mellario imponitur, operculato, & pelle circumdato, deinde loco meridiem ſpectante contra boream lecto inſolatur ſepe vertendo, vt vndique ſolem ſentiat: poſt hos ſcillæ elixæ ſimilis ſuccum in fundo imponit melle condiendum. Alij ſcillam inter multas collectam cultello ligneo corricibus externis purgatam, maza inuolutam, clibano mediocriter calido coctâ, exemptam, vt calet tuſam in mortario lapideo calido, piſtillo ferreo calido, panno lineo, tenui, calido, inuolutâ valenter exprimunt. Sic autem aſſat Dioſcorid. vſq; cruſti frumentacci vel lutei coctionem, tamen ſue ei eius non meminit. Alij ſine aſſatione foris & intus purgatam multum calido ligneo aut lapideo mortario & piſtillo tuſam mox calido lineo, torculari calido exprimunt, & ſuccum multum facilè reddit, & purum atque clarum. Quod ſi frigida ſcilla frigido mortario & piſtillo trita ſit, in ſartagine terrea parum frigatur, illicoq; exprimatur inter aſſeres calidos vel

torculari calido ac aëre calido. Quæ omnia Galinnuit, cum succū hunc diebus canicularibus, nēpe omniū calidissimis, si suam seruāt naturam, optimè extrahit.

Quædā minutim concisam exprimūt, quòd tusa pinguescat, succūque ægrè remittat, nisi vt dixi, calefiat: alij tusam calathio sparteo imponunt aut saligno, in cellaque viniaria aut similiter frigido loco collocant, distillātque in vas subditum. Liquores, & gummi, & resinæ: castrata, te rebrata, secta, scarificata, plantæ radice, trunco, ramis, calice destillantes, raro à nobis colliguntur, sed ferè ab externis mittuntur; à quibus qua ratione eliciantur, docet in horum singulis Dioscorid. succum tamen ex incisa salice dum floret distillantem colligere possumus ad vsus à Galenō scriptos, & opium ex capitibus papaueris nigri mense Iunio aut Iulio & ex alijs nostratibus plantis. Elaterium autem ex fructu cucumeris agrestis quomodo extrahendū, lege Dios. & in his vide ne succū pro liquore supponas, cum sit multò ignauius scammonium succus, quàm liquor, & in alijs ad portionem, vt Dios. & Gale. abundè docent. Sic ex mandragoræ radice incisa, forata, cauata liquor emanat valentior succo, & nisdem
radi

radicibus tritis expresso, & ex ficu, lathyride, chelidonio, foliis aut surculis auulsis, lac emanat, ex illis & tithymalis albū, ex hoc luteum.

De secundo succi genere qui ex oleaginis seminibus tritis exprimitur, vt amygdalis amababus, auellanis, iuglandibus, pistaciis, strobilis, balano myrepfica, nuce myristica, semine cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, cannabis, napi, sinapi, ricini, cocci gnidij, lini, papaneris, hyoscyami, pomorū, pyrorū, & id genus aliis abunde cum Mesue diximus sectione nona de oleis, quod hunc succum etiam Dioscorides & Galenus oleum sæpe vocant, potestque hic ex omnibus seminibus medullatis extrahi, vt etiam ex vuarum seminibus tritis exprimitur igni in lucernis durantissimum.

Mel quoque ab anacardis extrahes, si eos ablato pediculo coquas ex aqua. tunc enim quod supernabit melleum coctileari colligendum est, & aliter.

3. v. c. c. i. genus tertium ex glutinosis seminibus & radicibus & aliis in humore castaetum aliquandiu infusis extrahitur.

Semina serè sunt cydoniorum, marrubij, vrticæ, lini, scenigraci, psyllij, maleæ, altheæ, citri.

RADICES sunt maluæ, altheæ, symphyti, periclymeni, scille, gummi arabicū, tragacatha, minutim incisum, sic ichthyocolla, taurocolla, ficus, vuç, horum vncias tres aquæ calidæ libra vna macerabis nocte vna, postridie recalfactū sacculo aut mantili ex tela noua forti impone, intorquendo exprime, virga lignea aut ferrea gracili percute: succum eadem dērade. id fac donec succus effluere desinat, & semē exuccum & siccum euaserit, vel radix.

Alij aquæ libras tres, vni seminum aut radicum libræ imponunt, alij libram vnā aquæ communis vel humoris alterius si requiratur, dant, vnciis quatuor seminum vel aliorum. Si autem succum vis liquidiorem, aquam auge, vel semina minuesi crassiolem, contrā.

Interdum etiam triduo macerantur, vt in diachylo communi, quod à *χολή*, hoc est succus seu muccago, est appellatum: vt in sectione 12. Mesuæ diximus, & libr. 3. metho. medicamenta componendi.

Quoniam verò Arabibus psyllij interior medulla calet, cortex friget, vbi refrigerandi consilium est, per succum psyllij, neque diu, nec multo calore macerant, neq; valenter exprimunt: ne substantiam calidam foras extrahant, quam nonnulli

in vlcere, admoto psyllij succo, cum aqua dulci extracto manifestè affirmant se deprehēdisse, & morsum in vlcere calorēq; excitatum, quem succo alio ex psyllio clementissimè expresso, postea compescuerunt, sed sola refrigeratrix facultas toti semini à Græcis tribuitur. Sic semen psyllij cum aqua fontis frigida tribulat Mesues, & eductum succum dat potui ad aluum soluendam. Decocto semen psyllij macerat horis viginti quatuor in singulas rudicula agitando, deinde totum succum exprimit in oleo de psyllio: vbi nō videtur timere venenosam virtutem occultam in parte seminis eius interna & calida quarto ordine: fortè ob id quod ipso decocto obtunditur & emendatur.

Ex taurocolla, & ichthyocolla, & coriorum ramentis, & partibus omnibus nervosis particulatim sectis mucago quoq; extrahitur, sed in vsu medicis frequentior est, quæ ex ichthyocolla, id est pisciū, præsertim quos moruas vocamus, fit. Satius autè est hæc rasa aut limata ex aqua lento igni coquere, donec tabescant. Qui autem valido igni primò coquere aggrediuntur, vrunt, & incoctilem reddunt.

Soluitur quoq; ichthyocolla hæc lotio, aqua salsa, aqua extinctionis calcis, aceto.

In emplastro diachylo magno, ichthyo colla aqua communi igni lēto, aut super cineres calidos diu macerata & paulatim cocta, tota abit in cremorem.

Pellis arietina ad dissolutionem dum coquitur in emplastrū, contra rupturam, muccago quoque ex ea extrahitur.

Ex gummis quoque muccago frequēter extrahitur potissimum arabico & tragacantha, vt horum drachmis duabus in aquę rosatę vnciis 5. 6. 7. solutis, vt in eclegmate sano, vt sit albius & leniēs magis. Muccagine ex gummi tragacanthi drac. duabus aquę rosarum vnciis 7. vel 8. solutis liquantur sacchari librę quatuor ad hypoglottidum (quas pilulas albas sub lingua vocant) compositionem.

Ex drachma autem vna tragacanthi potes vnc. tres, quatuor, plures muccaginis extrahere : si multum & diu baculo aut cochleari percutias.

Ad muccaginem hanc reducenda est congelatio lentorum iusculorum à frigore facta.

Pedes enim vitulorum, colla veruecū, capi, perdices, & carnes alię præsertim nervosam multam substantiā fortitę coquuntur ex aqua igni primū lento, deinde mediocri vsq; ad carniū dissolutionem,

nem, seu donec iusculi portio exigua cochleari exempta & refrigerata inter manus confricata, ipsa suo lentore velut fer ruminet. Tunc omnia in mantile mundū, medio ceter rarum coniunguntur, catino lato supposito, in quem humor defluat, ossa cochleari vnco, for cella eximūtur, reliquum mantili medio ceter intorto exprimitur. Nam valens expressio turbidam faceret gelatinam, vt pedes veruecini nigram, nisi exactissime lauentur & purgentur. Mox adeps flatus deturbatur, & cochleari deraditur, iniectis postea albuminibus clarificatur. Additur sacchari libra vna, cinamomi boni crassius triti vncta vna, in cremoris libras quinque aut sex, & crocus si flauum vis, aut linteolum succo florum cichorii aut alio quouis imbutum vnde opinor id linteolum tor nesol vocant, vt i & florem cichorii solsequium, & gyra solis & sponsa solis vulgo dicitur, quia cum sole vt alij flores multi circum agitur. Mox calidum adhuc per manicam, vt vocant, Hippocratis colant prope ignem, ne ante tempus, frigore co crescat: neque per colum transfluat. Vbi sponte sua fluxit, quantum erat fluxile ac liquidum, in patinas distribuitur: loco frigido, vt concreascit, reponitur.

-Sunt qui ichthyocolle portionem cum prædictis incoquunt, vt citius lentescat, & magis glutinosus cremor euadat.

DE DESTILLATIONE.

DESTILLATIO humoris è succo tenuiori extractio vi caloris, ad hunc locum omnino pertinet. Quæ verò ad eius rationem, vires, instrumenta, ignem pertinent, fusissime libr. 3. Methodi componendorum medicamentorum docuimus: Hoc autem loco lectorem tantum exercere statui in quibusdam destillatis paulò difficilioribus.

Eodem loco & sectione nona Mesuæ, de oleorum genere quarto egimus, etià de destillatione per ascensum, sic dicta, quòd vapores sursum elati, ibi concreti, in aquam distillant: cuius nunc vsus est longè frequentissimus. Segmentis pini latifoliæ vas impletum, aqua rosarum affusa, si vase duplici destillas, succus emanans oleosus est odoratissimus, qui caphuræ aqua vulgo dicitur.

Si rosæ quas incarnatas vocamus siccatæ, vapore aquæ calentis humectatæ destillantur, aquam rosarum bonam reddent.

Destillata vapore aquæ calentis vires & qualitates plantarum integrius retinent, sed quia excrementosa sunt parum diu
serua

seruari possunt. Diutius quę cinerum aut arenę aut scoriz pulueratę calore destillantur in vasis lapideis, aut vitreis, quantumlibet multis super longam aut rotundā fornacem tegulis intectam, quę sustineant arenas altas plumbo alto circumdatis: sed vase hęc paulatim calfacienda & refrigeranda sunt, priusquam aëri frigido aperiantur: alioqui mox rumpuntur. quę autem plumbo destillantur, omnino improbāda censeo, propter cerusam & qualitates alias plumbi maleficas, cum & aquam per tubos plūbeos deductam dānarit Gal. quòd dysenteriam excitat.

Destillatio per descensum nobis dicta in tertio genere oleorum Mesuę, & quę per hęc destillantur. Scillę etiam recētes incisę vasi infernē foraminulēto sursumque lutato impositę, si flamma circumdatur, aqua in ollam aliā subiectam, simul cū huius fundo lutatam defluet, quę cū farina vel pane mista, gustata mures citò necare quibusdā creditur, citius si lithargyri paucū miscueris. Rosę recentes linteolo super peluim tenso impositę, si vas carbonibus ignitis plenum acceperint, destillant aqua multa & odora in eam peluim. Eodem modo flores reliqui. Quę etiam per descensum est destillatio.

Si duę matulę sibi applicentur, & superior rosis impleatur, & insoleatur, distillat aqua odoratissima in subiectam.

DE COCTIONE.

CUM in omni destillatione coctio quędam fiat, per quam etiam aqua distillata succo est tenuior, & in omni coctione fieri destillatio possit, ut ollę operculum aqua excoquendorum vapore plenum indicat. Cum præterea ambo calore fiant ordine optimo nunc dicendum nobis de coctione est, cuius partem maximam lib. 3. de ratione componendi medicamenta scripsimus, ac identidem tibi repetendum est, ne bis de re eadem frustra sit agendum.

Coctio medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rarius assando in calore sicco. Coquantur autem simul, aut per se simplicia frequentissime, interdum & composita quędam.

Humor cui incoquuntur magna ex parte aqua est, ac ea vel simplex, vel medicamentosa. Simplex item vel pluvialis, vel fontana, vel distillata: medicamentosa verò est salina, marina, aluminosa, sulfurea, bituminosa, chalcianthodes, carbonosa.

Ad aquam compositam reducuntur, lixivium, lotium, vinum, acetum, omphacium, ceruisia, hydromeli, cœnomeli, apomeli,

meli, oxymeli, oxycraton, lac, serum, succi plantarum liquidi, oleum, resinae recētes, adipēs, butyrum, mel, saccharum humore pauco solutū, & variae in vnoquoque horum generum species, pro variis medicorum scopis, ut etiā interdum humores duos, plures miscere sit opus. Secundum cicerum decoctum, lac vacciniū vel ouinum ad coquendas radices eryngij sativi, raphani, draconij, in Mesue. Quantitas verò huius humoris varia est, pro scopis variis, ut in diasatyrio lac vaccinum vel ouinum sit quantum duobus digitis supernatet, quod si coquendis radicibus id non sufficit, nouum affundendum sed calidum, ut in his coquendis omnibus sepe admonet Galen. in alimentis, quod & coqui obseruant. In syrupis, & aliis coctionem requirentibus, quātus humor requiratur, libr. tertio audies.

Color autē coctionis autor esse potest quiniis rebus coquendis moderatus (nā à solo calore mediocri fit coctio) nō ignis solius, sed solis, animalis: calcis verò & fumi, & putredinis fimi aut corticum calor ad mouendis vsui esse potest, ut p. florico Galen. sumendis verò noxiis fuerit, ut Lib. ex carbonibus non ignitis nec semiustis, Simp. ex lignis putribus. Calor enim huiusmo-

di, vti & fumosus qualitatem alienā cum empyreumate rebus coctis imprimat.

Electarium rosatum flamma lenta coquit Mesues, & syrup. omnes igni lento.

Sint igitur ignis alimenta sicca & odora, vt sarmentum vitis, quo theriacen coquit Galenus: vel carbones semiuusti, & qui tetram qualitatem iam exalauerūt. sit autem primum blandus, & paulatim si res postulat, intendatur: coctioni enim vehemens & repentinus nocet, quod vrat, facultatem dissipet, empyreuma multum in re vsta non cocta relinquat.

Nec solum ignis calore, vt dixi, sit coctio medicamentorum, sed solis, vt scille, & ex ea acetū scillites dies 40. Mesuæ insolantur, sæpe mouendo: & hydromeli, & syrupus alter calaminthes totidem dies, vel etiam duos, tres, plures menses flores populi, & abietis semen oleo macerat Galenus, coquit quodammodo, multo magis si soli exponantur: quanquam quouis anni tempore fiat, vt psoricum ex chalciti dupla & lithargyro olla noua inclusum simo, æstate media diebus canicularibus quadraginta sepelit, sic dum theriaca & similes antidoti opiatae menses, vel etiam annos aliquot seruantur ad sui coctionem, quam fermentationem vocant.

Coq

Coquimus medicamenta, vel ut eorum *Galien*
vires imbecillas augeamus, incoctis si- *theria-*
mul his, quæ sunt valentiora, vel validio- *ca &*
res minuamus, vel alienas in totū abiga- *antid.*
mus, vel ut ex omnibus facultate diuersis
& sæpe contrariis simul coquendis facul-
tas vna concreascit & coalescat. Adhæc ob
destinatam medicamenti formam, aut su-
mentis palatum, ob simplicium naturam,
ob custodiæ diuturnitatem etiam quæ-
dam coctione longa siccamus, vti ob æ-
ris humidioris conditionem.

Præterea, ut purgētur, multa coquimus.
Ignis enim ut calida cætera homogenea
cogit, & heterogenea separat, ut simpli-
cium vires in humorem cui incoquantur
transeant, quo fine fiunt syrapi, apoze-
mata, oleorum quartum genus.

Horum exempla aliquot fuerint hæc.
Brassicam, lentem, ostrea bis coquimus
aqua scilicet priore abiecta, & noua ca-
lente affusa cum aluum per hæc sistere vo-
lumus, semel verò cum mouere. Sic al-
lium, cæpa, porrū, ampeloprasum, & quic-
quid à veteri natura ad contrariā traduci-
tur, bis coquendum: sic tamen, ut nec æ-
rem, nec aquam frigidā attingat. Nā pla-
nè tabescere & percoqui amplius nō po-
terit etiam si diutissimè coxeris. Quod

Lib. 2. praeceptum etiā medicamentis commu-
alim. ne est, quibus liquor nonus consumpto
Lib. 6. priore est affundendus. Althæa adipibus
simp. incocta subigitur ad abscessus coctū dif-
 ficiles, aqua multa viribus varia Gal. &
 Mespro coctionis quantitate.

Oxymeli quoque valde coctum flatus
 dissipat.

Ex Ramenta loti arboris in aqua aut vino
Galen. coquuntur ad capillorum defluuium, Gal.
simpl. in simplicibus.
e. ph. p. Melli alumen idem incoquit, radicem
 tithymali, vel phlomi, vino vel aceto ad-
 dentium dolorem.

Omphacium, succū mororum, vel bati-
 norum, vel granatorum, vel rhu, vel cydo-
 niorum, vel pyrorū agrestium, nucum vi-
 ridium cum melle coquit in stomatica re-
 media, radicem & semen arctij ex vino.

Dracontij radicem bis, ter ex aqua co-
 quit, ut acrimoniam deponat, & sit apta
 eclegmatibus.

Asphodeli radicem, ut amaritudinem
 perdat, quam scilla difficillimè amittit.

Bulbi radix cruda, vel semel elixa bona
 eclegmaribus, bis elixa amaritudinem to-
 tam deponit, & fit eclegmati inepta, cæ-
 pa, allium, porrum, ampeloprasmus, cocta
 bis aut ter acrimoniam deponunt, adhuc
 tamen

tamen thoracica sunt.

Ari radix in aqua, aut sub cineribus cocta mitescit, lib. 2. aliment.

Buglossum in melicrato coctum arteriacum est.

Brassicæ succus cum melle coctus elegma est.

Dactyli etiam in mulso aut passo cocti.

Serola & eadē acris substantia lactis coctione, vel immixtis lapidibus, aut circulis ferreis ignitis consumitur ad dysenteriam.

Hippuris ad eandem coquitur in aqua, si febris adest: in vino austero, si abest.

Faba oxycrato incoquitur.

Instrumenta coctionis sint vasa omnis generis, aurea, argentea, ærea, stannea, stannata, ferrea, terrea: sed hæc bene cocta ne qualitatem malam medicamento largiantur: & ea vel silicea, ut vocamus, seu cum Mesue lapidea, vel blombata, præstantissima sunt vitrea.

Sunt ea autem vel simplicia, vel composita & duplicia (balneum mariæ vulgò dicta) qualia ad olea etiam calida, & alia permulta Galenus commendat. Quæ tamen hodie ob avaritiâ, negligentiam, malignitatem non vsurpantur. Fiant igitur vasa sibi incumbentia, sed intervallo ubique digiti vnus diffusa, quod aquâ conti-

neat saepe sufficiendam, nisi maius vas minus quod medicamentum coquendum continet, in maius aqua feruenti plenum, & igni contiguum immittere, Galeni more. In vase lapideo, id est siliceo, ut vocamus, coquitur miua simplex, & citra condita Mesuæ. Eidem vase duplici coquuntur, oleum rosatum, violatum, nymphæatum, melinū, papaueris, myrteum, ex pomis mandragoræ, & anethinum, chamæmelinum, sicyonium, irinum, rutaceum, nardinū, mastichinum. Sicq; reliqua coquenda purem, quod oleum simplici vase coctum assequitur odorem tetrum & ingratum, ut interim vires frigidas frangi, calidas intendi taceam, diacodium in duplici vase coquit Heras igni fumi experti.

Crustum ex maza vel luto circūdatum scille vel scammonio, & aliis eius generis vasis locum obtinet, vti crustum idem & malum acerbum aliquod vel cydonium ipsi scammonio est tanquam vas duplex.

Finis coctionis est, cum scopum nobis propositum attigimus, vel simplicem, vel etiam multiplicem, ut si medicamentum coquimus ad vires eius augēdas, vel minuendas, vel abigendas, dum quātum satis est auximus, minuimus, abegimus, satis coximus. eodem modo in scopis alijs.

Sic

Sic quædam coquimus ad dimidias, tertias, quartas, librarum duarum, trium consumptionem, dum omnia sunt propè unita ad iustam crassitudinem, aut mellis sordium, cerati liquidi, emplastri consistentiam. Sapas coquendo siccamus, donec crassam assecutæ sint consistentiâ, ut seruari possint: sic & syrupos, eclegmata, electaria, vngueta, cerata, emplastra. De quibus singulis accuratius in modo singula hæc genera componendi, libro 3. dicetur.

Diamorum cum melle coquimus donec gratum erit, & absumpta humiditate excrementosa feruoris & putredinis effetrice seruari annū vnum possit: id quod mel citra idoneam coctionem succo mororum præstare non potest, licet fructus integros cum pediculo certis interuallis ne se tangant, in se mersos loco frigido integros in annum seruet.

Testiculi ad Elect. diascatyron.

Capita papaueris ad diacodium, capita ranarum ad oleum ranarum, vulpes ad vulpinum, viperæ ad pastillos theriacos & oleum viperinum coquuntur, donec ipsa coquendo in aqua intabuerint: stomatica & stomachica coques ad mellis, aut sordium crassitudinem.

*Gal.
Mes.*

Electaria mollia ad similem consistentiam

tiam, solida verò coctum magis saccharum requirunt:

Syrupos cum saccharo, aut melle, aut utroque coquimus, donec lentore tenaci & crasso inter extremos digitos explorato humorem excrementosum propè consumptum coniectabis.

Cocti sint syrapi quando incipiunt filum facere, siue cochleari effundatur paulatim, siue inter digitos eius portio tractetur. Vel quādo marmori, aut ungui imposita eorum gutta non diffunditur, nec aquæ modo diffluit, sed concreta manet.

Quæ plena sunt meliora, coctione deteriora euadūt: ut cassia nigra, thamar Indi. Mesues mannam, thamar Iados, medullam cassiæ in succis quibusdā depuratis dissolutā coquit cum aliis semicoctis ad mellis spissitudinem in diamāna, & in tryphera Persica, & in cōpositione alkekēgi. In cōfectione hamech eadē tria in infusione colata dissoluit, fricat manibus, colat, cum saccharo coquit ad mellis spissitudinē. In cōfectione mānæ Galeno tributa, mannā succo rosarum sufficiēti coquit igni blando ad sufficientem coctionem, teromarum in aqua rosarū, & cōpositione sequenti, coquit eandem cum saccharo ad mellis consistentiam.

Emplastra coquimus, dum manus attractu non inquinant adhæſu tenaci.

Coctū mel cum aqua, vino, aliis, in antidotos, & alia composita, tunc est quando marmori propemodum nihil adhæret.

Coctionis & tritura ratio propè est eadem in medicamentis, ut scilicet quantam hæc trituram viribus integris ferunt, tantam quoq; & coctionem. Quæ enim magna, crassa, lenta, sicca, dura, densa, nervosa, membranosa, virtutem firmā, & valenter ac penitus mistam sortita longiorem sustinet coctionem, ob id prima vasi coquenda immittuntur: qualia sunt metallica; terrea; styptica, quatenus styptica sunt (ros enim, absinthium, rhabbarum, aloë, myrobalani, agaticus, amarantus quoque qualitatem in superficie habent, & eam purgatoriam, ac facillè resolubilem, ob id minus coquenda quam styptica substantia postulat) radices ob id propè omnes, quia terrea magis: incisa aut confractæ, ut aristolochia, cucumer agrestis, hermodactylus, polypodium, & cetera, etiam post coctionem terendæ, ut proprius cribrentur in diasatyrio, Mel.

Sic rhabbarū quando astringere consiliū est, ac myrobalanos omnes diu coqui oportet: si verò purgare, tergere, apertire

rirc, parū coquēda, aut potius infundēda.

Mef.

Glycyrrhiza tamē parum diu coquēda, opinor, ne cūm admodum sit dulcis, coctione longa, dulcinm ceterorū modo, amara euadat: pręsertim cūm iam vetustate amaricat, cūm verò recēs est humiditatem excremētosa macta, cum aliis radicibus initio coquitur, vt in syr. hyssopi, ziziphorū, glycyrrhizę, & thoracicis aliis.

Acrida quoque diu coqui possunt si eorum acrimoniam obtundi volumus, nisi virtutem imbecillem, & facilē resolubilem sint sortita.

Mef.

Colocynthis, cētaurium parū cū floribus & semine, plenā coctionem tolerant.

Quę cōtrā sunt minuta, tenuia, fluxilia & friabilia, humida, mollia, rara, virtutem imbecillam, superficialiam, malē permistam sortita, parū diu coquēda sunt, ob id postrema sunt percoctis propē aliis iniiciēda, qualia sunt rosę & violę recentes. Siccę enim & harum succus magis coqui possunt. Gingidiū elixationem diurnā non sustinet Gal. lib. 2. alimentorum.

Bulbi exigua admodum elixatione sunt contenti: Daucus autem ad esum diutius elixandus quā pastinaca.

Paulus

lib. 7. c.

30.

Nullus florum coctionem recipit, ob id olea cum floribus facienda insolantur.

Si

Si autem flores valida sint odoris gratia, ut rosa, chamæmelum, quæ pluribus diebus constet, insolatu tenuius, & utilius oleum euadit. Qui verò flores sunt inualidiores, & facilius difflantur, minus diu insolantur, quia eorum virtus promptè vanescit, ut lilium, violæ.

Parum diu integris viribus coqui possunt epithymum, flores stœchados Arabicæ, diutius folia. *Mes.*

Quæ verò has qualitates adhuc infiores habent, coctionem nullam sustinent: sed sublatis ab igne aliis miscentur, vel adhuc calentibus, quando firmiora sunt: vel iam refrigeratis plurimum, quando ne vis eius tenuis & lubrica calore soluta in aërem exhalet metuitur.

Quæ purgant lubricando coctione non admodum iuvantur, Mesuæ: tamen cassia, manna, thamar Indi interdum ab eo coquantur, sed parum, nec adeò, ut vis eorum lubrica perdatur. *Mes.*

Quæ in horum sunt medio coctionem tolerant mediocrem, ut absinthium, asarum, agaricus, coccum gndium, fumaria, senna, scilla, iris, hyssopus, thymus, turbit, semina omnia præterquam cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli.

Rha barbarum exquisitū multam satis *Mes.*
coctio

coctionem & trituram sustinet, raro autem & laxo etiam mediocris coctio est vehemens, & eius virtutem resoluit.

Ibidem

Thamar Indi coctionem ferunt medio-
cre: multa enim vites eis omnes adimit.
Ob id ipsi & cassia liquore idoneo soluta,
colata melli aut saccharo ad humoris cō-
sumptionem cocto adduntur, & ad iustā
consistentiam percoquuntur, igni ablatis,
& parum refrigeratis pulveres miscentur.

Coquendæ igitur in plantis radices pri-
mæ, ut dixi, concisæ, vel cōfractæ, quibus
coqui ceptis semina sunt iniicienda, ex-
ceptis seminibus cucumeris, cucurbitæ,
melonum, citreoli, substantiam tenuio-
rem vreticā fortitis tunc etiam cortices
& ligna modicè cōfracta. Post hæc her-
bæ siccæ parum concisæ, aut si crassiores
sunt, cōfractæ, deinde virentes, incisæ
minutim, aut manibus torquendo cō-
fractæ, excepto omni adianto, & lactuca
agresti, quam endiviam vocant.

Deinde fructus exollati, & semine pur-
gati, excorticati, & (si magni sint) incisi, ut
pruna, ficus, myxa, zizypha, vuae passæ.

Postremi flores, epithimum, strechas:
sed chamæmetum licet tenuis sit essentia,
quia tamen fortiter mistam habet facul-
tatem, longulè coqui potest, ut schoenuā-
thos

thos, si haberi potest, heliochrysum, steechas citrea vulgò dictum.

Succi quoque siccati, liquores, gummi, resinae, manna, cassia, liquore aliquo soluta, sub finem iniiciuntur. Liquores enim vino vel aceto soluti, colati, cocti, ad humoris additi consumptionem, aliis extra ignem miscentur, rudicula semper moti.

Moschus, ambræ, caphura, lapides preciosi, pulveres aromatici, & cordiales ab igne depositis, aliis etiam tepentibus iniiciuntur.

Rosæ autem, rha barbarum, aloë, agarius, myrobalani, si purgatoriū vis medicamentum, parum diu, vt dixi coquenda. Nam vim eorum purgatricem superficialiam, parū firmiter mistam ab his corporibus raris coctio multa facile dissipat. Si verò astringitorium vis medicamentū, diu coquenda, vt dissipata vi purgatrice, terrea & astringens tandem foras eliciatur.

Violæ etiam parum coquendæ, quando purgare lubricando consilium est : si attrahendo, multū, vt facultas ea in ipsarum ceu centro posita foras trahatur, coctionis vehementia.

Mes.

Scammonium si in pomo est præcoctum, absoluta coctione iniicitur: si crudum est, crassius tritum miscetur in me-

dia coctione. non autem tenuius, ne etiam vis eius purgatrix exhalet, id quod & accidit coctione vel vnica, sed longa, vel duplici, vel si medicamentum diu ante usum seruandum est, vel si accuratius ante coctionem teratur.

Scammonium autem si calorem sentit, in grumos coagulatur: qua re fit vt interdum, in vna dosi alicuius medicamenti plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inæquale est medicamentum, ob id ad finem iniicitur.

Quod autem tritura similem esse viribus coctionem dixi, rectè accipiendum.

Calor enim ab igne vehementior, & tenuior, quàm ex attritu pistilli, mortarij, durorum terendorum: ob id etiam medicamentorum vires citius dissipat coctio, quàm tritura.

Quapropter aromata teruntur quidem, quanquam minus quàm alia: sed tamen quantum teri est necesse, non coquantur autem, sed reliquis iam percoctis, & ab igne depositis, vt dixi, miscentur antidotis, vel mollibus, quales veteribus in usu fuerunt, vel ficcis & solidis nobis usu frequentissimis, vt cinamomũ, agallochum. Sic aurum & argentum bonum & foliatum, quanquam diu coqui sustinet, vires
tamen

tamē nullas coctū tradit maiores quā crudum. sic margaritæ, cyanus præparatus, ambra, moschus non coquenda.

Coctio facta ad dimidias, tertias, quartas, vel aliam consumptionem, postea residendo, & albuminibus sæpe purgatur & colatur, deinde percoquitur, quod in syrupis frequēter obseruabis. Multis etiam coctio duplex debetur, vt vtrique antido to, alcanzi, catholico, diasatyrio vtrique.

Ad coctionem multis sæpe aliis medicamenta paramus. Quædam ante intus & foris purgamus, terimus, lauamus, as-
samus, vrimus, infundimus.

Quædam aliis iuncta illorum coctionem accelerant, sic vrticæ, radices carnibus incoctæ eas coqui celerius iuant: vt contra nymphææ radix incocta pisiss, ea ad vnum olla velut eiacularur.

Ichtyocola cum calce viua cito cocta mox dissoluitur. sed vide an affectus calcis viuæ vires requirat.

DE DESPVMATIONE.

Despumatio est spumæ detractio, cuius materia hoc loco est non solum succus quidam lentus includens flatum, vt Galeno in Aphorismis docetur, sed sordes omnis leuior à calore ignis expurgata, vel etiam granior albuminibus

coaeta & colligata. Despumamus autem nunc simplicia, ut succos, saccharum, mel: nunc composita, ut apozemata, syropos.

Mel cum aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio pro variis medicis scopis despumatur. Nam per se coctum mox immodice effernescit, & derepente exundat, & flammis conceptis incendij periculum affert. Adhuc cum sit dulcissimum, euaderet amarum, si per se coqueretur donec despumatum esset.

Mel a qua du pla de spuma- tur, si alius hu mor no expri- mitur. Mel humore æquali hodie quibusdam despumatur, aliis duplo. Spuma autem in terea dum igni læto coquitur, cochleari pertuso deraditur. Adhuc cum ad dimidias est coctum, & multum feruet, adduntur albumina singulis libris singula. Deinde camlidum colatur, post percoquitur per se, aut cum condiendis & incoquendis medicamentis. Spuma quoque tunc sicca emicat curiose detracta, si per se seruandum est. Vel in rem præsentem paratur ad pulueres comprehendendos, qualia sunt antidota omnia melle excepta, opiata & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum albuminis requiritur: quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

Sed huius regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumam, ita ut despumando & colando ad dimidias minuatur.

minuatur. Quapropter pondus duplum ei quod cōpositio exigit initio tibi immittendum, si cum aliis despumandū incoquis: sin minus, despumato vtendū. Finis despumationis quibusdā est tempus horarū circiter duarū cū igni lento. Aliis rectius cū spumare desinit, aliis donec aqua erit cōsumpta (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneū lētorē acquisiuerit.

Non autē probo cum Seruitore mellis libram vnā coqui in aquæ libris decem, continenter despumādo, & aqua hac propè consumpta libras alias quinq; addi, & his propè consumptis alias quinq;. Hoc enim modo mel aut vri, aut totū vanescere est necesse, etiam si aqua adsit largior.

Sæpe autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet cōctionē quàm aliorū natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur, cum scilicet multam cōctionē viribus integris sustinere possunt, vt in diacydonio mel coquitur cum succo cydoniorū, & coquendo frequenter despumatur, & aliis passim. Frequētius tamē per se (vt dixi) despumatū miscetur conditionis, syrupis, antidotis: rarius crudum, præsertim nostrās. Quod autem album Gallia Narbonensis thymo passim

luxurians mittit, est præstantissimum nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thymi larga luxuries vtroque consentiant.

De saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiam Dioscoridi & Galeno.

Impurum enim & nigrum, aut nigricans in triplo humore despumatur. cum ad dimidias est coctum & valde feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidum, post percoquitur studiose: interim etiam despumando si spuma aliqua appareat.

Si autem purius est, satis est dupla aut æqualis (vt ferè fit) aqua, & pauciora albumina, si purissimum nec despumandum, nec clarificandum.

Succi fluxiles recipiendi in syrupos, apozemata, electaria. quædam igni despumantur, residendo clarescunt, & in colo laneo terreum excrementum relinquunt, interim verò etiã additis albuminibus, & melle aut saccharo purgantur, quoties in syrupos, vel apozemata coquantur, vt in syr. bizantino, & aliis, & in elec. psyllij. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel sole, vel igni post mitionem siccantur, non despumantur.

Liquores

Liquores verò solum colo purgantur post dissolutionem, nō etiam despumantur, tantum abest, vt clarificētur. Idem de metallicis & animalium partibus cōstitue.

Quod si simplicia omnia sunt pura aut purgata, satis est horum decocta per colum laneum aut telalaneum: sed modicè densum semel aut bis trāsmittere sine vlla expressione, colo, si opus est, mutato, deinde ipsum immitte in saccharum, si impurum erat clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & percoque donec humoris, seu decoctum est, seu succus, seu aliud, vnciæ tantum circiter duę: aut si succi sunt glutinosi, etiā tres & quatuor in sacchari libra supersint. Si succi acidi, percocto iā saccharo ppē toti inuoluuntur, vt dicemus initio syruporū.

DE CLARIFICATIONE.

Clarificationis obiter in despumatione memini. De ipsa autem nunc pauca mihi sunt dicenda, quòd hæc rerum liquidarum decoctis debeat expurgandis, vti & despumatio & colatio, vt sorde crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuantur & salubrius. Clarificantur autem quædam per se, dum quod sœculentum est subsidet: vt succus rosarum, limonum, cydonio-

rum, citrorum, ribes, oxyacanthæ, granatorum, siue mox reponatur loco frigido, siue in officina aliquandiu seruetur. Quædam interueniente coctione à sole, vel igni, vt succus pomorum dulcium & acidorū ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat, vt syrupus de pomis Mesuæ fiat. sic succus acidus citri ad partis tertię consumptionem coctus & colatus quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorū ad partis tertię consumptionem coctus, biduum quiescere sinitur, vsque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter, vt dixi, & in syrupis dicturus sum, recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, vt calor homogenea in vnum cogat, & separet heterogenea: quomodo vrinæ in nobis cœptæ coqui turbidæ si reddantur, postea tenuantur, & clarescunt, subsidente crasso.

Cum verò calor ignis sordes in succis exquisitè separare non possit, vt noster calor natiuus aliena coctione perfecta se gregat, cūque metumimus ne coctione tam longa succorum facultates corrumpantur, Satiùs putauerūt medici cœptam ab igni sordium secretionem arte alia
iuuare,

iuuare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, vt nuper dixi, nunc aceto simul incocto, nunc agitatiss diu albuminibus: vt interim despumationem omittam & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctorum purgationem.

De ea autem clarificatione, quæ sit per se, & post coctionem residente, satis est dictum. de ea quæ sit per acetum & albumina iam nobis dicendum est.

Decocta & syrupi, si acetum recipiant per se, vi aceti nonnihil purgantur: melius autem si etiam albumina accedant, etiam si post colaturam acetum recipiât: quando nihilominus continenter est despumandum, quòd acetum etiam ex purgato iam decocto spumas & spurcitiam quandam iaculetur.

Qui albumen ex aqua frigida scopulis agita, donec in spumam abeat, quam particulatim syrupo, vel alteri decocto feruenti inspergas, & vbi nigruerit, cochleari foraminulento deradas, nouam inspergas: id fac donec erit syrupus clarior. Alij vbi ex bullis clarius decoctū vi ignis factum animaduertunt, in id tepidum (nam calidius albumen coqueret, in frigidiorē minus promptè & parciore spuma elicitur)

*Nicolaus in
syr. rosa
to.*

albumina singulis libris singula, sed etiam pluribus pauciora iniiciunt, scopulis agitant, ut spumescat, saccharum in particulas contractum coniiciunt, recoquunt: ubi spuma subsedit, igni aufertur, calidum, si crassum est & vix colabile, colatur: si facile colatur, sed turbidum, tepidum vel frigidum colatur per manicam Hippocratis, melius autem per pannum clavis quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter, quater, si non satis claruerit: si ne sic quidem albumen separatim in aqua agitatum, scopulis inspergitur decocto igni reddito, spuma illa vsta, alia iniicitur, idque toties donec bullae clarum satis produnt. Tunc colatur quoties est necesse.

Cribrationi colatio, ut ante dixi, est persimilis: sed illa ferè siccorum est, hæc humidorum. Illa corpora graviora foraminibus cribrorum non transmittit, hæc eodem humore crassiorē transitu prohibet.

Eius differentiæ ex eo sumuntur, quod quædam calidissima colantur, quædam frigida, quædam tepida. Item quod quædam vno, alia duobus, alia tribus colis egent. Item quædam colis lineis, alia cannabinis, alia telalaneis, alia setaceis & stamineis, ut vocant, alia novis, alia detritis, alia raris, alia densis: alia bis, ter colanda donec

donec nobis propositam perspicuitatem
sint assequuta, vt in syrupis, ex succis fru-
ctuum & herbarum, & ex decoctis leges.

Quæ crassa sunt aut lenta calidissima
sunt colanda, & humore ampliore vel tū
diluenda sunt, vel initio coquenda, vt fa-
cilis transmeēt. Colo eadem raro & de-
trito promptius colantur, non tamen pu-
rius, sed frequens colatio coli densitatem
supplet, ac raritatis incōmodum redimit.

Oenomeli colatur panno raro.

Tenuia vt succus limonum, citri, semi-
frigida, colo dēso, & nouo colari possunt:
aut si tribus colis ea vis purgare, summū
sit stamineum, medium panneum: sed
vetus infimum, panneum & nouum, vel
aliter densum.

Sacchari libra si aquæ tantum vncijs
octo sit soluta, cocta, clarificata, panno ra-
riore colanda est.

Colis tribus vsi sunt maiores nostri,
summo, minimo, & rarissimo: infimo, ma-
ximo & densissimo, tertio horum medio
magnitudine, raritate, situ, vt tamen ab
vtroque digitorum 4. interuallo distaret.

Magnitudinis autem & texture horum
ratio erat, vt primum sordes tantum cras-
sas transitu prohiberet, secundum etiam
mediocres, tertium etiam tenuissimas, vt
scilicet,

scilicet quod ad hoc transmittebatur esse illime, & fordis omnis expers. Si verò solo raro vsi fuissent, colata fuissent impura & nō colatis similia, vt si per linteum colas aliquod decoctum: si solo denso, id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset, ob id vel mutandum, vel sæpe abluendum fuisset. Quod si vnico voluissent vti medio, rationabilius & facilius vsi fuissent. Minimū verò primum, quia in eo humor incipit latius spargi versus panni ambitum, vt vides non in laneis tantum, sed etiam lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autem partibus quas imbuunt, defluit, ita vt in secundum influat latius, q̃ in primo humor cōtētus cernitur. Secundū item latius imbuuntur, q̃ quibus partibus humorē à primo excipit, & pluribus partibus stillat in infimū quā sit cōtactum à defluente ex primo humore.

Malè igitur primum statuas maximū, quanquam ex hoc nullum sequetur incommodum aliud, quā quòd otiosa est hæc capacitas: Satis enim est si capiendū humori sit satis: quantum intelligi vouldum minimum requiro. Non enim minimum absolutè volo, sed aliis duabus angustius: si verò infimum sit minimum, multus

multus humor ab hoc non colatus prope ipsius oras in vas subiectum defluet.

Nunc vnico vtimur colo magnitudine & textura mediocrī, sed eius actionem ante iuuamus clarificatione per albumina omnem spurcitiam cogente, adiuuante id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeāt, tepida. quæ si semel colata non sunt pura satis, iterum & tertio colamus, & rectius colū aut lauamus aut mutamus. Id quod etiam facimus dum tardius humor permeat: si autem tardius transfluat ob decocti crassitiam aut lentorem, vel calidius colamus, vel per colum rarius, vel si compositi natura patitur, liquidius aliquid & tenuius miscemus: vt dum cremori hordei colando, aut pisorum, aut fabarum, aut similium decoctum ipsum affundimus. In tarda autem hac colatura, caue, rudicula vel digitis fundum colī scalpas, vt colationem celeres. Sic enim turbidū erit colatum: sed vt dixi muta colum aut laua, aut humorem redde liquidiores, vel igni, vel misto humore aliquo.

Colamus quoque etiam citra coctionem quædam, vt lac recens mulctū, vt pilos & sordes alias foris illapsas separemus, quæ vsum rusticis, & pastoribus præstat.

stat interdū aparine. Sic hodie vinū cum saccharo & cinamomo per cola lanca oblonga pyramidis figura (quę caligas & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarum erit, idque Hippocraticū quoque vocamus, tāquam inuentore Hippocrate dignum.

Aliter etiam cum melle, & ceteris colamus ad claritatem, & cœnomeli id, ac melites vocamus clatetum.

Modo perlimili gelatinam quā vocant colamus, vt ante à nobis est scriptum.

Quædā his citius clarificandis miscentur, vt si vni quartæ vini albi duos lactis digitos misceas ante colaturam, ipsum mox clarissimum reddunt.

Aliter quoque res turbidæ colātur aut mistæ: sic in Ægypto aquam Nili turbidā vasis figulinis crudis colari docet Galen, vt tantum quod clarissimum est per vasis poros, aut etiam teneſam & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romę Tyberinam, vasis figulinis coctis probè & siliceis præsertim, aliquandiu in cella vinaria deponunt, vt refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

Aquam quoque turbidam colabis per arenas puras vasi immixtas inſerue pertu-

ſo,

so, foraminibus exiguis aquæ peruiis, inuiis arenæ.

Vinum quoq; aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceum tenue, citò perfluit: aqua autem in eo retinetur, vt sæpe sumus experti, ex Catonis doctrina.

DE AROMATIZATIONE.

AROMATIZATIO nobis vocatur conditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem, & cor ipsum recreantis gratiam, adhibita mistis rebus aromaticis.

Simplicibus, vt moscho, ambra, caphura, zingibere, cinamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xylaloë cortice citri, santalis: vel compositis, vt Gallia aromatica, Gallia sebellina.

Mesues aromatizat moscho diasatyriū aqua rosarum soluto, & aliis misto electarium, sarboteng diasatyrium, secundum aromaticum rosatum stomachicum.

Syrupus ex corticibus cytri, cydonia condita. Citra autem condita, moscho & ambra aromatizat.

Caphura autem syrupum acidum de pomis, Trochisco Galliæ Sebellinæ, moscho, ambra, caphura.

Hydromeli quidam aromatizant speciebus,

ciebus, vt zingibere, croco, cinamomo, macis, & similibus.

Nodulus ex panno lineo raro continens croci, cinamomi, calami aromatici, spicæ, zingiberis, piperis nigri & longi, ana drachm. i. & dimidiam syrupo stœchados immittitur, & suspensus manet ad condiendum, seu aromatizandum. sic miua aromatica nodulo aromaticum pleno in ipsa suspensa & sæpe confricato, vt ante in confricatione diximus.

Syrupus de mentha aromatizatur Gallia aromatica.

Conditum citri Gallia, moscho, croco, mastiche.

Conditum buglossi, moscho & gallia.

Syrupus ex omphacio, caryophyllis.

Syrupus intybi compositus santalis, cinamomo, xylaloë, cortice citri.

Sic alia multa præter consistentiæ & saporis gratiam, odoris quoque incunditatem, sed etiam coloris, de quo mox, requirunt. De quibus abundè à nobis scriptum est in methodo medicamenta componendi, dum hæc rationem in compositis habere docebamus, interdum sine qua medicamenti actio nõ fiebat, & per quam melius fiebat. Iulepos ex syrupis & aquis destillatis hodie misceri solitos,

apozemata , cinamomo , & santalis aromatizamus, immisſis colo horum drach. circiter duabus in humoris libras ſingulas, aut pluribus, aut paucioribus pro vario medici ſcopo. Et vinum aromatites, & quod Hippocraticū vocant, & alia multa aromatibus condimus.

D E C O L O R A T I O N E .

CO L O R A T I O quoque multis medicamentis acquiritur ad gratiam magis & iucunditatem, & terrorem auferendum, & cauſas alias, quod etiam lib. 2. methodi medicamenta componendi docuimus. Sinopidem aliqui, alij ochram cerato Galen. dia euphorbiu miſcuerant, vt hoc colore fucatum ceratum, vnde componitur, lateret: miſceri poteſt floris ſalis aliquid, aut ſimile quod colorē eius mutet, neque vim eius minuat.

*Gal.
Lib. 6
metho.
Idem
Ibid.*

Quę Galeni verba diligenter ſunt obſeruanda, ne ſcilicet coloris mutandi ratio vires nouas medicamento acquirat, aut priores augeat, vel diminuat, ſiue colorem mutare libet nouare miſta, vt in oxycroceo: ſiue vno aliquo ſimplici aliter atque aliter preparato, vt ceratum Galen. ex ærugine cruda viride eſt, ac terrens ægros: ex eadem uſta eſt melinum, vt Galenus docet lib. 2. c. ph. g.

Sic ex cerusa cruda emplastrum est album, ex ochra pallidum, ex iisdem probe vstis rubrum.

Solus quoque motus colorem quęsitū sæpe medicamento acquirit, vt ex lithargyro nutritum longo pistilli attritu fit albius.

Penidia quò diutius rudicula, & manibus tractantur eò albiora euadūt, etiam si ex vili & impuro saccharo fiant: sic pilulæ albæ, diairis simplex, diatragacanthū frigidum, sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

Mel crudum & coctum in antidotis diu commiscendo albius euadit, & cætera mellita.

Iulep coctum ad succorum in syrupis cōprehensionem, baculo diu versandum vt albescat, & alia multa simili agitato albescent. fortè quòd aër multus in commiscendo receptus alborem conciliat.

Sic album Rasis vnguentum & citrinū, & emplastra diachylon, & ceratum Gal. refrigerans album, de cerusa, gratia dei multum diūque subigendo, trahendo albescent, & oxycroceum pallefcit.

Oesypus quamuis niger est, multa agitatione album facit emplastrum, vt glutinosa alia.

DE EXCEPTIONE.

EXCIPIUNT VR & comprehenduntur colliganturque, seu vt vulgo loquuntur incorporantur medicamenta humore aliquo ad saporis gratiam diuturnitatem, virium conseruationem, fermentationem, medicamenti constituendi formam, vsum dexteriores.

Eclegma ad asthma melle excipitur, vt sit suauius & vsui aptius.

Eclegma amygdalatum excipitur melle, & succo fœniculi.

Electaria præpè omnia, præsertim mollia melle excipiuntur ob dictas causas, sic ea saccharo humore aliquo soluto, pulueres succo cucumeris agrestis comprehenduntur in hiera Hermetis.

Pilularum materia excipitur vino, succo absinthij, solani, foliorum citri, brassicæ, apij, intybi: pilulæ aureæ muccagine tragacanthi, cocciaë Rasis & Mesuq succo absinthij.

Pilularum Hermetis species ladano excipiuntur cum pistillo calido.

Trochisci galliæ moschatae comprehenduntur muccagine tragacanthi in aqua rosarum soluti, vel ambra oleo balapino soluta.

Mel, quo solutina excipiuntur, vino

quam aqua potius coquendum & despu-
mandum, nisi aliquid prohibeat.

Exempla alia ipsius, vt sic dicam, incor-
porationis in electariis Mesuæ, antido-
tisque aliis & ceratis, & emplastris tam
sunt multa, vt nemo desiderare possit. nec
plura describere libuit, ne oratione pro-
lixa displicerem.

DE FORMATIONE.

ORDINE rerum gerendarum succe-
dit medicamentorum comprehen-
sioni ipsa eorum formatio cuiq; compo-
sito sua: cum scilicet vnumquodque for-
mam habet idoneam, quæ in quibusdam
à consistentia differre non videtur, vt in
conditis, sapis, syrupis, eclegmatis, apoze-
matis, antidotis mellitis, pilulis, trochi-
scis, vnguentis, ceratis, emplastris. Forma
ipsius compositi est cōsistentia liquidior,
crassior, mediocris. Sed in multis præser-
tim siccis, præter hanc consistentiæ formā
alia quædam nostris manibus, aut alia re
apprimitur, vt saccharum in vasa dum re-
cens coctum est coniectum, illorum for-
mam, pyramidis scilicet ac metæ cuiusdā
retinet, & quæ ex saccharo imagines for-
mātur, aut cera, aut alio dum calet liqui-
do, ob id terminum alienū facile induēte,
dum refrigeratū coinit duro, ob id formā

tunc

tunc assumptam pertinacius retinente: sic electaria solida & tessellas, nunc rhomboides, nunc quadratas, nunc quadrangulas: sed altera parte longiores, quales manus Christi vulgo dicuntur, nunc triángulas: sic pilulas fingimus orobeadas, id est, magnitudine & figura orobi, vel ciccris, scilicet orobei, nō arietini quod inæquale cū sit & acuminatum, figuram habet pilulis ineptam, sic & κίκκλια, id est granula seu pilulas paruas (vnde vt dicemus lib. 3. pilulæ cocciaë Rasi, & vulgo dictæ videntur) granorum scilicet paruorum magnitudine & forma fingit Paulus.

Trochisci quoque complanantur, & in medio cauantur, & ferè postea sigillo aliquo pressi notantur. Qua de re mox quoq; dicturi sumus, vnde & à forma hac, vt pilulæ à parua pilæ effigie, nomē sibi adoptauerunt, & præter id aliæ quoque. nam cyclisci, id est, parui circuli, & artici, id est pastilli, seu parui panes etiam Græcis appellantur. Sunt enim velut circuli, hoc est, superficies planæ vna circumferentia à centro æqui distante, conclusæ, non autē sphærica sunt corpora, vt pilulæ.

Cerata & emplastra formamus in offas, quæ apud Galenum *μαρμαρία* vocantur (vnde vulgo corruptum puto vocabulum

magdaleones) hoc est, cylindræ quædam figuræ.

Quædam trahendo manibus ex vnco ferreo producantur, intorquentur, & in quamlibet figuram mutantur, vt penidia, & quæ alpheni vocant.

Qualiter quibusdam quoque trahuntur emplastra, diachylon, gratia dei, sed post in magdalias componuntur.

DE SIGILLATIONE.

SIGILLATIO quoq; (vt vocant) seu sigilli alicuius impressio, inter præparationis differentias numeranda est. Quæ quâuis haud ita magnarum virium esse videatur, vt cum ex pilulari forma per sigillum ligneum fingis trochiscos, tamen & per se veteribus magni momenti fuit, & per accidens sigillatio. Per se quidem, cum terram Léniam sigillo Dianæ imaginem habenti notabant, à qua facultatē aliquā his trochiscis imprimi putabant, vti & Nichepsos rex anulis insertū iaspidem viridem draconis radios habentis imagine scalpi volebat, quod tamen ceu vanum reiciendum censet Gal. Quanquā & illa Dianæ imago in sphragide lemnia, hoc est in sigillo, seu sigillata terra Lemni insulæ, etiam per accidens proderat, quod pastilli hac notati planè veri significaban

cabantur, non quo hodie modo omnes adulterinae nostrates terræ sigillatae. Idē ad me Constantinopoli sunt delati, characteribus variis à Turca obsignati.

In pastillis quoque Theriacis, & medicamentis omnibus, quæ ab exteris corrogamus, utinam vel characteres aliqui, sed certi fide, vel publica, vel principum apprimerentur, quod pannis laneis, & sericis gentes multæ etiam hodie factitant. Non enim toties grandi pecunia adulterata & spuria pro veris reciperemus, aut saltem qui vendunt primis institutoribus, & hi deinde aliis chirographo, aut sacramento aliquo cuiq; verendo vera se vendere affirmarent, sed nostra opinor socordia illos efficit audenter furaces. Cum enim vera ignoremus, neque illa novisse multum hætenus sit à nostris pharmacopolis laboratum, facile illis imponitur. Incumbite igitur, incumbite modis omnibus, ut vera deinceps habeantur. Homini elephantico dedi, nō multis antè mensibus trochiscorum theriacorum libras propè duas, quibus non est mutatus magis quàm si terram sigillatam nostratē devorasset: tamē qui vendidit affirmabat ē monte Pessulano allatos & veros. Quod tamen falsum illi ex Galeno

probaui, tamen quia egebatur, & veros affirmabat, grandi pecunia emimus, nullo tamen, vt dixi, successu. Quæ fraus in cæteris quoque medicamentis, nisi diligenter cauetur, latè patet, magna animadversione coercenda.

DE REPOSITIONE.

Repositio medicamentorum tam simplicium quàm compositorum in locum aliquem, tum communem, tum proprium ad conseruationem (de qua mox dicam) magni est momenti, & item quòd quædam per se reponuntur, alia cum aliis ipsorum virtutem conseruantibus, vel etiam augmentibus, aut saltem quàm minimum fieri potest minui permittentibus. De hac generatim quædam diximus libro tertio methodi medicamenta componendi, sed hic paulò fusius dicendum.

Reponimus quæ seruari volumus, conseruationem verò nihil tam variat quàm putrefactio: quàm ambiens calor, aut frigus, aut aër corruptior, aut excrementosa rei seruandæ humiditas, & calor imbecillus accersere solet. Ob id quæ integra diu seruari volumus, omnino siccamus, tum absumpta ipsorum superflua humiditate, tum mistis siccantibus: sæpe etiam astringentibus: sic condita, sapas, syrupos, antidota

dota ex humidis praesertim temperata, pilulas, trochiscos, & vnguenta quaedam, & cerata, & emplastra igni, vel sole siccamus, misto his quae sumuntur etiam melle, aut saccharo, aut utroque remedio siccante: aliquibus, & acerum, & sal profunt, aliis metallica, & terrea ob siccitatem putredini diu resistantia.

Ergo quae reponenda sunt simplicia, & composita omnino quantum opus est sint sicca: sic & vinum feruendo in lacu, aut dolio humiditatem corruptionis sui, & feruoris ardorem si validum est, nec ea tam multa consumit. calorem externum vitamus fuga solis, & res ipsas in loca minus calida, aut etiam frigida seponendo. Frigus immodicum & gelu ab his tantum prohibemus, quae humida cogi possunt, ut aquis distillatis.

Calorem internum imbecillum fouemus, prohibita eius exhalatione. ob id quae seruamus omnia loculis clausis, & vasis obturatis reponimus, nisi valentissima sint: theriaces enim vas saepe detegi vult Gal. ut expiret. Ad haec rha barbarum, ut viribus integris diutius seruetur, vel cerasola, vel cera cum terebinthina, aut melle albo circumlinit. Mel, vel psyllio, aut milio mergit. Agaricum idem cum zingibe-

re, dauco, ligustico, polypodio querno
seruat, vt eius actio vegetior reddatur. A-
loë seruatur cum aromatibus aut bdellio,
& alia similiter in Mesuæ simplicibus.

Cassia verò in fistula sua felicius serua-
tur, nec purganda ante vtendi tempus. Fi-
stula autem in sabulo cellis vinariis in-
fossa, siccati præproperè prohibetur.

Colocynthis integra diutius seruatur
quàm emedullata, & melior ac salubrior
euadit cum mastiche, galanga, & aliis sto-
machicis, hepaticis, cardiacis.

Phialæ succo rosarum, granatorum, li-
monum, cydoniorum, & similibus seruando
destinatæ habeant in fundo emissarium,
ne inuertendo fuga olei superfusi succus
turbetur, & sex cum tenui misceatur, & sic
turbidum pro puro succum vsurpes.

Crusta quæ melli & medicamentis qui-
busdam tempore accrescit, integra & im-
mota seruanda est, si vis pharmacum diu
manere integrum & immutatum. Gal. lib.
2. alimentorum. Quæ prouidentia succis
prædictis, vino quoq; & cæteris est com-
munis. Diabesasa stanneo vase reponi
vult Heras lib. 8. comp. ph. p. Gal.

Medicamentum stomachicū vase cor-
neo reponitur, eodem libro.

Terebinthina vase ex ferro albo, aut vi-

treo, aut filiceo seruatur melius quàm ligneo, aut terreo, nisi sit vitreatum. Vase vitreo, vel plumbeo hieram reponit Paulus.

Theriacen vase non ligneo, vt hodie fit, sed pretioso reponit Galenus.

Oleum vasi filiceo, lapideo, plumbeo in cella vinaria probè diu seruatur.

Pulueres cardiaci vase vitreo stricti oris operculato reponuntur.

Flores & omnia incundum odorem reddentia arculis tiliaceis.

Semina etiam chartarum inuolucris, & suis folliculis vtilius, & innocètius interdum seruantur. Liquida medicamenta seruantur, densiore materia, vt argentea, vitrea, cornea. Fictili etiam, modò nō rara: interdum & lignea, præsertim buxea. Ocularia medicamenta, & alia quæ acetum, picem liquidam, cedriam recipiunt, æneo vase seruanda. Adipem & medullas vasis stanneis, seu ex plumbo albo reconde, hæc Diosc. Herbaræ igitur siccentur, & fasciculis aut manipulis colligatæ.

Quæ componendo cocta, aut aliter calfacta sunt, nō nisi refrigerata sunt reponenda.

Diacodium refrigeratum reponit Damocrates, apud Gal. lib. 7. c. ph. p. & similiter composita propè omnia Mesues.

Loco

Loco non vliginoso & madente reponantur medicamenta, exceptis paucis, sed ædium parte sicciore. Quæ reponuntur, si præterea feruere debent, vas nō repleāt, vt sit locus & spacium quo perspirent: sic vina doliis non plenis reponūtur primò: sic conseruæ insolatu coquendæ, vasis non plenis coquuntur: sic theriacen vasis non plenis reponit Galenus, quo tempore adhuc à suo calore coquitur & feruet.

DE CONSERVATIONE.

HÆc de repositione sufficiant, in quibus tamen ob rei affinitatem conseruationis quoq; obiter coacti meminimus, sub qua & medicamentorum simplicium & compositorū durationis tempus comprehendimus. Vt enim nō minor est virtus quàm quærere, parta tueri, sic non satis est medicamenta probè delecta esse, sed ad conseruationem cōmodè reposita esse, & quādiu integra cōseruari possunt, sciendum est. Nam si mors etiā saxi numinibꝯque venit, omnia tam simplicia quàm composita aliquando corrumpuntur, hæc citius, illa tardius: idq; vel ob peculiarem cuiusq; naturam, vel aëris constitutionem, vel repositionis differētiam.

Herbæ quotannis sunt mutandæ, & flores, & quæ ex his distillantur aquæ præsertim

sertim quæ vase duplici, aut vapore aquæ feruentis distillantur. Humidiores enim sunt quàm quæ ignis flamma, & carbone, etiam per cinerem, scorie ferri pulverem, sabulum distillantur.

Aqua tamen vini quæ frequētī distillatione est purgata, diutius seruatur vase vitreo cera obturato. Seruantur autem herbaræ siccatae sacculis cannabinis rarè textis ne putreant, nève puluerulentæ euadant.

Radices multæ diutius seruari possunt, vt in delectu diximus lib. i. vbi & de reliquorum quoq; duratione quantum sufficit, scripsimus. seruantur siccatae per se aut conditura ex saccharo, aut melle per se suspensæ in aëre libero si magnæ sint, in sacculis cannabinis si paruæ, fructus in melle conditi sic, vt se non tangant, & loco frigido repositi annum seruantur recentibus simillimi.

Idem & flores vasi inclusi aqua fluente tecti annū seruantur. Vinum musteum dolio picato impositum, & eodem bene operculato sepultum dies quadraginta aqua fluente, vel aliter pura, annum totum dulce permanet Catoni. Idem cera inuoluti, farragini impositi, aut surfuri, diu seruantur recentibus similes.

Herbarū quoq; folia citra siccationem
sibi

sibi simillima diu seruantur inter papyri folia: sic tamen vt non premantur præsertim quæ succulenta sunt. Nam hæc mor mucida & putria euadunt si premantur.

Aloë etiā solario appensa tres, quatuor annos viua, & germinans seruat, & aizoon, & telephium ob succi crassi copiā.

Quin & cæpe, allij, scillæ, ari, dracontij, cotyledonis, satyrij, & aliorum quorundam radix bulbosa succo crasso lēto plena diu seruat, citra vllam à nobis, aut aliundē siccationem manifestam.

Metallica & lapides vbilibet probè seruantur, si sordes & puluerem vitabis.

Cōposita autē medicamenta nobis hodie variè seruātur: nam condita humida, eclegmata, syrupi, electaria mollia, vase vitreo, vel siliceo, vel terra dē fiore potius quàm stāneo plumbi vitium retinēte seruāda. Electaria autē sicca arculis faginis, aut pixi dibus vitreis, vt pulueres & trochi sci. Catapotia aut ferè aluta inuoluta, pyxi dē stānea includūtur. Olea, vnguēta, cerata liqda vitreis, lapideis, stāneis: emplastra verò in magdalias formata, papyro vndiq; præterquam extremi medio integuntur.

DE CONDITURA.

DE cōditura nūc dicēdum, q̄ ea sæpe coctio quædā est (de qua & præparation

tion

tionibus aliis ipsam coctionem sequētib; abundē diximus)& cōditura cōseruationi non parū confert. Cōditura fera est radicū, herbarū, caulicūlorū, aut germinū, florū, fructū, seminū, interdū & corticū. Fit item ferē saccharo, vel melle, vel vtroq;, interdū syrupis, iulepis, sale, aqua falsa, aceto & aliis quæ ficcādo, & humiditatē superflūam absumendo, astringendq; à putredine res vindicant. Cōdiuntur enim prædicta ferē ad cōseruationem tutiorē, sæpe tantū ad saporis gratiā, sæpe ad vtrūq;, vt succus mororū in diamoro melle cōditur. Possisq; cōditura generatim dicta etiam syropos, & antidota plurima, & pillulas, & trochiscos comprehendere, quod hæc humore aliquo iucundo cōprehendūtur, vt sint iucūdiora, & facilius sumi possint: sic rosæ, violæ, & flores alij melle, aut saccharo cōdiuntur, & fit mel rosatū, violatū, vt in cōditis Mesuæ diximus, & lib. 3. dicemus.

Conditura fit humore hoc iucundo per totum corpus condiendum insperso, vt dum flores & fructus condimus, & corticem citri, & cucurbitæ, lactucæ, caules, & alia plurima: sic myrobalani recētes condiuntur, aut humectatæ prius si erant sicciore, vt docuit in simplicibus & con-

ditis

ditis Mesues, interdum tanquam crusta quadam saccharo integimus magis ad saporis gratiam quàm ad vires, vel augendas, vel conseruandas, vel minuendas: sic semen coriandri, papaueris albi, absinthij marini, anisi, fœniculi, apij, & nucleos persicorum, strobilorum, pistaciorum, amygdalarum dulcium, & si libet amararum saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinamomi.

Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, vt emblicas myrobalanos aromatibus cōdiri Mesues scribit, & alia etiam composita: sed cōdiri, tunc aromatizari potius significat, quanquam & ad saporis gratiam id etiam fiat, vt in fartura mox dicam.

Condiendā si magna sunt, ferè in particulas secātur, vt condituram promptius vbique sentiant: sic cydonia, sic persica, & radices magnæ sectæ condiuntur.

Tamē fistula cassiæ tenera conditur integra, & nux moschata cum cortice viridi, qualis nostrarum nucum integra conditur, & parua citrea, arantia, melones parui adhuc & teneri.

Quanto autem melle, saccharo, vel alia condiente materia sit opus, & quis modus condiendi, hoc est incrustandi, præsert

praesertim semina, & nucleos, leges lib. 3. sectione prima.

Flores capparis nondum apertos intersperfo sale cōdimus: nam si soli reponantur, putrescunt. Eodē modo & in eosdem vsus flores genistæ, & his odoratiores sparti flores, quibus tamen post acetum affundimus quantū omnia tegere possit.

DE FARTURA.

Fartura condituræ quædam differentia est: fit autē ferè dum cavitas quædam manifesta odoramētis, vel aliis scopo proposito idoneis impletur: quomodo & coqui pullos, anseres, porcellos, & alia quædam herbis nostratibus aromaticis, & floribus, & lactuca, & appetitis aliis, interdum additis etiam aromatibus farciunt ventrem totum inferiorem, & sæpe etiam spacia inania inter carnem & cutem vi deducta.

Sic elignatæ radices eryngij & sectæ loco matricis (cor vocant) caryophyllo, & cinamomo humectatis farciuntur à Mes.

Anserem exenteratum carnibus felis annosi, & herbis nervosis farcimus, ut inde eliquatus adeps sit medicamentosior.

Farcitur pileolus ex bōbace, aut aliud epithema cephalicū, vel stomachicū aromatib. & aliis cephalicis, stomachicisq;.

Præterea vt coqui carnes auium torrendas, caryophyllis, & frustulis cinamomi configunt ad odoris & saporis gratiâ: sic nuges virides maceratas, & coquendo teneras redditas, & radices satyrij, ex secundo cicerum decocto ad iustam tenebritudinē coctas, caryophyllis, & cinamomi frustillis configimus, & cydonia in particulas condienda. Quæ res ad farturam, vel vnâ cum fartura ad aromatizationem reduci potest.

DE PUTREFACTIONE.

Putrefactio coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus: non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium vt fimi corticum facta. Vt oleum in folliculis vlmi inuentû, phialæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum ob putredinem vigentem calenti obruatur: deinde insoleatur, & quod eius clarum supernabit transuasetur, omnium vlcerum remedium est præstantissimum.

Sic ex vino facimus acrum tenuius, & acre magis ac mordax. Facimus autē vel insolatu, vel immisso aceto valentissimo in vinû, vel foliis, surculis & ramentis sorbi, vel

bi, vel parte acida citri immiffa Gal. lib. 1.
alimentorum. Sunt qui linguas lampetæ
noſtratis ea cauſa immittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte
in primo animalium lacte nutritorum
ventriculo corrupto fit coagulum: omnia
ob putredinem acia, & caliditatem no-
uam adepta, amiſſa autem naturali.

Sic chalciteos partes duas lithargyri,
vel cum Dioſcoride cadmiæ partē vnā
aceto acerrimo ſoluit Galenus, ac æſta-
te media, ſeu diebus calidiſſimis quadra-
ginta in olla noua fimo obruit, vt fiat pſo-
ricum. Talis putrefactio in vſu eſt maxi-
mo chymiſtis.

Sic adeps vetuſtate putris Galeno ex-
petitur ad emplaſtrum diachalciteos, &
oleum vetus ac ita ſemiputre, vnde &
graucolentiam acquirit: ſic vetuſtate pu-
treſactum caſcum decocto pernæ ſalſæ,
coquit Gal. ad tophos.

Quid quod vinū & ſucci reliqui dum
ab humiditate excremētōſa feruēt, quo-
dammodo putrent, & flores ſaccharati,
aut melliti dum inſolantur, & antidota
melle addito cum feruent.

Acopa item ex ſemine abietis, & flori- *lib. 4. ſa*
bus populi dum menſes plures maceran *nir. tuc*
do perficit Gal. etiā putrefacere videtur. *de.*

COctioni non modo affines sunt fri-
xio & assatio, sed frequenter etiam,
vt in alimentis, coctionis differentia: ta-
men quæ medicamentis adhibentur co-
quere raro videntur humiditatē crudam,
aut excrementosam, sed magis absumere.

Frixio autem ferè in sartagine fieri in-
telligitur, quæ à frigendo etiā frixorium
dicitur. Hæc autē in sartagine parata suæ
qualitatis vehementiā deponūt. Gal. lib.
2. alim. in dracontio. Assatio autē seu tor-
refactio super tegulam ignitam fit: vel in
clibano, vel in carbonibus ignitis. Hæc
quoniā tenui discrimine distant, & ambo
à calore fiunt, simul tractanda duximus.

Semen melanthij frigitur Galeno con-
tra catarrhos. semen agni frixum minus
tentat caput eidem lib. 2. alim.

Semen lini & nasturtij torrefiunt in e-
clegmate Phthisicorum, Mesuæ.

Mes. Semen porri & nasturtij in E. nostro.

Ibidē.

Cuminum pridie aceto maceratum sic
catur, & frigitur in vase fictili bene cocto
Gal. in diospolitico lib. 4. sanit. tuendæ.

Coriandrū aceto infusum assatur pas-
sim: sic enim calorem eius in superficie
vehementem extinguere volunt, vt tantum
refri-

refrigeret. Granatorum acini assantur in E.altero Mesuæ. & semina vuæ, portulacæ, psyllij, plantaginis, althææ, anisi, marubij, ad fluorem alui assantur. Gal.

Baccæ myrti, gallæ in quinque aut sex partes contractæ, oleo hora vna infusæ assantur ad capillum fluentem sistendum. Sit autem oleum astringens aut succus alius, si magis astringendum.

Myrobalani omnes succis astringentibus variis maceratæ, linteo siccatae assantur, sed antequam nigrescant, & vrantur eximendæ, ne vires amittant. Si insigniter, scilicet vrentur, vt cinefiant. Nam hæ & rha barbarum, assa coctis, vsta assis magis astringunt Mesuæ.

Balanus myrepica assando deponit partem humiditatis excrementosæ, & partem coquit. ob id assata dejectoria tantum est, non amplius vomitoria.

Auellanę assantur in eclegmate pineo.

Gummi Arabicum, tragacantha, succinum, & gummi alia ad magnitudinem orobi contracta, cum opus est assantur donec albescant.

Amylū assatur in trochiscis terræ sigillatæ, & trochiscis spodiatis secundis Mesuę.

Modus autem frigendi & assandi prædicta est huiusmodi. Sartago, vel aliud

vas ferreum vbi admodum calet, ac si opus est candet, ab igni tollitur: in hanc semina, fructus, radices & alia immittuntur, continēter rudicula ferrea versantur, ne vrantur. Sartago, si opus est, his exemptis recalefit, & quantū opus est assantur.

Quæ autem sunt magna, crassa, humida, glutinosa, diutius assanda, contraria minus, vt semen anisi, cymini, nasturtij: Semen verò lini & psyllij, quia humiditatem lentam satis multam sortitum est, paulò diutius assari sustinet.

Possunt quædam etiam in clibano, aut super eius testudinem, aut sub cineribus assari, & ea vel nuda, vel olla noua cōclusa, & si mediocria sunt integra: si magna, confRACTA, quædam etiam maza intacta clibano assantur.

Scilla per assationē multi fit vsus Dioscoridi, quia per eam vel elixationē, eius vehementia obtunditur Galeno. Quæ enim nō assata sumitur, interaneis maximè noxia est Mesuæ. Illa autem delecta, purgata farina, pinsita, aut (id sordidum videtur Galeno in Theriace) luto, & argilla circumdatur in digiti crassitiem, sub cinere calido, vel carbonibus, vel clibano assatur. Sunt qui in olla operculata in furnum demissa assant: sic enim celerius & clemen-

elemētius purgat. Sic elleborus albus, & scammonium in maza pista, vel cydonio præparatur Diosc. & Gal. vt ipsa & panis, & cydonium moderatius purgent. In vas calcfactum quoq; , & ab igni depositum opium mox immittunt: vbi est liquatum, eximunt priusquā siccetur, & friabile fiat.

Acaciā nostratē factitiā super prunas ignitas assat Bulcasis in Seruitore. Est quādo vt alimenta sic medicamēta ex humore frigūtur: nā castaneæ sine humore: fabæ, pisa, carnes, fungi, cū humore, vt oleo, butyro. Sic myrobalani, flauæ, cepulæ nigræ friguntur & fricātur in oleo violato, aut amygdalarū dulcium in tryphera Persica & in simplicib. Omnia probè trita frigūtur in omphacio, vel succo myrti, & aceto, & siccātur in stomachico electario quodam Mes. Omnia in vino odoro frigātur, deinde in succo cydoniorum in E. nostro Mes. Addit in sequenti, & feruefiant, vt intelligere possis, hæc frigēda super ignē semper mouendo, & confricando: non solūm fricanda, cum his humoribus, vt diximus prius in confricatione,

DE VSTIONE.

Vstio. assationi finitima, vt ratione maioris, & minoris tantū differant:

assata enim largius vrūtur, & infra modū vsta; tantū assantur. Vruntur plantarū partes ac animalium, & animalia tota, metallica item & terrea. Horum autē medicamentorum vrendorū scopi medicis sunt varij. Quædam enim vruntur vt puluerari facilius possint, vt pili, lana succida, sericum, testē ostreorum, buccinorum, purpurarum, vngues asini, cornua caprarum & ceruorum, ossa, coria, & alia quæ ob terrosam, & duram, & crassam corporis consistentiam & cōcretionem densatam, vel ob lentorem immodicum vel humiditatem aliquam puluerari nequeunt.

Alia vt essentia crassitiem deponāt, & tenuitatem, aliāsque facultates igneum colorē sequentes induāt. Id quod quamuis omnibus vstis accidat, non ob id tamen omnia vruntur. Sic metallica omnia & terrea vrendo tenuiora euadunt, & quæ acria erant, mitiora fiunt, quæ non acria erant, acrimoniam vrendo assumūt Gal. lib. 4. & 9. simp. in chalciti.

Ex quo patet vstione etiam facultates quasdam mitescere, vt ærugo, chalcitis, misy, fori, chalcāthum, melantheria fiunt moderatiora: quasdam acquiri, vt vim tenuandi & ea efficiendi, quæ saporem acrem sequuntur.

Alia

Alia vruntur, vt vis quædã nostro proposito aliena, ex profundo in superficiẽ trahatur, postea lotionẽ separetur: sic lapidẽ phrygium, vstum lauat Galenus, & lapidẽ hẽmatitẽ ad oculorũ affectus.

Alia vruntur, vt colorẽ nouum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum. sic ærugo vsta modicẽ quidẽ, rufa facit emplastra, immodicẽ verò, nigra.

Cerulã trita, rudicula ferrea mota vrendo fit rubra, vt ochra, & auripigmentum. Ossa & testæ vrendo primũ nigricant, deinde albissima euadunt.

Quædã vruntur, vt in aliam transeant speciem, vt vipera vsta trãsit in salem theriacum, cerulã vsta vt rubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulfur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem & spodium.

Vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana succida, sericũ, cornua, vngues, coria, hirũdines, motacilla, galerita, & aliæ quædam auiculæ, cicadæ, scorpiones, viperæ, lepores, & alia quædam pedestria. Hæc verò in olla noua operculo foraminulento tecta sunt vrenda carbonibus vel clibano, præsertim

quæ propè cinesacta dispetire possunt. Quæ verò post vstionem integra manēt, vt ossa, vngues, cornua, testæ ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam & similia: hæc etiam viuis carbonibus obruta vel superposita, aut etiā flammæ luculentæ immissa, vri possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorū mutant. Tunc enim etiam in olla noua vruntur. Sic viperas cum substratis quibusdā medicamentis Galenus vrebatur ad salem theriacum: sic fictili nouo inclusa vel patellæ ferreæ, aut sartagini imposita vruntur, cerusâ, chalcitis, misy, sori, calcâthū, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

Alia fictili crudo vrūtur, donec id percoctum sit, vt cadmia, æs.

Alia etiam olla ænea aut ferrea, vt plumbum.

Alia in patina vruntur, vt ærugo, chryfocolla, lithargyros.

Alia in olla ex cinerib. ossiū (crucibolum vocāt) in fornace aurifabrorū, alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum.

Quædam (vt dixi) tam carbonibus obruta quàm olla vel noua, vel cruda, vel patina excepta per se vruntur, nulla addita inflammabili, aut vires mutante materia,

ria, vt ossa, cornua, testæ ostreorum.

Alia materiam requirunt inflammabilem, vt sulfur, alumē aliquod, salem, hordeum, vt in plumbo vsto & aliis docuit Dioscor. Vas item quo excepta vruntur si fragile est, vt vitreum, ex terra bellouacā & alia lapidea & silicea luto chymistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccamus, quā igni committamus. Eodem luto vasi operculum sæpe agglutinamus, ne inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ.

Lutum autem id fit ex terra figulina aqua macerata cum stercore equino, & si vis pilis animalium multum diūque subacta, quod & lutū sapientiæ vocant chymistæ. Eius loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

Vas quoque chymistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt pretiosæ, & quas exhalare nolūt. Id autem in matulis tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque Hermetis vocant.

In aliis fictile apertū esse nihil nocet, si clibano vrēda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruēda, operculatur vas, ne
aliena

aliena materia quod vrendum est, vt dixi, conspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat, vt in tale & lapidibus quibusdam.

Operculum autem nūc solidum est, & integrum, nunc multis locis foratum, vt fuliginosi effluxus exhalent liberius, à quibus est cauendum, præsertim si à vipera, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur, item si à metallicis.

Vrantur materiæ carbonibus perustis, præsertim pretiosæ, & quæ oculis sunt adhibendæ, vt nihil fumidum habeant, vt Galenus vrebatur lapidem phrygium.

Carbones quoque foliis vel flabelis excitari interdum oportet, vt citius vstio absoluator, vt Galenus in vstione lapidis phrygij iubet. lib. 4. c. ph. p.

Quædam ad idoneam magis vstionē puluerentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis iuglandis, vt lithargyros: vel nucis auellânæ, vt lateres in oleo philosophorū, & lapis phrygius à Galeno in suo remedio oculari.

Alia etiam in sole æstiuo ex vino vel aceto pluribus diebus teruntur, priusquā vtantur, in c. ph. g.

Planta Quæ omnia his exemplis ex Dios. Gal.
ri par- Mesue, & aliis fient notiora, folia oliuæ
tes. syluestris in olla fictili cruda, lutata, fur-
 no

no figulino, per coctionem vasis vsta, lota, ex aqua in sole siccata, albuginem oculi & panos potentius omni pompholyge delent, Albucasi.

Sarmenta ligna, cortices & partes alię plantarum vruntur relicto tamen foramine in operculo, vt fumus exhalet.

Abrotani, asphodeli, ari, arisari, dracōtij vstiorum, cinis Gal. passim vsurpatur.

Brassica non transplantata, à terra expurgata, minutim concisa, in ollam coniecta, foraminulento operculo tecta clibano vratur in carbones, qui triti ollæ alteri impositi, operculati, vruntur donec in album cinerem abeant.

Myrobalani & rha barbarum vsta valentius astringunt quàm assata Mesuæ.

Aloë quibusdam in olla noua super prunas vratur in diamoscho amaro, vt absumpta glutinosa substantia aluum ducere desinat, & magis roboret, ob quam causam etiam abluitur.

Fæx viri siccata vratur igni, donec albescat, & linguam multum mordeat & vrat.

Succinum fictili olla clausum, opercularum nocte igni vratur Bulcasi.

Thus vstum scribitur in Iside cephalica, lib. 4. c. ph. g.

Vsto thure fuligo qua ratione colligenda

Animalia

*Et ipso
rū par-
tes.*

genda docet Diosc.

Lepus viuus iugulatus cum sanguine & pelle vasi fictili nouo traditur, operculatur, in clibano vratur donec puluerari possit ad calculum frangendum.

Sic hirundines, ranę, cicadę, erinaceus, vruntur Gal. lib. 11. simplic.

Æschion caneros viuos in patella æris rubri vsit donec in puluerem mollissimū redigi possent contra rabiem.

Gal. li.
11. sim-
pli.

Testę ostreorum, limacum, ouorū exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, vngulę, vel prunis ipsis vel tegulę aut ollę imposita in clibano. vel foco vrūtur, donec albescant, & puluerabilia sint. Hęc tamē non vrenda, nisi medicus iusserit, quia vires vsitione mutant. Possunt enim tenuissimē limari, aut radi, vt cornu rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, & puluerari, vel probē limata propinari. sericum similiter cardiacis miscendum sit crudū, minutim concisum, cum aliis pulueratū, vsitum autem medicamentis materias cōsumpturis miscetur, vt diasenne Nicolai. Spongia bitumine, vel eius penuria pice illita vratur. lib. 11. simpl.

Gal. li.
6. c. ph.

Lana succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur gypso, vel glutine: vel terra figulari subacta cū aqua illini

illinitur, vritur fornace, vel camino. Scorpiones viui olla noua inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita vruntur igni ex sarmentis vitium in clibano, vt eius pulueris grana sex cum syrupo radicum quinq; pota renum calculum frangant.

Sic vruntur viperæ & colubri, ambo- *Metallica*
rúmque cinis ex oleo illitus scrofulas li- *terra.*
quefacit. Lithargyros chrysitis, grauis, pu-
ra à plūbo, & omni aliena materia in par-
ticulas magnitudinis iuglandis confra-
cta, prunæ superponitur, & ita follibus ac-
cenditur, vt conflagret: vbi refrigit, abster-
gitur insidens spurcitia, & reconditur: alij
ter aceto aut vino restinguentes rursus
vrunnt, & reponunt.

Cadmia vritur carbonibus obruta, do- *Diose.*
nec translucida spectetur, & ferreæ sco-
riæ modo bullet, mox vino extinguitur
aminæo, si ad emplastra paratur: aceto
autem, si ad psoricum medicamentum.
Sunt qui sic vstum, ex vinoq; tritum, iterū
crudo fictili torrent, donec pumicosa vi-
deatur: iterūq; ex vino tritam vrunnt ter-
tio, donec prorsus in cinerem redigatur,
nihil scabritiei retinens.

Plumbi laminæ quàm tenuissimæ, aut *Ibid.*
plumbi lumatura & sulfur alternis vasis
imponuntur, donec plenum sit, opercula-
tur.

tur, sed relicto exili spiraculo succeditur, dum plumbum ardet, rude ferrea versabis donec tantum perfecte in pulverem redigatur. dum eximes, obstrue nares quod eius halitus sit noxius.

Ibid.

Stibium pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum torretur, donec ipsa crusta carboniculetur, exemptumque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vino, vel vritur carbonibus succensis, efflatum quo ad ardeat. Si enim paulò magis cremetur, fit plumbum.

Cerusa trita in fictili nouo, flagrantibus carbonibus assidue versando vritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis novis super prunas tritavritur, & feru lacea rude mouetur, donec coloris sit sandarachæ: sandyxq; tunc appellatur, refrigerata reponitur. sic trita chrysocola vritur. Sunt qui vrendo acetum affundunt, ut rubeat: si flava est, macicot vulgò dicitur.

Ibid.

Æs fit vstum ex clavis æreis solutarum nauium fictili crudo compositis super sparsa sulfure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & singulari creta circūlinitur, fornaci inditur donec fictile percoquatur. Modos vrendi alios docet Dios.

Ærugo fracta minutissime in fictili patina

tina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorem cinereū cōcipiat: refrigerata reponitur. Si cruda olla vratur, eundē prorsus colorē nō reddet.

Chalcitis fictili nouo viuus carbonibus superposito vritur, donec bullas excitare desierit, & perfectē inaruerit, si humidior est: sin alia est, dum mutata in floridū colorem sanguineum aut miniatum cōtraxerit. Eximēdo insidens spurcitia tergetur. Vel vritur perflatis carbonib⁹, donec luteo colore palleseat. Sic misy, fori, chalcanthum vruntur. Chalcanthum autem vrendo suapte natura colorem rubescen- tem sortitur. Dioscor. in ærugine.

Auripigmentum vritur testa noua viuus carbonibus subiectis assiduē versando, donec igni flagret & mutet colorem. fit enim foris argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum recōditur. Sic vritur sandaracha, alumen.

Lapidem phrygiū in particulas magnitudinis auellanæ fractum vres in olla recenti luto circūnlita, tēcta opesculo perforato vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, vt fuliginosi fumosiq̃ue eorum quæ vrūtur effluxus facilē per ea efferantur. deinde perustis carbonibus perflatis vre, donec ignitus

*Gale.
libr. 4.
c. ph. p.*

fit, cætera ex Galen. repete. Sic cyanus lapis vritur, & alij.

Dios.

Sal vritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusque prunis, donec effervescat vritur. Sic nitrum & spuma nitri, si inveniuntur vrenda sunt. Vitrum tritum interstrata pice vritur, & aqua frigidissima extinguitur, Auëzoar tamen friabile non fit. Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc transcribi potuissent, nisi hæc etiam multa huic ætati omnia hæc negligenti existimassem.

Vstionis terminus in quibusdam est, dum ignitum id abũde fuerit, vt in vstione triplici lapidis phrygij: in quibusdam dum nihil fumidum amplius expirat, nullaque fuligo præterea emergit.

In aliis dum bullas edere desinent. In his quæ fictili crudo vruntur, fictilis illius percoctio.

In his quæ farina pinsita circumlinuntur aut luto, crustæ vstio.

DE EXTINCTIONE.

EXTINGVNTVR vel vsta, vel solùm ignita quædam non modo, vt empyreuma ipsum dissipetur, sed etiam, vt in corpus vstione rarefactum vis quædã humoris aut frigoris penetret, vt ferrum cãdens

dens aqua pilosellæ, vel alia astringenti
extinctum euadit solidissimum.

Extinctio fit interdum ad purgationē,
vt plumbum liquatum succo mercurialis
calido sæpe extinctum, & tribulatum, itā
ni puritatem, & soliditatem assequitur.

Fit item extinctio, vt vires humoris quo
extinguitur in se trahat, sic cadmiam vino
amino ad emplastra, aceto ad remedia
pforica extinguit Diosc. sic Galenus lapi- *Lib. 7.*
dem phrygium extinguit primū buty- *simp.*
ro recenti, secundò vino falerno, vel alio
fuluo, odoro: tertio melle Attico, ne me-
dicamentum sit aridum, sed viscosi cuius-
dam particeps. Gallæ ad sanguinis sup-
pressionem carbonibus impositæ, donec
vndique candeant, aceto, aut vino auste-
ro extinguendæ sunt.

Stibium lacte mulieris marem enixæ
extinguitur.

Limatura chalybis sæpe ignita aceto
extinguitur, & pulueratur.

His exemplis medicamenta humore ex-
tincta ab illo aliquid virium in se trahūt.
Interdum autem ignita humore extin-
guimus, vt humoris naturam mutemus,
vt dum lapides vel circuli ferrei igniti la-
cte aliquoties extinguantur, vt serosam &
mordacem eius substantiam absumant,

sitque tunc lac dysentericis salubre.

Aqua chalybem vel aurū ignitum sæpe extinguimus, vt ipsa minus humectet, sed sit terrea magis absumpta tenuiori substantia.

Argentum viuum, etiam si non sit ignitum, tamen & salina hominis ieiuni, & succo saluæ, aut limonum extingui dicitur, quòd vis eius malefica, & omnia excedens, vt à Plinio rectè dicitur, cum his agitando mitescit.

DE SUFFITV.

SUFFITVS seu euaporatio vi caloris excitata sæpe medicamentis adhibetur præparandis & vrendis. Suffitus aromatum maliebria ducit, & vterum infernè retrahit si infernè adhibetur, vel sursum si naribus. suffitus plumarum perdicis, corij veteris, vel aliorum tetra odore præditorum, naribus exceptus vterum sursum ruentem deturbat. Suffitus radice & semine pœoniæ, melanthij, styracis, mastiches rosarum, ad capitis affectus pituitosos. Iisdem vel aliis stuppæ suffitu capiti circumponuntur.

Frõtalía ex rosis, violis, flore nymphææ semine, lactucæ, portulacæ, & similibus: vapore aquæ rosarum, verbenæ. bétonica,

nicæ, & similibus suffiuntur ad varios capitis affectus.

Et epithemata ventriculi ex bombace aromatibus farto, vapore stomachico præterea suffiuntur.

Suffitus per infundibulum ex radice, aut foliis bechij super tegulam ignitam impositis, ad tussim adhibetur.

Suffitus ex sulfure purgato, & auripigmento vsto & loto, probè à practicis quibusdam asthmaticis adhibetur.

Suffitu & vapore aceti acerrimi necantur cantharides Diosc.

DE PURGATIONE.

VStioni ordine optimo succedit lautio, quæ empyreuma, & acrimoniâ vstione acquisitam, vt & nativam tollat, & vsta expurget: sed cum illa sit purgationis species, satius mihi visum est de purgatione prius agere, quòd eius cognitio lucem magnam sit allatura lotioni. Purgatio medicamentorum hic accipienda passivè, non activè: seu quatenus purgantur, non quatenus humores sibi familiares ex corpore nostro trahunt.

Purgantur enim medicamentâ sordibus, & aliena quavis materia per despumationem, clarificationem, colationem,

residentiam, coctionem, lauationem, excisionem, depellationem, & modos alios post scribendos.

Radices erutę radiculis circuncisis, aliquoties abluuntur potius quàm abrađuntur: deinde si magnę sint & matrice intus lignosa, parū contractis lignū id eximes, deinde siccabis, & repones: sic radicem cichorij, apij, petroselini, sceniculi purgamm⁹, & eryngij, sisari, cari, dauci, pastinacę.

Est quando putre etiam aliquid excidendum est à radice iridis, enulę, bryoniae, sigilli beatę Marię, rha barbari.

Radicem ari, dracūtij, asphodeli, satis est excisis radiculis lauasse, cū cortice consent tenuissimo, vti & radix chelidonij parui, cotyledonis, satyrij.

Scilla cultello ex cypresso quibusdam desquamatur, in qua mirum est ferrum vitari, cū pistillo ferreo teratur ad succū extrahendum.

Herbæ raro purgandę nisi aridis foliis, aut stipite lignoso, quanquam & ablui debeant, si terreno aut luto sordidę sint, vt iussit Dioscorides.

Seminibus sæpe duplex, interdū triplex debetur purgatio. Vt legumina siliquis, cerealia glumis, baccę halicacaborum vesicis, semina fructuum carne, semen
rici

ricinā, viticæ maris, castanea echino, semen papaueris, hyoscyami, lathyridis, paliuri calice, & alia ad portionem. Quæ omnia iterum cortice tenui & interiore sepe purgâtur, vt pòst audies. Nux iuglās, & auellana, & amygdala carne viridi, deinde cortice duro, postremò pellicula, & alia plurima similiter. Hic autem de tertia purgatione agendum, quòd aliæ à vulgo fiant, & purgata hæc vendere consueverint, & zeam, oryzam per moletrinas gluma purgant, & vendunt.

Cortice ergo seu pelle purgantur semina cnici, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli, citri, vt solæ supersint medullæ, idque multis modis. Quidam enim hæc insolant, deinde cortices in mortario leuiter frangunt, manibus fricant, donec à medulla cortex separetur. Cribro tunc idoneo medullas transmittente, & cortices retinente cernunt. Alij etiam solis loco, igni leuiter frigunt: sed medullæ sic extractæ graue olent, & sunt ingratae sumentis, vt calfactum oleum. Forficulis alij singula semina purgant, quod operosum est, vt vnguibus & dētibus quod impurius est, qui mod⁹ hodie est cōsuetior. Sunt qui hæc sole siccata in magna quātitate friant pistillo ligneo, cribro raro cer-

nunt, iterum terunt & cernūt: si corticum particulae simul transeunt, vāno euolant. Semen sesami purum aqua modicè salsa irrigatur, manibus confricatur, iterum irrigatur, donec madesiat: extensum linteolo siccat, modicè assatur, sacculo aspero immittitur, fricatur multum donec depelletur, cortices vento aut halitu expurgantur, vel in aquam frigidam iniectis cortices supernatantes deraduntur. Sic semina cucumeris, cucurbitae, melonis, citreoli, ad olea ex his facienda excorticantur Mesuæ, non autem ad vsus alios.

Amygdalæ, pistacia, strobili, nuces, & similia aqua frigida per noctem, vel tepida parum diu macerata corticem mox remittunt. Item si in sartagine assentur igni donec depellentur, sed hoc modo malè olent, & oleagina magis euadunt. Sunt qui recentes hos nucleos palea frumenti obruunt, sicq; cadit cortex: alij cultello malunt depellare: præsertim cum oleum amygdalinum recens exprimendum est in potum colicorum, aut nephriticorum. Alij etiam non depellaras terunt, & exprimunt oleum purum, & iucundum.

Hordeum, triticum & cerealia alia, & legumina depellari possunt, affusa identidem aqua calida: pistillo ligneo batuntur,

tur, siccantur, parum nisi æstas est ventitantur, persiccantur, reponantur.

Est tamen quando corticis vsus est maior, vt in pisib; & fabis, & aliis. Est quando solus expetitur, vt in rhoë, radice apij, fœniculi, ellebori, turbith, cinamomi, & aliis corticibus dictis lib. i. methodi medicamenta componēdi. Ricini semen echino insolato, vel frixo per se, aut confrictu facilè exilit: depellatur autem quomodo dictum est terendo, sed mitius ne ob multam humiditatem cohæreant: sic baccae lauri. Vel ex non excorticatis, sed pertrititis oleum extrahatur.

Colocynthis cortice & semine purgatur, solâq; pulpa in vsu est medicorum.

Cydonia & fructus alij condiendi intus & foris purgantur.

Cassia corticibus & membranis ligneis exempta seminibus purgatur per cribrum setaceum rudicula, vel cochleari, vel manu: sunt qui efficiunt foelicius cum vapore ex decocto aliquo medicato subeunte. Interdum humore aliquo soluitur, vt in diamanna Mesuæ. Sic thamar indos purgamus, sed hi ferè humorem postulant, vt per cribrum transmitti possint, vt manna humore calente soluta in cribro folia ilicis, cui foelicius insidet, & sordes alias dimittit.

Dactyli cultello intus & foris purgantur, vt abundè diximus libro tertio methodi medicamenta componendi.

Succi purgantur feruore, residendo, clarificando, colando, vt in syrupis dicemus, & in clarificatione & colatione diximus.

Gummi Arabicum, tragacanthū, & similia trita negligēter si sunt sicca, in vase vitreo aqua pura vel rosata merge nocte vna, misce manu postridie donec lique scat, cribro puro cola, etiam manibus deducendo: vttere, vel siccatum repone.

Galbanum etiam laudatissimum retinet aliquid adiecti seminis, & ferulæ: id ante vsum sic purgabis. In aquam feruentem dimitte: cum liquatum fuerit, linteo puro, raro cola, aut sordes supernatantes concha detrahe.

Sic liquores alij humore idoneo soluti colando purgantur à feminibus stipitum fragmentis, & cæteris excrementis, quæ per negligētiā, aut institorum malitiam ipsis accreuerunt.

Adipes, cerebella, sanguis, & aliæ animalium partes medicamentosæ, qua ratione purgandæ sint, paulò post audies inter ea, quæ pluribus præparationum differentiis simul à nobis parantur.

DE LAVATIONE.

Lavatio purgationis, vt dixi, species ferè fit ad sordium aliquarum separationem: abusiue tamen etiam imbuere, medicato humore medicamenta aliqua lauare Mesues, & alij vocant. Lotionis vires ex Mesue repete. Lauantur aqua foris radices, herbæ, fructus, semina, si luto, puluere, vel re alia sunt contaminata: aqua ex ea toties mutata, donec pura maneat, & sordes omnis ab his deterfa erit, etiã si sint rosæ, violæ, intybus, & aliud cichorij genus, & adianta: postea autem siccantur pannis, vento, sole, igni, sed mitissimo, ne medicamenti vim dissipet. Hęc autem lotionis differentia omnibus consuetissima, quia paruarũ est virium, si alteri mox dicendæ conferas, pluribus ob id declaranda non est. Lotio alia intus & simul foris fit, seu per totam rei lauandæ substantiam.

Lauantur tota seu intus & foris plurima propter causas quatuor à Mesue lib. i. scriptas, & alias quasdam hic scribendas, & paucis perstrictas lib. 3. methodi medicamenta componendi.

Vt autẽ humor omnem lauãdi corporis partem quãrumvis exiguam attingat, & lauet ac purget aliqua substantia nostro

stro proposito aliena, si id est durum, aut lapidosum, ante lotionem est tenuissimè puluerandum: si est citò liquabile, calfaciendum: si per se est liquidum, quale est lauabitur: ac etiam si per se in aqua, aut humore alio promptè dissiliat ac dissoluatur, vt bolus armenia, calx.

Quæ igitur promptè liquantur, vt oleum, cera, pix, resina, modicè calefiant, & mox infundantur in vas magnum oris latius, semiplenum aqua purissima, experte omnis odoris, coloris, saporis, quem sensus percipere possit, quæ ex sole vel igne repeat. Tunc manibus multum diuq; agitentur, ab agitâdo deinde quiescat, donec id pingue totum quod lauas superna tet. Id quod talibus promptum est ob innatam leuitatem, præterquam oleo nimium multa agitatione valentius confuso cum aqua, vt mox dicam. Tandem aqua illa abiecta, similis affundatur, idque tertio & quarto, ac toties repetatur donec medicamentum in aqua illa deposuerit omnem illam vel substantiam, vel qualitatem nostro proposito multum alienam, seu quoad aqua nullam ex loto medicamêto talem substantiam vel qualitatem, vt colorem, odorem, saporem amplius recipiat, quam visu, olfactu, gustatu deprehendas.

Effun

Effunditur autem aqua per foramen aliquod subiectum, quod interim dum lauas luto obturaueris, aut vase inclinato pingue in vas aliud effunditur, & aqua abiicitur. Alij aquam pingui miscent in vase vtrunque habente foramen angustum, operculandum digitis inter agitandum, dum verò per horam resederit, aqua effunditur, noua infunditur: idq; fit toties, donec acri, & flaua olei humiditate deterfa, oleum dulcius, & album euadat.

Oleum tamen lauando minus est verberandum, ne adeò aquae misceatur, ut post ægrè possit separari: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper permiseris, ipsum totum innatans detrahare possis. Lotum id oleum componendis oleis, & medicamentis aliis albis, aut frigidis est optimum & vsurpandum.

Dura autem & lapidosa, ut metallica, lapides, ossa, testæ, succi siccati, lachrymæ siccatæ, antè leuissimè sunt terenda, deinde aqua pura subinde mutanda, manibus vel rudicula agitetur, quoad nihil sordium medicamenti aquae innatet, maneantq; aqua medicamenti qualitaturn, ut coloris, odoris, saporis omnino expers. Non antè verò aqua est effundenda, quàm lauandum corpus quiescendo in fundum vasis subsede

federit: quod metallicis, & terreis corporibus ob insitam grauitatem facillè accidit, vt prædictis innatare, ob naturalem ipsorum leuitatem. Effunditur autè aqua per os vasis paulatim inclinati, ne motus vehemens corpus lotum aquæ iterum cõmisceat, & cum ea effundatur: satius enim est aquæ prioris aliquid remanere quàm lauandum corpus effundi.

In his autem vas in fundo pertusum, in liquabilibus prædictis vtile, damnatur, quòd ad id graua hæc repant, quæ si per foramen id vacuare tentes, aut ipsum obstruent, aut aqua penetrare habilior cum ipsis vacuabitur. Possis & per licia panna, philtia vocant, distillando aquam paulatim vacuare, præsertim dum corpus lauandum est preciosius. Nam sic nihil, aut minimum eius cum aqua vacuatur, sed illa vacuatur purior, & corporis lauandi substantiæ expers magis.

Sic lauatur plumbum, cerusa, lithargyros, scoria plumbi, æs, ærugo, chalcitis, & congeneria, cadmia, spodiũ, pompholyx, stibiũ, cyanus, calx, & metallica cætera, ac lapidosa, ossa, os sepiæ, cornu cerui, capræ, vngula capræ, testæ ostreorum, & similia.

Cum verò dura illa teri antè mollissimè debeant quàm lauentur, teri autem non possunt

possint citra vstionem, antè, vt prius est dictum, sunt vrenda: quanquam horum multa citra vstionem teri possunt, vt cadmia præsertim lapidosa, chalcitis, chalcanthum, cerusa, pompholyx.

Adde quòd liquabilia promptè, & dura, & horum media, si humore medicamentofo lauantur, etiam per noctem in illo resideât, vt plus virium eius in se trahant: interdiu enim lauanda sunt, ac potissimum in sole feruidissimo: præsertim si qua sicciora, tenuiora, albiora volumus. Lauantur enim non aqua fontana, & pura solùm, sed marina, sulfurosa, bituminosa, vino, aceto, lacte, muccagine, succis plantarum, decoctis aromaticum, vel aliorum medicamentorum etiam purgantium, vt ex Mesuæ simplicibus patet: omni deniq; humore, sed quem doctior medicus iusserit, ne sibi hanc deligendi humoris potestatem pharmacopœus arroget. Est enim quando calida humore aliquo calidiore vult intendere: vel remittere frigidiore: est quando vires alias mutare instituit.

Quæ verò est in colore solo medicamenti mutatio, esse possit in pharmacopœi arbitrio, modò vires nihil mutet. Vt si medicus impauit, hoc vino aliquo austero abluendû, pharmacopœus autè velit albius,
& ele

& elegantius reddere medicamentum, la-
uare id potest vino aliquo albissimo, mo-
dò id sit, vt iubet medicus, austerum. Odo-
rem similiter diligere illi non permitto,
quòd ea cui odor inest substantia, maio-
rum est virium: ad hæc quòd odor addi-
tus, vel huic hominum proprietati, vel ce-
rebri, cordis, vteri affectibus curandis nõ
conuenit. Multò minus saporem medica-
mento hunc vel illum, vel qualitates alias
infignes per humorem à se delectum ad
lauandum, dederit pharmacopœus.

Gal. in Metallica itaq; curiosè læuigata, lauan-
fine lib. tur ex aceto, vel marina, si vlcera sunt tu-
p. c. ph. mida, cum oris crassis, & callofis, attenua-
g. tionem multam requirentibus: aqua au-
tẽ, si humores in vlcus affluẽtes sint acres
& mordaces: vino, si humor vlceri largior
affluit. Ex his humoribus per plures dies
tribulentur metallica, donec erunt pura,
candida, perspicua.

Quæ ex metallis ad punctos neruos,
aut aliter vulneratos, partibus nernosis
adhibentur, omnia esse elota oportet, si
modò citra inorsum sint siccatura. Cera
quoq; & terebinthina, si his medicamen-
tis miscenda est, sit elota, & multò magis
reliquæ resinæ, si immittendæ sunt. Nam
medicamentis omnibus quæ laueris, acris
&

& mordens sanies eluitur & abstergitur.

Hæc in vniuersum de durorū, & mollium, & mediorum lotionē sufficiant: nunc particulatim de quibusdam agendum, primum plantarum partibus reliquis, deinde metallicis.

Aloë optima, trita creta, ex aqua fontana purissima dupla aut circiter, agitur aliquandiu rudicula ferrea aut lignea in vase lato stanneo, vel terreo, vel alio. tecta sinatur horæ quarta parte, aut paulò diutius subsidere: tunc quod clarius supernatat, inclinato vase in aliud simile, sed minus, per colum setaceum transuaseretur: aut si puriorem, sed parciolem vis aloën lotā, licio aut filtro exoletur, aut diutius residere permittatur in vase præsertim vitreo, internallis paruis foramina habente, spina, aut cera obturata, per quæ quantum videris clarum sine effluat, ne scilicet inclinato vase turbari queat: aquam nouam affunde, subige, sine clutria: id fac quater, quinquies, donec arenosa, & terrea tantum fex supersit. Primā omnium præstantissimam per se insolata sicca, alias omnes simul. Si autem hyems est, aut lota aloë in rem præsentē egetur, igni lento siccaripotest. Dum autē siccata iam aloë est ex vase ipso eximenda: ca-

lesiat vas parum, vt promptius ab eo aloë
separetur, & imam eius partem, in quam
quod crassius est subsedit, cultello dera-
de, vt in panibus cereis fieri solet.

Quod si nondum pura & perlucens sa-
tis appareat, iterum teratur, & lauetur vt
prius, idq; si libet, tertio, quarto, fieri po-
test, si medicus iusserit. Nam toties lota
Gal. li. 7. met. aloë acrimoniam & vim purgatricē pro-
pe totā amittit & caloricā, licet in ea
portio aloës tenuior cōtineatur, quæ his
qualitatibus exuta roborat magis, soluit
minus. Hæc eius lotio magni æstimanda
est, qualis dum fecē vini vstam, & calcem
vinā lauas, dum subsedit, aqua hæc effu-
sa siccat in cauteriū omnium præstan-
tissimum. Quæ lauandi ratio planē est ab
aliis diuersa, in quibus aqua ipsa abiici-
tur: in hac lotionē sola seruat. Aloën
verò si laues, ter, quater, & dum resederit
aquam abieceris, quod relinquetur ama-
ritudinem quidē exuerit post aliquot lo-
tiones, sed impurā & sæculenta tantū a-
loës pars fuerit. Si autem aloën leuissimē
pulueratam, & cretam aqua pluuiā, tan-
quam magis aloën permeante ob tenui-
tatem, vel intybi, vel rosarū, vel alia sim-
plici, aut composita imbuas, deinde inso-
latu aut igni siccēs: idem secundo, tertio
repetas

repetas, lotio nō est nisi abusiue loquentibus: sed verius, vt sic dicam, imbutio. In quo genere præparationis est, quæ à Me- sue in simplicibus scribitur aloës maceratio ex decocto aromatum, vel specierum hieræ picræ Galeni: lotio enim non est, vt nec quæ Albucasi in Seruitore multiplex describitur, quia nullam ipsi aloë aufert aut substantiam, aut qualitatem, sed suas illi facultates impertit. Fuerit igitur verius infusio, maceratio, & (vt sic dicā) imbutio. Quæ quibus & quādo facienda sit, medici solius est instituire. Ob id hoc loco de his agendum fufius non putauī.

Nec sarcocollæ, aut cancamī est lotio, dum ea trita, lacte asinæ, vel capræ, vel potius mulieris recēssimo humectatur, non autem mergitur, ne lac ante acēscat quān sicceretur, deinde insolatu mox ficcatur, idem opus quinquies repetitur: sed infusio, aut nutritio magis fuerit.

Nec cardamomī aut camini in aceto maceratio recte cū Bulcasi, & aliis lotio vocetur, nisi, vt dixi, abusiue loqui se fateatur. Sed hæc de nominibus nō de re disceptatio finienda est, ad remque propositā nobis redeundum. Cancamum tritum aqua fontis, cui a: istolochia, & schœnanthum aqua incocta fuerint, lauat pistillo sem-

per agitando Pandectarius, quoad aqua clarescat, quod resedit coletur, & siccetur. Tenuius sic euadit, & magis aperit.

Acacia vera Galeno lauatur ad tollendam ipsius acrimoniã: nobis prætereunda, quia desideratur, & eius loco succus prunorum agrestium, acrimoniæ expers substituitur, qui lauatur tamen aliorum succorum modo, ex aqua dulci, aut lacte, vt sit anodyna magis. Nã valenter astringentia exasperant non leniunt, vt in remediis ophthalmiæ docet Gal. lib. c. ph. p.

Tragacanthum tritum aqua pura aut rosata macerât nocte vna: postridie mucaginem colant, & nisi mox vtenda sit, siccât ac reponunt pro loraque vsurpant practici quidam.

Gaius Lithargyros, chrysis, aut eius deside-
lio lib. rio argyritis, aut alia, multis modis ab-
4. c. ph. luendo albatur Diosc. lib. 5. Potest autem
g. lauari, vt metallica cætera trita creta, ex aqua pura aliquoties mutata: tribuletur, resideat, aqua paulatim effusa noua indatur, vt antè dixi.

Cadmia lapidosa, vt siccet magis Galeno lauatur per æstatem in sole pluribus diebus terêdo in aceto acti, aut vino planè fuluo, & substantia perlucido quale in Gallia, Aurelianense & Belnense, quod multò

multò maximè ficcare natum est, deinde
 ficcatur & reponitur, ac vlceribus mali-
 gnis inspergitur. Cadmia autem Diosc. *Lib. 9.*
 in mortario trita lauatur, effusa subinde *ad Al-*
 aqua dum sordes nulla emergat: deinde *manso-*
 coacta in pastillos reponitur. Sunt qui la- *rem.*
 uant, vt pompholygem. Scoria ferri trita *Diosc.*
 diebus octo maceratur aceto, quotidie
 mutando, die nono imponitur lamina i-
 gnita, vt torrefiat. Sic præparata valet
 compositioni Rasis ad omnem sangui-
 nis fluorem immodicum.

Plumbū post vstionem lauatur modo
 omnibus duris cōmuni, vel etiā hoc mo-
 do. Aquā paucam in mortario plumbeo
 agita pistillo plūbeo, donec nigrescat &
 crassescat, tunc per linum aquam cola ter-
 quater, sine subsidere: laua subsidentiam
 aqua pura donec ea amplius nō nigretur.

Vel plumbi limaturam cum aqua cre-
 bra tere in mortario, donec aqua sæpe
 mutata nigrari desinat.

Pompholyx linteolo modicè raro liga-
 ta in vase aqua pluuiæ vel fontana pleno
 huc illuc ducitur & tribulatur, vt pars eius
 utilis & tenuior in aquā effluat, & omne
 excrementum in linteo remaneat: reside-
 re finas, & effundas, noua deinde aqua
 affusa idem opus repete, idque donec in

lineteolo nihil vtile maneat. Modos eius abluendæ alios lege in Dioscoride.

Sic spodium lauatur, excrementosum tamen magis est: Sic interdum & cadmia lapidosa. Nam fornacaria (quæ vulgo tuthia & male pompholyx dicitur) modo aliorum metallicorum lauanda est, & scoria plûbi in mortario lauatur aqua pura toties mutata, dum à scoria luteo colore amplius non inficitur, digeritur in pastillos Diosc. Stibiû, cerusa, res vltum eidem lauantur, vt cadmia, vel plumbi scoria.

Abluitur lapis cyanus, vt Armenius Alexandro Tralliano, in aqua cõmuni trigies, vel qua dragies mutata: deinde aqua buglossi, vel rosarû decies lauatur, vt in antidoto cocci baphicæ, & in catapotiiis ex his lapidibus.

Gal. li. Calx aqua marina bis terve lota per
6. met. æstatem sub æstu caniculæ, puncto neruo
Dios. medicamentum est vtile, cum oleo.

Chrysocollâ tusam infusa aqua mortario, expansa manu eidẽ vehemẽter affrica, & vbi cõsederit cola, altera quoq; affusa aqua rursus tere. Hæc vicissim prosequere, donec pura sincerâque spectetur, deinde siccatam in sole, ad vsus reconde.

Terram Lempiam sic lauabat Dianæ sacerdos in Ephesiade Lēnij vrbe. Hanc
 aqua

aqua macerabat, & in lutum redactâ valenter conturbabat, deinde paulum quiescere sinebat, tunc aquam supernatantem aufererat, & mox quod sub ea erat lutum, tollebat relinquens tanquam inutile lapidosum & arenosum illud, quod in imum subsederat, lutum illud pingue siccabat, dum mollis ceræ consistentiam acquirebat, tunc in paruas huius portiones sacrum Dianæ sigillum imprimebat Gal. lib. 9. simpl. & paulò post. Terra autem omnis lauatur eodem modo: primum enim maceratur aqua nullam qualitatem medicamentoſam habente. Vbi lutum confedit, effunditur quæ innatat aqua, quod lutosum est separatur à lapidosis & arenosis, quæ ad imum resederunt. Gustatus autem tibi index est accuratus, quam oporteat terram lauare, & quam non.

Quædam enim non solum terra, sed alia quoque corpora lauari non postulant: quædam semel, vt terra Lemnia, quædam bis, vt quædam terra Eretriensis. Bolum Armeniam similiter lauabis. Sunt tamen qui aqua rosarum ter lauant, totiesque siccant. Potest sine lotione usurpari, cum nullam qualitatem manifestam præ se ferat: sed facultate occulta valeat, & vi siccatrice.

DE PLVRIBVS SIMVL PRÆ-
parationum differentiis.

Q Vanquam in prædictorū plurima, multæ simul præparationum differentię cadunt, tamen visum est seorsum de his quę multis præparationum modis egēt. Lapis, quo vitra dicta lapidea fiunt, concretus ex cineribus herbæ (quam vulgus sodam vocat) in fossa terrea vstæ, tritus, cribratus, aqua tanta mergatur, vt digitis duobus aut tribus superet, misce, permitte fæces residere, clarā partem per filtrum, vel liciū destilla: quod clarum est clibano, vel igni sicca. Salem coagulātū, alkali Arabibus dictum, albissimum, inuenies multis medicamentis vtilēm.

Eryngium intus & foris purgatur, in frustra secatur, caryophyllis, & cinnamomo farcitur, percoquitur. Sic enim saryrj radix quibusdam.

Amylū ex tritico delecto, crassius confacto, nocte vna macerato aqua pura, quod postridie exprimes: cūque amyलū subsederit, inclinato vase aquā clemēter effunde, sicca cito, igni, vento, sole, gossā pio, præsertim hyeme, ne acescat: siccātū repone vase mundo operculato. Paulò diuersius hodie fit, sed nulla virium differentia. Ex hordeo, oryza, & aliis similiter fieri

fieri potest. Agaricus tritus cum vino, cui zingiber infusum sit, in trochiscos fingitur, siccatur, reponitur, vtendi tempore teritur, aliis miscetur. Sic colocynthis, scilla in trochiscos formata mitescunt.

Myrobalani multiplicem habent preparationem Mesue in simpli. & in E. alharil. liquores, ammoniacum, galbanum, sagapenum, opopanax, & liquores alij ac gummi aceto, vino, vel alio humore, quem medicus iusserit nocte vna macerantur, dissoluuntur, cribro setaceo percolantur, vt semina, & ligna, & excrementa eorum alia colo remaneant, percoquuntur ad humoris illius consumptionem: aliis extra ignem miscentur.

Gossapium, bombacem & cotonem vocant, vino cui incocta sint aromata cephalica, aut stomachica, vel parti alij familiaria per noctem maceratur, siccatur, carpitur, applicatur loco p[an]i quisquiliati, vel eius tomenti, quod haec ad infectionem aliena quaedam recipiant.

Sunt qui haec epithemata similibus quoque medicamentis farta, & vtrinque recta densius interurunt.

Cerebella passerum vere occisorum lauantur, purgantur. Ex his decem cum vitello oui subacta, parum igni friguntur,

deinde sole vel igne siccantur, adiecto si libet paucò melle ad venerem incitandam parantur: alij vt adipēs, & medullas parant. Pulmo vulpis lauatur à sanguine, clibano siccatur, reponitur, teritur, cum aliis miscetur vtendi tempore.

Tunica interior gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, ter lauatur, deinde vino ter maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & siccatur clibano ex quo panis extractus est. Viribus tamē nullis valet Galenò in simp. lib. ii.

Hepar lupi ad hepatis affectus quosdam vino albo optimo lauatur, inspergitur puluere tenuissimo santali flauī, siccatur, absinthio in scutella inuoluitur, octauo quoque die mutatur, absinthium reponitur loco sicco.

Intestinum lupi ad colicam efficacissimū vino albo optimo lauatur, inflatur, siccatur, extra fumum & puluerem, absinthio inuoluitur.

Obserua hic & mox in coagulo inuolutionem, & in Mesue simpl. & compositis saepe præparationis quandam speciem: quam sciens omitto, quia rarior est aliis.

Cutis pedum & rostrorū bouis & ouis igni lēto diu coquūtur, donec veluti coagulum remittat. Id exemptū siccaturūque

in

in aëre perflatili, ad hernias cōmendatur.

Coagulum ex recens occiso animali, tennello, sale inuoluatur, in soleatur, seruetur.

Hircus quadrimus, sanus, bene habitus canicularibus diebus saxifragia, apio, petroselino, foeniculo, pulegio, hedera, schenantho, genista, adiantis, lupulis, & ceteris calculum frangentibus nutritus, vino optimo & tenui potatus, in sole dies 40. versatus, donec vrina nigrescat: tunc decolletur, & sanguis non primus nec postremus, sed medius excipiat in olla pura, aut patina. foliis prædictis instrata: dum cōcreuerit, incidatur per latum in partes duas. Siccetur sole vel luna tectus reti aut panno raro, vitetur ros & pluuia.

Adipes recentes aqua pura aliquoties loti in vase semipieno, liquantur sole vel aqua calida in vase duplici, tepore, aut cineribus: & quod liquatū erit, sensim effundatur in vas aliud. Vel igni liquetur & colo tenuissimo trās fusi seruentur. Sic adipes liquatos colādo à membranis & aliis purgat Gal. in emplastro diachalciteos.

Dios.

Cātharides vere forficulis præhensas, & immissas phiale oleo obrue, & in sola, donec putrescant: vel vase fictili non picato cōde linteo raro, vasis os subliga, eoque deorsum verso excipe halitum aceti quā

Dios.

quā

quàm acerrimi feruentis, donec æstu exanimentur, postea lino trāsfixę reponūtur.

Transfixio hic & in scilla, in radicibus eligatis seruandis, etiam est præparatio nis species: sed cuiq; perspicua, & sæpe ad siccationem & repositionem necessaria.

Carnes erici, leonis & aliorum quorundam animalium seruandę in vsus medicos, ante quater, quinquies, semper tamen per horam lauandę vino calido dulci, in furno leuiter siccataę seruantur.

Caro cancrorum ad antidota analeptica secreta, ter lixiuio, vel aqua salsa lauitur, donec odor teter abierit. ex aqua hordei, aut sero butyri coquantur.

Ceram in aqua liquabis, extrahes autē impositis ipsi phialis vitreis aqua prius tinctis, quibus quantum adhærebit forma scintillę, in sola Iulio mense, do-

nec albescat. Vel ceram ex

aqua dum nigrum mu-

tanda, coque do-

nec sit al-

ba.

Hæc de medicamentorum præparationibus sufficiant.



DE MODO MI- SCENDI AD COM- POSITIONEM MEDICA- MENTA, LIBER TERTIVS.

* * *



VM finis omnibus iis, quæ ipsum præcedunt, & ipsius gratia fiunt, sit præstantior, hunc librum tertium medicis & pharmacopœis non vtiliorem modò: sed etiam magis quam prædictos duos necessarium facile iudicaueris. Cum neque medicamenta huic affectui idonea delegisse magni sit momenti (nisi affectus ipse simplex simplici remedio curabilis est: aut si compositus simplici quidem nobis, sed natura composito) neque hæc præparasse, nisi compositio succedat, quam illa duo spectabant, & in quam deligebantur, & præparabantur medicamenta.

De modo igitur seu industria, & arte medicamenta componendi, & miscendi sumus dicturi: non tamen omnia, sed ea præcipuè quæ Parisiis, aut vso, aut paratu

rata sunt frequentiora. Quæ verò vrbes
alia alia in vſu composita habent medi-
camenta, ex horum imitatione paruo
negotio ſubſtituent. Porro in his omni-
bus Meſuæ ordinem ſumus ſequuturi, vt
ſcilicet doceamus primum, quo modo
condita ſint componenda, deinde ſapæ,
iulepi, ſyrupi: tertio loco eclegmata:
quarto decocta, & infuſa ſi qua hodie
vſurpantur: quinto antidota, ſexto pilulæ:
ſeptimo trochiſci, octauo pulueres: nono
olea: decimo vnguenta, vndecimo cera-
ta, duodecimo emplaſtra. His tamen paſ-
ſim, ſed locis ſuis ex Nicolao, & aliis ſi-
milis, ſed vſitatoria nobis, aſcribemus.
Quæ verò vrbes alia vſurpant, ſi libet a-
ſcribāt, vt Lugdunenſes conſeruam mē-
thæ, athanaſiæ vulgaris, euphragiæ, ſco-
lopēdrij, oxalidis, Ircos, ſtœchados, hyſſo-
pi, ſaluiæ, ſaluiæ vitæ, myrobalanorum,
limonum, primulæ veris, ſigilli beatæ Ma-
riæ, ſummitatum atanti, cucurbitæ, cu-
curbitam conditam, ſyrupum lupulorum
calaminthes, violatū decoctione cucur-
bitæ, electarium de bolo contra peſtē, E.
Indum majus. E. roſatum Meſuæ, loco E.
de ſucco roſarum. E. lenitiuum quoddam
E. de pſyllio, E. lætitiæ Gale. E. lærificans
Conciliatoris, Aurēam alexādrinam, cō-
fectio

fectionem anacardinam, hieram Ruffini, Logadij, Hermetis apud Mesuen, Micle-
tam, requiem magnam Nicolai, rubiam
trochiscatam eiusdem, trypheram persicā
in febribus continuis usurpatissimam, &
sarracenicam, philonium Persicum, & Ro-
manū, & alia permulta vrbibus aliis con-
suerat ascribant alij si volent.

DE CONDITIS

Sectio prima.



RYNGII radix condienda, sit
ampla, alba, tenera, intus ligno
& foris cortice purgata, deinde se-
cta in frusta pollicis aequantia, in-
tus, vnde lignum expurgasti, sar-
ta vno carzophyllo humectato, & particula Zin-
giberis humectata. Hac sic preparata coquitur
in saccharo equali & melle duplo, vel melle solo
triplo. Coctis additur iustum pondus aromaticum.
Quoniam radices hę quantumuis tene-
rę etiam subdurę apparēt, & coctione in
saccharo & melle durefcunt, non tenere-
fcunt, satius fuerit purgatas, & sectas, aqua
eas tegente super cineres calidos nocte
macerare, postmodum semel feruefacere, &
ex aqua illa, si pura appareret, sin minus,
alia dulci saccharum ad electarij solidi,
aut penidiorum consistentiā coquere, illi

rum

tum radices has sic emollitas parumper incoquere, caryophyllorū vel cinnamomi, & zingiberis succorum mediocriter pulueratorum ana vnc. dimidiam in cōditi libr. duas, vel miscere, vel nodulo suspendere sine aliis aromatibus. Similiter condies radices sisari, cari, dauci, pastinacæ, apij, raphani, & similibum prius scilicet lotas, & intus ac foris purgatas eliginando, deradendo, decorticando, sectas, fartas, melli, aut saccharo incoctas. Acorus autem nostrās non est condiendus, nisi medicus aliquis doctus iusserit, vt in Mesue docui. Alij bene purgatas radices, in melle despumato, & saccharo clarificato mediocriter coctis, igni lento percoquūt, ex aqua tamen non præcoquentes, ne aromaticam vim auferant: radicem tamē helenij præcoque, vt amaritudinem deponat: rari, dracontij allij, cæpæ, porri, & similibum, vt acrimoniam: deinde vt prædictas cum melle, & saccharo percoque.

Diasatyrium alterum accipit libram vnā radicū eryngij coctarum in aqua cicerum secunda, radicū satyrj plenarum & recentium vnc. octo, radicū raphani domesticī vnc. tres, radicū dracontij vnc. duas, quæ omnes simul trita, in lactis vaccini quantitate sufficienti, & butyri

butyri vaccini, olei sesamini ana vnc. quatuor,
 igni lento coquantur ad instam crassitiem, tunc *Tres
 adde mellis despumati libras* sex, succi capæ re- tantū
 centis libram vnam & dimidiam, vbi omnia hodie.
 erunt perfectè cocta, & ab igni deposita, adde
 hunc puluerem, scinci caudatum & lumberum
 drachmas octo, seminis eruce, nasturtij, passi-
 nace, napi, asparagi, fraxini, piperis longi, been
 vtriusq;, Zingiberis, cinnamomi ana drac. qua-
 tuor, prædictis misce. Postremò adde strobilorum
 depellatorum librani vnam & dimidiam, pista-
 ciorum depellatorum vncias decem, cerebrorum
 passeris vncias duas, misce omnia probè aroma-
 tiza drach. vna (aqua rosarum semiuncia solu-
 ta & cum aliis mista) moschi boni.

Radices raphani cum etiam duriores
 sint radicibus eryngij, cum his præcoquē
 de videntur. radicis dracontij acrimonia,
 lacte, butyro, oleo obtunditur. Potes co-
 quere ex lacte ouillo, muliebri, caprino,
 & etiā asinino pro variis medici scopis,
 quibus etiam calidiora interdum auferre
 cogimur. Pro oleo sesamino iam desito
 sumitur oleum amygdalarum dulcium:
 quale postea describam, vt in diasatyrio
 analeptico. Iusta crassities est cataplasma-
 tis, opiatae, cassiae purgatae, sordium auris,
 mellis vetusti, aut probè despumati, quod

signum quoque est perfectę coctionis, cuius post meminit. Nam mel despumatum, & succus caprę prædictam crassitiem eliquabunt, & velut incrudabunt: absumpta deinde per coctionem reliqua mellis humiditate, & ea quę largior est in succo caprę recuperatur prior cōsistentia, tuncque perfecta est coctio. Cicera eadem ratione infundit vel incoquit lacte, in pulvere impinguante sectione octava. Sunt quę in rem præsentem quo voles tēpore (nam semper vna radix vegeta est, licet magis & minus) lotam radicem ex secundo cicerum decocto coquunt, deinde caryophyllis & cinnamomi frustillis configunt, & cum saccharo clarificato, & colato parum diu percoquunt, dāntque dormituris radicem vnam, aut duas, nec infœliciter.

Aquā cicerum secundam cur capiamus in Mesue dictum. Radices plenas capit ex agro præsertim sabuloso, quia flaccidæ sunt exanimatæ. & vide ne varietas satyriorum tibi imponat, lactis quātitas sufficiens, vt digitis duobus supernatet, quo assumpto, si nondum hæ sunt percoctæ nouum lac, butyrum, oleum affunde. Pro cępa bulbum ascalonitem nobis dictum, cur ponendum putem in Mesue docui.

Been,

Been, zingiber primò terantur, semitritis adde semina, deinde cinnamomum, postremo scinci sici pulverem.

STROBILOS aqua tepida per semihoram prius macerati volunt ad acrimoniam tollendam, quæ cum tam exigua sit, in aliis magna, frustra id causantur.

CEREBELLA passeris præparata, ut libro secundo docuimus, in pluribus præparationum modis.

Saccharum rosatum sic fit: Folia rosarum rubrarum nondum omnino apertarum in umbra consiccantur, donec ipsorum humiditas superflua uia resoluiatur: teruntur tunc in mortario lapideo, sari. additur sacchari albi triplum reponuntur vases vitreo aut vitrate pergamena operculato, menses tribus insolantur, in dies sepe mouentur, rique soli auferuntur, seruantur.*

Sit saccharum, & mel triplum, ut florũ, parum siccatorum uncias duabus, mellis despumati, aut sacchari puri, puluerati, uncias sex miscent.

Saccharum autem rosatũ aliud hodie nobis appellatur, quod aqua rosarum albarum, aut speco rubrarum pari solutum ad electarij solidi crassitiem coquitur, & pulueratur, vel in marmor butyro superlitum iniicitur, ibi q; lateſcit, dum coaluit.

in tessellas secatur. Saccharum rosarū tabulatum vulgo dicitur.

Saccharum violatum fit; ut rosatum, nisi quod viola paulo diutius, & in umbra siccanda, & cum saccharo insolanda: sic fit saccharū buglossatum & rosmarinatum.

Rosmarinatum malè anthosatum vocant, cum anthos florem omnem significet non speciatim florem rosmarini. Sic etiam conseruæ, ut vocant, fiant ex floribus Persicorum, arantiorū, genistæ, spartii, maluæ, althææ, & similium florum.

Sunt tamen qui flores integros, & sacchari puluerem vicissim vasi inspergunt, & insolant, adiuntq; sic suas qualitates propè integras flores seruare. Alij saccharum clarificatum infundunt.

Similiter quoque fiunt herbarum quarundam natura exuccarum conseruæ, ut adiantorum omnium, quibus ad analepticum destillatum vtimur, & cōserua asplenij, saluæ vitæ, phyllitidis, & similij. Herbæ enim hæc recentes in mortatio lapideo teruntur, saccharo duplo miscentur, insolantur.

Mel rosatum sic fit, succi rosarum recentium libra vna cum mellis albißimi & purißimi, & despumati libris decem coquitur igni in lebetes.

Vbi fernere hac incipient, adde rosarum viridiū forficibus, vel cultello incisarum libras quatuor, coque ad succi consumptionem, continenter monendo in fictile aliquod transuasa, & diu eodē contine. nam tempore præstantius euadit. Eodē modo fit mel violatum.

Mel cum libris aquæ tribus medio critter despumetur: vbi de inde feruebit, super ignem aut extra misce rosas & succū, & in sola dies quadraginta aut circiter: coque ad succi consumptionem, cola, percoque in syrupum.

Sunt qui mel clarificant cum mel rosarum ore excipiendum est, illud enim clysteribus magis idoneum est.

Mel myrtinum fit ex succi myrtorum libr. 1. mellis libr. 2. igne lento simul percoctis.

Mel vniatum passulatum vulgo, fit ex vuis passis intus purgatis aqua calida 24. horas maceratis, probè coctis, valenter expressis, expresso tandem ad mellis crassitiem percocto.

Mel emblicarum, scilicet myrobalanorum est quo ipsæ sunt conditæ & seruatæ.

His mellis differentiis vtimur in aliis compositionibus.

Anacardi triti diebus 7. aceto sufficienti macerantur, octauo coquuntur ad di-

dimidias, colantur linteolo. Succus is cū melle sufficienti coctus ad spissitudinem mel est anacardinum. Fax verò siccata anacardi sunt præparati. Nicolaus Alexandrinus in Theodoretō ex melle anacardino, alij melleum id quod aquæ inuatat, cui incoquantur anacardi.

Fructus aut saccharo, aut melle, aut utroque condiuntur, interdum integri & cum seminibus, sed serè imperfecti, interdum seminibus purgati.

Fructus nostrates condiuntur poma, pyra moschatella, cydonia, persica præcocia, armeniaca, pruna, præsertim dactylina, nuces virides, cerasa, corna, bacca ribes, & oxyacanthæ, omphaces omnes integri præterquam magni, ut cydonia, persica. hi enim foris & intus purgati, & in partes quatuor secti cōdiuntur. Nuces verò depellatæ diebus nouem aqua pura in dies ter, quater mutata, macerentur. Postea cōquuntur aqua, donec tenebescant, siccaturs vëto aut linteis, caryophyllis & cinamomi portiunculis configuntur. Deinde ut reliqui fructus cōdiuntur. Alij melius nuces immaturas ter fuso (nā ferramentū acutū nigrauerit magis) configuntur, aqua sepe mutata macerantur, coquuntur, ubi tenebre euaserunt, mox in quam frigidam, pu-

rum coniiciuntur: exemptæ depellantur, linteo siccantur, caryophyllis, cinnamomo configuntur: saccharo clarificato & percocto teguntur, quod secundo aut tertio quoq; die, quia recrudit, parū est recoquendū, nucibus tamen interea exemptis. Sic enim virides, & paræ magis permanēt. Cydonia quoq; purgata ex aqua coquuntur, donec tenescāt, postea condiuntur. Modus autē condiendi omnibus est vnus, saccharo enim ad syrupi cōsistentiam cocto immissi incoquūtur, donec syrupi consistentiā saccharum recuperarit, quā amisit fructuū humore solutū. Quin & præcocia si præterea saccharum recrudant, id exemptis interea præcocibus recoquendū, deinde præcocibus reddendū. Si enim cum saccharo recoquerētur, durescerent. Aliæ cydoniorū amborum conditura docentur in Mesue, sect. i.

Gelatinam cydoniorum sunt qui ex succo cydoniorum coquunt, alij ex cydoniati parte liquidiore, affuso vtroque pauco succo ribes, aut oxyacanthæ, ad ruboris gratiam.

CONDITURA SEMINVM,

& aliorum quorundam.

COriandrum in tabula polita decli-
cui, crebro succussu purgatur. Rotun-

dius enim ac integrū delabitur. Quæ verò sunt quassa grana, & cum his alienæ quædam materiæ in via ferè hærent, vel in ipsis ceu carceribus pigra cessant. Accito id mersum horis circiter octo sine igni maceratur, igni frigitur ac siccatur, eius libra vna saccharo sic tegitur ac incrustatur. Aquæ in lebetem stannatum impositæ libris nouem albumina ouorum tria iniiciuntur, scopularum agitu multo in spumam tolluntur, mox sacchari, si impurum est (purum enim parcius satis est, parcioremq; aquam requirit) libræ nouem miscentur igni, omnia simul feruendo parum diu, & rudicula cōfunduntur, donec spuma nigrescat, quod aquæ sexta parte cōsumpta ferè accidit, per pannū laneum colatur. Eius propè dimidium in syrupi ferè consistentiam recoquitur. Interea semidolio focum alterum habenti superpositum in magna pelui ærea coriandrū manibus ad siccandum ducitur. Dum siccum est, sacchari eius vncia circiter vna cochleari affunditur, multum diuq; manibus in ea confricatur, id velut tectorium dum apparet siccatum, iniecto nouo saccharo, iterum vt prius confricatur, idque opus repetitur, donec totum illud saccharum induerint grana coriandri. Tunc reliquum

liquam sacchari dimidium in syrupi crassitudinem percoctum, similiter affunditur & confricatur.

Perlaturum verò fit (sic enim vocât, quando eius corpori saccharum accrescit in formam paruorum vnionum, quos vulgus perlas appellat) si vbi iustam incrustationem, sed læuem & politâ est assequutum, è vase sublimi inferno foramine saccharum sic percoctum paulatim tâquam filo perpetuo in peluim coriandrum sic tectum habentem continenter defluat. Peluim verò continenter in omnem partem dimoueas, vel ansis apprehensam, & super corpus rotundum lineo circulo interposito facilè mobilem, vel facilius multò mobilem, si ansis funes sic ex solarii tigillo aliquo innexi, vt vterq; alternis nunc tollatur, nunc deprimatur. Sic cortex cinnamomi, & aranciorum conditur, si negligentia frictionis, aut imperitia saccharum fundo peluis hæserit, semina exime, & vasi aquam infunde, igni trade, donec saccharum remollescat, & rudicula ferrea deradenti cedat. Vbi tersum erit fundum vasis, aquam illam saccharatam effunde in vsus aliquos seruituram, vas linteum mundo, & igni sicca, semina tunc illi redde, & opus perface.

Quanto autem est semen minutius, tanto ægrius saccharo integitur, & maiore iniuria manuum nullius propè interuentu calidario occurrētium: sed vbi iam auctius tectoriis aliquot est redditū, tum rutilius & facilius manibus confricantibus perficitur. Talia sunt semen anisi, scenticuli, apij, cari, scriphiij, quod contra vermes vocant, papaueris albi in cerniculo ratiore, aut densiore pro seminis quantitate, purgatum accuratius confricandum: Strobili, pistacia, auellanae, amygdalae dulces, & si vis amarae, similiter siccatae eodem modo, sed citius incrustantur. Caryophyllorum surculi, cinnamomum, cortex arācij, limonis, cucurbitae.

Tragema, moscharū, ex puluere ireos, saccharo aqua rosarum, & paucō moscho sic fit. Puluis ireos velut compositi basis, in peluim missa affuso paucō saccharo tribulatur: vbi in granula minima partim concreuit, partim in maiora cribro exiguo cernitur, quod transit deligitur, iterū si opus est tegitur, donec seminis papaueris (quod etiam nonnulli loco pulueris ireos supponunt ad operis celeritatem) forunditatem & magnitudinem sit assequutum. Tunc moschus aqua rosarum pauca, vt drachma vna yncia semisse solutus,

lutus, paucis saccharo miscetur quo possimum fit tectorium: sunt qui acerui huius condituræ moschi pyxidem biduo aut triduo tantum obruant, ut moschi odorem trahat, substantiam non dissipet manifestè.

SECTIO SECUNDA DE Sapa & Syrupis.

Sapa est succus à nobis tantum purgatus, Mes. & crassatus solis aut ignis calore.

Sapa nobis sola paratur ex acinis vuarum albæ maturis, in lebece sine ullo liquore coctis, per mantile colatis & expressis: Id autem expressum percoquitur ad mellis consistentiam. Sunt qui ut felicius seruetur, saccharo pari condunt: sunt qui ex vulis etiam nigris saram coquant.

Iulepus rosatus fit ex aqua rosarum cum pari saccharo cocta prope ad syrupi consistentiam: aut multo minus si mox utendus est, nec aer ita caler.

Iulepus violatus fit ex aqua florum, & foliorum violæ nigræ, & pari saccharo similiter coctis, supra apozematum consistentiam infra syrupi formam. Quanto enim perfectius coquitur, tanto diutius servatur: sed est ingratus. Paratur in rem præsentem, aut si non licet, eorum loco syrupi usurpantur. Quia verò violas non distill

destillamus ex siccarū infuso coquimus Alij magma violarum ad syrup violatum ex multis infusionibus faciendum infusarum parum expressum destillant, hācq; aqua iniquē vtuntur ad iulepi violati cōpositionem.

Materia syruporum omnis est à plantis, radices apij, petroselini, fœniculi, asparagi, rusci, cichorii, intybi, ieros, pyrethri, spinæ albæ, & Arabicę, glycyrrhiza, poly-podium, agaricus, rha barbarum, elleborus niger, asarum, galanga, zingiber.

Herbæ, buglossus ytraque, hyssopus, mentha, calaminthe, cupatorium, absinthium, adiantum album, origanum, thymum, epithymum, cassutha, oxalis, sumaria, chamædrys, chamæpitys, folium. Harum item multarum succus, præsertim buglossi, menthæ, cupatorii, oxalidis, sumariæ, intybi, portulacæ.

Fructus poma, pyra, cydonia, cucurbita, granata, citrea, pruna, dactyli, thamar Indi, myrobalani, myxa, zizypha, ficus, vuæ passæ mundatæ, capita papaueris albi, nigri, rubri, folliculi sennæ. Horum multorum succus tantum, præsertim pomorum, pyrorum, cydoniorum, cucurbitæ, granatorum, citreorum, & horum cortex, vuarum acerbarum & maturarum, vinum

num album bonum, antiquum, odorum,
acetum, sapa. Ad hæc myrtarum, pruno-
rum, persicorum, ribes, oxyacanthæ, can-
narum sacchari, saccharum, penidia : &
his affinia, manna, mel crudum, & co-
quendo despumatum.

Semina, cydoniorum, melonum, papa-
ueris albi, nigri, rubri, lactucæ, portulacæ,
apij, petroselini, intybi, fœniculi, anisi, li-
gustici, dauci, cari piper omne, cardamo-
mum, hordeum, maluæ, lini, fœnigræci.

Flores, êrocus, rosa, viola, storchas, schœ-
nuanthos, epithymum, cassutha, spica nar-
di, caryophyllum, gummi Arabicum, tra-
gacantha, mastiche, & liquor scammo-
nium. Et præter hæc aqua ferè fontana pu-
ra illimis, ac omnis alienæ qualitatis ex-
pers, interdum pluuiæ quæ additur, vt in
eam vires medicamentorum simplicium
macerâdo, & coquendo trahâtur: deinde
saccharo tradantur, vt etiam medicamen-
tum diu coqui possit, & qualitates alienas
exuat, nouas acquirat : vt etiâ promptius
syrupi despumentur, clarificentur, colen-
tur, & in corpus distribuâtur: & sint acci-
piētī gratiores. Aquæ vires sæpe succi su-
stinent, sed hi sunt, vt dicam, clarificandi.

Succi, herbarum, & fructuum ad syru-
pos bis coquuntur, primò ad dimidias, vt
syrup.

syrup. de pomis, & alij propè reliqui: inter
dum ad partis tertiæ consumptionem, vt
syrup. acidus ex succo citri, & alter ex fue-
cis fructuum: interdū ad libræ vnius con-
sumptionē semel feruefiunt, vt in syrupo
bizantino: deinde colantur, postea quie-
scendo residere sinuntur, alij biduo, alij
triduo, alij minus aut magis diu, donec
scilicet quod in eo crassum & fæculentū
est, subsederit, & reliquum tenuetur, cla-
rūmq; ac purū euadat: id quod paulatim
vase inclinato colatur, iterum & cum sac-
charo ad syrapi consistentiam coquitur.

Subsidet verò aliis citius, aliis tardiū, s,
aliis largius, aliis parcius, vt vinis quæ ge-
nere sunt succorum, & urinis. Vina enim
alba, quia non ferbuerunt, plurimam fæ-
cem reddunt: nigra quia multum feruen-
do crassum deponunt, minus: in medio
sunt media: sic succus pomorū, cydonio-
rum, limonum, multa parte subsidēt: suc-
cus granatorum minus, vt illis pars sexta
ferè subsideat, his pars octaua, vt ex syr.
de succo acido citri aperte deprehendes.

Deinde cum saccharo propè pari per-
coquantur in syrupū, vt succi puri libras
quatuor, quinque, sacchari libras tres,
quatuor recipiant. vt in syrupo succi po-
morum, cucurbitæ succi libræ septem,
sac

sacchari libræ quinque: in syrupo ex succo citri libræ decem humoris libræ octo sacchari in syrupo acido ex pomis. interdum minus sacchari miscet, ut in syrupo Saporis, succorum libræ circiter sex in libris tribus sacchari syrapi corticum citri libræ tres post coctionem relictæ cum sacchari libra vna coquuntur.

Quin syrupo acidus ex cydoniis in succi libris vndecim, habet tantum sacchari libras duas. Est quando modus sacchari incertus est, ut in syrupo acido ex succis fructuum, succi libras tres coquit cum Iulepi libris duabus, vel pluribus, vel paucioribus. Si mannam paucam acceperit syrupo, nihilo minus sacchari postulat, ut syrupo acidus ex manna eius uncias tres capit, succorum libras quatuor, sacchari libras tres. succus tamen cannarum sacchari, aut penidia ponuntur loco sacchari in syrupo de cannis sacchari, nisi pro aut, &, legas.

Quin & Iulepus clarus & purgatus sacchari vice præstantissimus est in syrupo præsertim ex succis frigidis aut aromaticis, ut fit à Mesue in syrupo acido ex succis fructuum, & in syrupo corticum citri. Saccharum autem optimum ex aqua æquali coquunt, albuminibus purgant, colant, recoquunt ad penidiorum, aut sacchari rosati, aut elect

electarij sicci consistentiã, & succos mor-
vbi extracti sunt, sine vlla coctione, cola-
tione, residentia colant, per spumam in-
colo relictam ex saccharo iam colato, pu-
rissimiq; hi transfluunt, & æqua portione
baculo multum tribulando electariorum
siccorum ritu paulatim miscentur saccha-
ro sic percocto, quem Iulepum vocat Me-
sues, quomodo & syrup. acetosum simpli-
cem Mesuæ, & oxysaccharum Nicolai, &
alios multos sirupos ex succis pleriq; ho-
die componunt, vt vires eorum sint inte-
griores, nec ita promptè candescant. quod
vitium paucò melle misto quidam effu-
giunt. Id quod probo maximè, modò nō
canescant, & situm non ducant ob succo-
rem cruditatem. Quod vitium cauetur in-
solatu: quæ coctio his potior est, quàm
quæ ab igne. Hoc autem modo syrup. aci-
dus citri, limonũ, ac etatus simplex albif-
simus fit. granatorum autem ribes oxya-
canthæ syrup. cum debeat esse ruber, mi-
nus diu debet tribulari, ne coloris sui gra-
tiam amittat. Est quãdo saccharum simul
cum penidiis miscetur, vt in syrup. papa-
uerum ad catarrhum sacchari & penidio-
rum ana vnciæ quatuor in decocti seli-
bra, & in syr. papauerũ ad tussim, sacchari
& penidiorũ ana vnc. octo, in decocti lib.
duabus

duabus, sed in illo saccharū est parcius, vt in syr. adianti, sacchari clarificati, & aque adianti ana vnc. 8. cum lib. duab. decocti.

Coquuntur autem in vase terreo plum-
bato potius quàm aereo stānato, igni pru-
narum lēto, aut flāma exigua, sed sine fu-
mo, vt carbonēs antē sint omnino accēsi
quàm vas igni tradatur: qui si coctioni
non sufficiant, alij ex foco semusti substi-
tuantur, vt diximus in methodo medica-
menta componendi lib. 3. ne carbonum
nouorum teter vapor coquenda vitiet.

Coquuntur syrapi ad iustam crassitiē,
seu donec portio eorum refrigerata digi-
tis tractatu hāret, ac fila ducit, & iniecta
marmorī aut scutellæ stat & durefcit non
fluitat: seu donec inmissi humoris seu de-
cocti, seu succi vnciæ circiter duæ in li-
bris singulis sacchari supersint. Id quod
deprehēdes bullarum modo & numero:
nam quoad succi multum superest in me-
dio bullam excitat vnā, eāque maxi-
mam in ambitu paucas & paruas: dum ve-
rō in syrapi consistentiam coctum propē
est pro bulla illa maxima, plurimæ vbi-
que mediocres tolluntur.

*Nicol.
Alex.
in syr.
ros.*

Qui verō syrapi decocto constant, nō
succis, pro seminū aut radicū libra vna
requirūt aque libras circiter quatuor, pro

herbarū manipulis quatuor, siccarū quidem, aquæ libras duas, viridiū verò librā vnā: aliorum autē simplicium, quia pauca sunt, parua habetur ratio. Mesues tamen, radicū simul & seminum librā vnā coquit in aquæ libris decem ad dimidiās in syrupo acetato cum radicibus.

Cum item hordeum, vel aliud diu coquendum est, aut per se est macerādum, aut tanto largior aqua est affundenda, quanto coctio longior est futura: sic dum sicca, rara, lenta, & glutinosa coquis, aquā auge, vt in syrupo hyssopi, zizyphorum: alioqui colari non poterit, nisi nodulū ex glutinosis iam colato incoquis, aut muccaginē ex his cum portione decocti extractā coctiori iam saccharo mices. Incocta enim hæc glutinosa decoctum incolabile reddunt, quia substantia emplastica viam sibi præcludūt, poris colli obstructis. Idē vitium est si penidia miscetur ex saccharo pinguiore, impuriore cum amylo multo tractata. Sunt qui librę medicamentoꝝ multam coctionē sustinentium tribuant aquæ lib. 6. paucam, selibrā, mediocrem. 3. lib. aquæ.

Dios. Simplicia primū deliguntur, & in seriola papyracea, vel similia digerantur. Siqua seorsum macerāda sunt, aut simul
ante

ante macerentur: coquenda verò in lebe-
tem in quò aqua iam caleat, non tamen
ferueat, iniiciantur, primum coctu contu-
macia, seu quæ viribus suis adhuc inte-
gris, longam sustinent coctionem, qualia
ferè sunt radices, semina, fructus, corti- *Dios.*
ces lignorum: deinde illa quæ mediocri-
ter: postremò quæ ob essentiaæ tenuitatē,
aut virium imbecillitatem, etiam medio-
cri coctione exanimantur. Id quod odo-
re, sapore, colore nativo mox perduto fe-
rè declarant. Quanquam color viridis in
adiantis, ruber in zizyphis magis inten-
ditur: quia in his valenter est mistus, &
adianti perpetuò virent, de quibus omni-
bus abundè libro præcedente, de coctio-
nis ratione diximus. hæc dū carbonibus
accensis coquuntur, quæ spuma superna-
tat, cochleari foraminulèto deraditur, &
simplicia, præsertim grania, identidem ru-
dicula tolluntur à fundo, ne vrantur, & le-
uia merguntur, vt coquatur, & vires suas
aquæ tradant. Vbi quātum satis est cocta-
erunt omnia (quod ferè fit hora vna) &
vim suam omnē in aqua iam quantū sa-
tis est cōsumpta deposuerunt (quā mul-
tis simplicib. sapor propè aqueus relicto
proprio declarat) igni aufer, & si vis in stā-
neam peluim, aut stannatam transuasa:

tege disco mundo, horis quinque, sex, noctē, diem, macerari permitte. Post id tempus igni parum diu redde, vt recalescant tantum: tunc per stamē cola, & exprime. Expressum vel procul ab igni, vel potius igni redditum, ouorum duorum iniectis albuminibus in libras 8. 9. 10. scopulis agitata diu, & permisce donec quātum potest spumescat. Mox saccharum in frusta comminutum immitte, aut penidia, aut mel, & si qua sunt seorsum infusa, aut soluta, vt thamar Indi, cassia, agaricus. Postea coque, donec feruēdo parum absit à supernatādo & effluendo, efflataq; modice spuma decoctū sub hac elatū appareat. Tūc vt calet pāno laneo puro cola, si est glutinosum, & quod primū permearit rursus cola, & si vis totum bis, aut ter cola, mutato etiā colo, si propter prioris sordē opus est. Nā quæ ita calida colantur, igni multum tenuata, permeāt impuriora: si lēto re carent, modicè refrigerata colētur: Pāno etiā digitis molliter expresso, nequid utilis materiæ in eo & fæcib. maneat, ne tamē adeò exprimas, vt sordis aliquid simul elicias, tunc enim iterū foret colandum. Vbi colando iam purū erit expressum, purgato interea & siccato lebeti redde, & igni lento percoque ad syrupi consistentiam,

sistentiam, seu donec decocti vaciæ duæ, aut tres in libris singulis supersint.

Si autem mucosa quædam sint incoquenda, vt semina maluæ, cydoniorum, lini, scæ nigrici, mastiche, aragacantha, gumi Arabicum, nodulo raro ligata filo lōgo & forti colato iam decocto incoque. Sunt qui tantum ante clarificationem incoquunt, alij ante & post. Postremo cum absoluta est coctio, expressum nonnulli abiiciunt: alij nulla ratione in decocto retinent, cum vires suas ea iam tradiderint omnes, non etiā aliquas retinēt, vt nodulus aromatum, rha barbari, scammonij, ellebori nigri, & aliorum de quibus libro superiore in expressione.

Si verò ex infusione simplicium post coquenda fiat syrupus, omnia simul infundantur, deinde coquantur. Sic enim vis eorū humori firmitus, & diutius impressa, coctione iusta dissipari nō videtur. Aqua autem infunduntur largiore sicca, rara quā viridia densa, vt in syr. stœchados simplicium, verbi gra. parum tritorū lib. vna maceretur horis 24. libris septem aquæ, si aridiora sint, libris octo, quarum vnā vel paulo plus ebibent: coquantur deinde igni lento ad partis tertiæ consumptionem, quod etiā citra infusio-

nem coquendo, faciendum est: postea exprime, & reliquum, & lib. quatuor percoque cum mellis despumati, aut sacchari puri libris quinque ad syrupi consistentiam, & syrupi habebis lib. 6. & dimidiam: aut si hyems est, ad libras sex: si æstas, ad lib. quinque & dimidiam. Nam æstate syrupi magis coquendi quàm hyeme ne ferueant humore excrementoso feruoris & putredinis causa relicto, accedente externo calore hanc excitante. sacchari aut mellis purgati pondus par succo aut decocto quidam misceri volūt: alij verò etiam paulò plus ob nostrarum platarum cruditatem, ob quam etiam diutius syrupi nobis sunt coquendi, vt propè solum sacchari aut mellis pondus maneat percocto iam syrupo. Diutius etià coquendum, si succi, aut decocti plus est quàm sacchari, aut mellis. Paulus tamen mellis partem vnam, succi, aut aquæ partes tres coquit ad partium duarum consumptionem in rhò dostacte, succi rosarum sextarios duos, mellis sextarium vnum coquit ad quartæ partis consumptionem.

Coquuntur syrupi in vase quouis, sed q acetati sunt, in vase lapideo vel terreo, sed plumbato: quod etià Mesl. rectè monuit in syr. acetato simplici, ne acetum ex

ære æruginem eliciat quæ syrupū vitiet, nisi vas æreum sit stannatum, quale est quo utitur ferè in officinis. In quibus coctionis perfectæ scopus est syrupi consistentia: si verò antequā mel recipiant, cocta erant parum, ut ad tertiæ partis consumptionē, post mel acceptū magis sunt coquenda, ut oxymel, de radicibus. Minus autem quæ cocta erant donec tantū pars tertia remaneret, ut in oxymelite, de calaminthe mediocriter, ubi ad dimidias erant cocta, aut mel perfectius coctum illis minus coctum, secundis mediocriter coctum, postremis miscendum est.

Si operis specimen edis, aut etiam tecum componis, aquæ libras quindecim cum Mel. aut potius viginti, libras sex rosarum macera horas octo, expressis rosis novas immitte, idque opus novies repete: aut si libras aquæ tantum quindecim misces, expressum pende, quod si diminutum est, quod deest suffice alio expresso trium aut quatuor infusionum.

Syrupus rosatus sic paratur, Rosas recentes aqua fervente macera vase operculato, ubi hæc refrixerit, expressis rosis & abiectionis, iterum feruescat, & easdem rosas recentes alias macera. Id opus toties repete, donec aqua rubeat. Hæc albuminibus purgata cum pari saccharo

Nicol.

percoquatur in syrupum.

Parari omnino hic debet aut iulepus rosatus Mes. in syrupum coquendus, non autem eius loco semper (quod hodie fit) substitui syr. ex rosarum siccarum infuso simplici, vel duplici cum pari, aut paulo parciore saccharo cocto & colato, q̄ syr. rosarum siccarum est. Alius autem ex succo rosarum rubrarum fiat purgato, cum pari saccharo, tertius ex infusionibus novem rosarum, præcipuè incarnatarum purgatorius.

Nicol. Syrupus violatus, & nymphae, & alij ex
Mes. floribus eodem modo fiunt.

• Syrupus ex cydoniis fit ex libris decem succi cydoniorum coctis ad dimidias. Deinde biduo residere permixtus donec clarescant. Tunc colentur, & cum libris tribus sacchari fiat syrupus.

Si saccharum est purum, eius lib. vna aquæ vnciis quatuor soluta tribus fermentationibus in electarium coquitur, tunc succus cydoniorum pistillo valenter commiscetur. sunt qui parumper saccharo propè percocto incoquant: si impurum est saccharum, eius libra in aquæ lib. vna coquitur, clarificatur, colatur, percoquitur in electarium, fit vt prius. Sunt qui succos citrà coctionē residendo, & insolando purgant, deinde cum saccharo clarificant,

ficant, colant, percoquunt. Alij aliter, vt ante diximus.

Syr. de granatis acidis, syr. de granatis dul- Mes.
cibus, syr. de omphacio, syr. ex succo oxalidis,
eodem modo fiunt, & de ribes, & rubeo xya-
canthe.

Similiter ex fructuum omnium, & herbarum succo fieri syrupus potest si ad dimidias coquatur, biduo residere permittatur, coletur, cum saccharo propè equali percoquatur, in syrupi consistentiam.

Alij in his omnibus saccharum aqua pari solutum, coctum modicè cum albuminibus purgant, colant, percoquunt in electarij, aut penidiorum consistentiam. Tunc vbi frigescit, succos ipsos per albumina in colo relictà colatos, & claros paulatim baculo miscet, qua componendi ratione succorum vis, præsertim frigida, vel aromatica integrior manet quam si ipsi coquantur. Alij succos hos residendo, & insolatu purgatos, saccharo, vt dixi, percocto comprehendunt. Quam componendi rationem omnino præfero ei quæ succos ad dimidias coquit.

SYRVI COMPOSITI.

Syrupus Saporis de pomis recipit succi pomorum redolentium lib. tres, succi buglossi da-

mestici & sylvestris ana lib. duas, folliculorum
senna vnc. quatuor, croci drach. duas, sacchari
albi libras tres. Fit autem sic, senna contrita ho-
ris 24. succis maceratur, semel aut bis feruefiat,
coletur: expressum post cum saccharo percoqua-
tur in syrupum: crocus autem panno lineo liga-
tus inter coquendum infricetur.

Mes.

Syrupus portulacæ accipit seminum portu-
lacæ tritorum lib. vnā, horis 24. maceran-
dam in succi intybi cocti & purgati lib. qua-
tuor. postea igni lento coque ad dimidias, &
colatum cum sacchari lib. duabus percoque in
syrupum.

Syr. adiantinus recipit glycyrrhizæ vncias
duas, adianti albi vnc. quinque, tempera cum
aquæ fontis lib. quatuor horis 24. coque ad dimi-
dias, expressum percoque cum sacchari clarifi-
cati, aquæ adianti albi ana vnc. octo.

Ex adianti albi lib. vna, & vnciis dua-
bus glycyrrhizæ purgatæ & tritæ, deco-
ctis in aquæ libris sex ad consumptionē
tertiæ partis cum sacchari libris tribus
hic percoquimus, adianti albi, recentis
penuria, alij cum sacch. libra, aut sesquili-
bra coquunt sine aqua adianti, alij adian-
tum album recens multum sine glycyrr-
rhiza aqua macerant, exprimūt, cum sac-
charo clarificant, percoquunt.

Mes.

Syr. Zizyphorum fit ex Zizypho sexaginta,
viola-

violarum, seminis malue, ana vnc. quinque, adianti albi, glycyrrizæ, hordei mundati, ana vnc. vna, sem. cydoniorum, papaueris, melonis, lactuce, tragacanthæ, ana drac. tribus, coctis cum aqua fontana lib. quatuor, & lib. sacchari duabus.

Aqua est parcior quam ut possit colari, ob id vel augenda est, vel semen maluæ & cydoniorum, & gummi tragacanthæ nodulo ligata clarificato syrupo immittantur, vel dimidium nodulo coctioni ante clarificationem immittatur: reliquū iam clarificato, si autem muccaginem ex his extractam non clarificato immiseris, æger timē ob horum lentorem colatur: si colato, turbidus & impurus, ob id ingratior fit syrupus.

Syr. papaueris fit ex capitum papaueris albi, Ibid. & nigri, ana drachm. sexaginta coctis in libr. quatuor aqua pluuialis ad consumptionem libr. 2. & dimidiæ, tunc percoquantur cum sacchari albi, & penidiorum ana vnc. quatuor.

Largiore saccharo si cōdias, ut lib. vna, aut etiam duabus, gratus erit, & citra multam coctionem facultati refrigeranti inimicam diutius seruabitur, cum pauco autem saccharo puto, si diu non erit seruandum, est efficacius. Capita cum seminibus magnorum & parvorum secco-

rum & humidorum media macerentur
24. horis: & si sint sicciora, pluribus dein-
de coquantur, donec tabescant: expri-
mantur cum saccharo, vel melle pro va-
riis medici scopis, percoquantur in syru-
pum. Vide diacodium in Mes.

Ibidē.

Syr. acetatus simplex recipit aqua fontis lib.
quatuor cum sacchari lib. quinque coquendas
in vase lapideo, ad dimidias semper despumando,
tunc adde aceti albi clari lib. duas.

Sunt qui saccharum aqua solutum me-
diocriter coquunt, albuminibus purgāt,
colant, percoquunt in electarij consisten-
tiam, frigescenti paulatim baculo miscēt
acetum purum, vel per albumina in colo-
relieta colatum, idque ne candescat. Alij
Nicolaum sequentes aceti albi partes
duas cum saccharo purissimo coquunt &
despumant, neque aliter clarificant. Hic
quanquam minimum, tamen composi-
tus est.

Syr. acetatus cum radicibus, recipit radicem
apij, fœniculi, intybi, ana vnc. tres, seminum a-
pji, fœniculi, anisi, ana vnc. vnam, sem. intybi
vnc. dimidiam. Hæc omnia igni lento coquan-
tur ad dimidias in aqua fontana lib. decē, tunc
additis sacchari lib. tribus clarificetur, deinde a-
cetum additur.

Syr. Bizantinus (Hic putatur inuentus, vel

usu multo celebratus Bizanti, unde illi nomen. alius à pretio denarij bizantini: qui quibusdam hodie etiam bisantius dicitur, unde & Syr. quoque hunc denarij vocant) recipit succi intybi, & apij ana libr. duas, succi lupuli, buglossi hortensis, vel sylvestris ana lib. vnam, seruesiant semel & purgentur. Eius succi clarificati libras quatuor igni lento coque in syrupum cum sacchari libr. duabus, & dimidia. interdum additur acetum mēsurā succorum purgatorum dimidia: interdum rosarum vnc. dua, glycyrrhizē, vnc. dimidia: spica nardi drachm. dua sem. anisi, fœniculi, apij ana drachm. tres: succis incoquantur.

* Syr. de quinque radicibus accipit radicem * Incer apij, fœniculi, petroselini, asparagi rusci, ana ti est vnc. duas, coque libr. sex aqua fontis, ad tertiam partem consumptionem. expressum percoquitur cum sacchari libr. tribus, addendo sub finem acetum vnc. octo.

Oxymeli simplex fit ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aqua partibus quatuor coctis in syr. consistentiam despumando.

Hodie sic coquunt quod diu seruandū est. Oxymeli autem Galen. ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aqua partibus hyeme octo, æstate etiam duodecim. Mel cum aqua primū despumatur, vbi spumate desit, cum aceto iterum despumatur.

matur, refrigeratū albuminibus clarifica-
tur, igni redditur parū diu, cū tollitur,
cinnamomum ad drach. vnam in lib. sin-
gulas: dum refrixit, per pannum bis, ter
colatur: addito siviſ etiam tum cinnamo-
mo iucundissimū, dies paucos loco frigi-
do seruat, ex albo aceto melle pulchri.

*Me-
sues.*

Acetum scillinum sic fit, scillæ laminas inter
corticem & cor medias, acu linea filo consutas
tanto intervallo ne se contingant siccabis in um-
bra dies quadraginta, postea concisam cultello
ligneo lib. vnam dies alios 40. insolabis, in aceti
boni lib. 8. in vase vitrato, stricti orificij bene ob-
structi, postea colabis, & seruabis.

Sunt qui inter scillæ laminas ne se tā-
gant, & ad odoris gratiam intersuunt fœ-
niculi viridis, aut sicci stipites.

Ibidē.

Oxymeli scillinum fit ex aceti scillini libr.
duabus, mellis despumati, lib. tribus decoctis de-
spumando.

Ante mel fit despumatum, vt in melle
rosato, sed quam spumam vi aceti scillini
expuit, eam derade.

Oxysaccharum fit ex aceti vnc. quatuor, sac-
chari lib. vna, succi granatorum acidorum mæ-
turorum lib. dimidia.

Saccharum si purum est aceto solutū,
duabus aut tribus seruesactionibus co-
quitur in electarium, postea cum parum
refri

refrixit, pistillo miscetur succus granatorum. Si autem saccharum est impurum, ex aqua coquitur & clarificatur, deinde aceto & succo percoquitur.

Syr. absinthij recipit absinthij Romani libr. dimidiam, rosarum rubrarum vnc. duas, spica uardi drachim. tres, vini antiqui boni & odori, succi cydoniorum ana lib. vnam & dimidiam. In his macera horis 24. prædicta coque igni lento ad dimidias cum mellis libr. duabus fiat syrupus.

Ab sinthium, rosa, spica minutim concisa, vino & succo macerantur, coquuntur, exprimuntur, expressura cū saccharo clarificatum percoquitur in syrupum. Satius fuerit absinthium per se infundere, & rosas, & spicam simul, deinde infuso absinthij parum cocto addere alterum, & parū simul coquere, exprimere. In expresso lib. sacchari dissoluti albuminibus clarifica, cola, tunc adde lib. reliquam sacchari, sed purissimi, vel per se clarificati. Si enim decoctum id cum duabus simul libris sacchari clarificas, ob succi paucitatem non percolabitur, nisi succum, ut dixi, auxeris ad lib. duas & dimidiam.

Syr. mentha recipit succi cydoniorum acidodulcium & dulcium, succi granatorum acidorum, dulcium, acidodulcium, ana, libr. vnam

℞ dimidiam, foliorum rosarum vnc. duas, coque igni lento ad dimidias, cum mellis vel sacchari libr. duabus fiat syrupus, arematizetur cum gallia.

Succos potes sole, igni, quiete purgare, & his reliqua macerare, vel citra purificationē. His cetera macerabis horis 24. igni lento coque, exprime, recoque, clarifica cū saccharo, vel saccharum clarificatum misce, cola, exprime cum saccharo, expressum clarifica, colatur pāno ægrè & lentè, sed tandem aut pannum muta, aut saccharum, vt prius, partire.

Loco syruporum fumarie maioris & minoris hodie coquimus syr. ex succo folius fumarie cocto residendo, purgato, percocto in syrupū cum saccharo æquali.

*Me.
sues.*

Syr. epithymi recipit epithymi boni hortensis drach. viginti, Myrebalanorum Indarum, citrearum ana drach. quindecim, cassutha, fumarie ana drach. decem, thymi, calaminthes, buglossi, stæchados, glycyrrhizæ, polypodij, agarici, myrebal. emblicarū, & bellericæ ana drachm. sex, rosarum, sem. feniculi, anisi ana drac. duas & dimidiam, pruna viginti, vuarum passarum purgatarum vnc. quatuor. Thamar Indorum vnc. duas & dimidiam, sacchari libr. quatuor, sapa lib. duas fiat syrupus.

Pruna

Pruna, vix, semina, polypodiū in aquę
libris octo coquantur: postea glycyrrhi-
za, buglossus fumarīa: post. myrobalani,
calaminthe, thymus: deinde propē coctis
epithymus, cassutha, stæchas, rosæ, agari-
cus, addantur: vbi aquę dimidium erit
consumptum, aufer igni, macerari noctē
vnam sine, recalsfactum exprimē, expres-
sum clarifica cum saccharo, & cola. Tha-
mar Indi cum decocti vnciiis duabus cre-
ti & pensi, vt purgatis pondus iustum ex-
pleant, Syrupo addantur, minimum co-
quantur ad decocti scilicet consumptio-
nem; & sapa syrupo soluta miscetur: re-
coqui enim non debet. Sine his duobus
sapore iucundo prædius consistentia fue-
rit liquidior, clarior & gratior, & efficax
syrupus ad eā quæ promittit. Sunt qui re-
ctius agaricum, & myrobalanos seorsum
infusos exprimunt, & aliis miscent, paulò
ante colationem,

Syr. stæchados recipit florū stæchados drach-
triginta, thymī, calaminthes, origani ana drach-
decem, anisi, pyrathri, ana drach. septem, pipe-
ris longi drach. tres, Zingiberis drachmas duas,
vuarum passarum purgatarū vncias quatuor,
mellis libr. quinque: con diatur cinnamomi, ca-
lami aromatici, spice nardi, creci, Zingiberis,
piperis nigri & longi ana drachm. vna & di-

midia, ligata in panno raro & appensa in syrupum.

Coquitur in aquæ libr. septem, vel octo ad lib. circiter duarum consumptionem, colatum cum sacchari libr. quinque clarificatur, colatur, propè percocto immergitur sæpe nodulus, & rudicula comprimitur: postremò in percocto appenditur. Vux, origanum, calaminthe, pyrethrum, zingiber, piper, thymus, stœchas hoc ordine coquantur.

Despu
mati.

Syr. lyeirrhizæ recipit glycyrrhizæ vnc. duas, adianti albi vnc. vnam, byssopi sicci vnc. dimidiam, horis 2 4. macera, aquæ lib. quatuor, coque ad dimidias, expressum percoque cū mellis, sacchari, penidiarum ana vnc. octo, aquæ rosarum vnc. sex.

Hodie coquunt plerique sine maceratione quòd ex his facultas in aquam coquendo promptè trahi possit. Hæc rosarū aqua percocto iam syrupo addenda, sed coquendo consumenda, nisi cum quibusdam drac. tangeri sex misceas. tunc enim recoqui non oportet, quia aqua tā pauca saccharum non recrudit. Sunt qui mane macerant, post meridiem coquunt, penidia hæc fiat ex saccharo purissimo (nam impurum agre colatur) hoc est, saccharū ad consistentiam penidiis debitam co-
ctum

ctum, & pertritum pistillo ligneo in vase,
non autem manibus oleo inunctis etiam
cum amylo, tractum in penidia nempe
illo saccharo impuriora.

*Syrus. hyssopi recipit hyssopi mediocriter siccī
radicū apij, fœniculi, glycyrrhizæ, ana drach.
decem, hordei mundi vnc. dimidiam, sem. mal-
uæ & cydoniarum, tragacanthæ ana drach.
tres, adianti albi drachmas sex, Zizypha, my-
xa ana triginta, ruarum passarum purgata-
rum drach. duodecim: ficus siccas; daëtylos pin-
gues ana decem, penidiorum alborum libr. duas:
fiat Syrupus.*

In lib. aquę sex calidas iniice hordeum;
hora post dimidia radices, si dantur re-
centes, elignatas tamen & concisas: horę
quarta parte post, fructus omnes, mox se-
mina, & tragacantham linteo raro ligata,
filo longo, postremò adiantum, penidia
ut prius.

○ *Syrup. præsij, recipit præsij vnc. duas, hyssopi,
adianti albi, ana drac. sex, glycyrrhizæ, vnc.
vnā, calaminthes, anisi, radicū apij, fœni-
culi ana drachmas quinque, ireos, semin. mal-
uæ & fœnigraci ana drachm. tres, sem. lini, &
cydoniorum ana drachm. duas, ruarum passa-
rum purgatarum vnc. quinque, ficus passas pin-
gues quindecim, penidiorum, mellis boni despu-
mati ana lib. duas.*

In aquæ libris octo radices primū, deinde anisum; vna, ficus: post præssiū, hyssopum, calaminthæ: postremò adiantum. coquantur ad dimidias; horis sex mace-reantur, recalsiāt, exprimantur, cum pen-diis & saccharo clarificentur, colentur; percoquantur in syrup. interea identidē in id colatum, & si vis expressum immer-so & confricato nodulo semina maluæ; lini, scenigræci, cydoniorum continente.

Syrupus intybi recipit succi intybi vna ser-uesactione, deinde residentia purgati libr. octo, affunde paulatim saccharo, si impurum est cla-rificato. Si verò minus est parum, sacco disso-lutum coquatur, cum albuminibus piergetur, coletur, percoquatur in syrupum: nam hic suc-cus promptè corrumpitur, cum succus limonum, gravatorum, cydoniorum, etiam per se serua-ri possint, & multò magis parum cocti cum sac-charo.

Intybum accipe cichorium sylvestre, nō lactucam sylvestrem, vulgi endiviam seu intybum. Ne sit opus præterea syrup. duo-bus de cichorio, simplici, & de endivia simplici. Quod si in aliquibus scripturis intybus & cichorium requirantur; vel i-psum auge, vel satium & erraticum, an-gustifolium, aut latifolium, vel alias ci-chorij species misce.

Syrupus arthemisiae Matthai Gradi in capit.
de mensibus ciendis libr. 9. ad Almanforem, re-
cipit arthemisia manipulos duos, pulgii, cala-
minthes, origani, melissophylli, persicaria, sa-
binae, sampsuchi, chan edrysos, hyperici, cha-
mapityos, matricariae cum flore, centaurii par-
ui, ruta, bethonica, buglossi, ana manipul.
vnum: radicum fœniculi, apii, petroselini, as-
paragi, rusci, saxifragia, enule, dictamni,
cyperii, rubia, iridis, pœonia ana manipulum
vnum.

Semini iuniperi, libystici, petroselini, apii,
anisi, melantibi, carpobalsami, costi, asari, pyre-
thri, cassia lignea, cardamomi, calami aromati-
ci, phustana vnc. semissem. Quassata insundan-
tur aqua fluminali sufficienti horas 24. post co-
que ad aqua dimidia consumptionem. Tunc au-
fer igni, dum aqua tepuerit, frica manibus o-
mnia & cola. expressum percoque in Syrupum
cum mellis & sacchari quantitate sufficienti.
Additur interdum acetum acerrimum, vel scil-
lites largius, parcius pro scopis variis, aromati-
zatur cinamomo & spica.

In aquæ libris octo coque primū radi-
ces nostrates, deinde semina, post her-
bas, postremò pyrethrū, & aromata. Co-
stum, asarum, cassiam, cardamomum, ca-
lamum aromaticum, phu, vbi libræ qua-
tuor supererunt, fiat, vt in cæteris, & cum

sacchari & mellis ana libra vna, & dimidia percoquatur, vt sit efficacius, quauis plurima multum amara recipiat, paucum melle & saccharo dulcoratur, persicaria astringentem & frigidam, quæ maculato est folio nonnulli miscent: ego autem acrem & non maculatam vsurpandam censeo, vt acria & menses mouentia sint omnia, nulla temperantia.

Syrup. cichorij ex Gulielmo Placentino, recipit cichorij manipulos duos.

Foliorum buglossi vtriusque, lactuce, cichorij hortensis, oxalidis, viola nigra, sereos triticaria ana manipulum vnum, rha barbari drachmas duas.

Herba trita coquantur in libr. duabus aqua ad partis tertia consumptionem, colentur. Adde expresso saccharo libras duas, clarificetur, & iterum coletur, reddatur igni: adde rha barbarum pulueratum panno lineo ligatum, & sepe confrica, donec Syrupus erit percoctus.

Syrup. cichorij alter ex Nicolao Florentino, recipit intybi sativi & erratici ana manipulos duos, cucurbitae, lichenis, lactuce syluestris, & satiuæ, fumariae, lupulorum, ana manipulum vnum, hordei integri, halicacabi ana uncias quatuor, glycyrrhizae, adianti albi & nigri, & vulgaris, asplenij, cassuthae, ana drachmas sex, radicum feniculi, apij, asparagi, ana uncias

uncias duas coque in aqua sufficiente, cola, cum saccharo clarificatum, & rursus colatum percoque in syrupum conficando in eius libris singulurha barbari drachmas quatuor, panno raro ligatas cum spica nardi scrupulis quatuor. Dantur uncia tres cum emissionem seminum quatuor frigidorum maiorum.

Hi duo syrupi hepatis obstructionibus, & intemperaturæ calidæ destinati, quia nominibus Barbaris, & nemini intellectis constant; pelagus opinionum pepererunt. Nam endiuvia sylvestris & domestica, taraxacon, batissosere, scariola, cichorium quid apud hos sit Barbaros nunquam possis ex ipsorum scriptis didicisse, tam sunt ea plena crassa ignorantia. Propterea mihi videtur satius, cum cichorij seu seridis genus omne eadem sit facultate, cichorium autem quod sylvestre est, stomacho utilius & efficacius sit, ut syrupus hic ex solo fiat cichorio, aut cichorij succo, sed largiore; ut sit simplicissimus, cui si ad pompam voles alias seridis species miscere, & lactucam sativam & agrestem, & sonchum utrunque, & hieracium utrunque, & chondrillam luteam, ac ceruleam, & si quid aliud tam sativum quam agreste lacteum est, ac cichorij generis, nihil repugno, modò tam non

sis anxius in harum vocum Barbaris cum re corruptarum inquisitione. Assuesce igitur vocibus Dioscoridis, nec te afflicta desiderio barbararū vocum, quæ quid significant ne ipsi quidem qui hos syropos scripserunt; nec ipsorum alius quisquam vnquam pernouit, aut certo definiuit.

Endiuiā (quod nomen ex intybo corruerunt) Barbaris est quæ lactuca syluestris Dioscoridis videtur. Thuscis autem vulgò endiuiā est intybus; seu seris, lato folio: scariola verò ex seride etiam deprauatum est, intybus est satius angustifolium.

Taraxacon, seu altaracon etiam Gatinariæ, aut cichorium est, aut dens leonis, seu cichorium erraticum, latifolium Plinio dictum: Batissoseris Hermolap. corruptum videtur ex baptisecula, quæ illi cyanus est, ruribus sic dicta, quòd seculam, id est, falcem messoriam remoretur: alij malunt baptissoserim esse serim, id est, cichorium quoddam erraticum, in tritico frequens, flore cyanum referente, quibus magis accedo.

SECTIO TERTIA DE

Eclegmatibus.

Lactuc.

Eclegmatum seu linctuum materiæ ferè sunt Mesuæ partes plantarum.

Radi

Radices, vt glycyrrhizæ, scillæ, iridis, bryoniæ, alij, ari, draconij, cannæ vstæ, quod spodium Arabibus dicitur.

Herbæ, hyssopus, prassium, adiantum album, calaminthe, brassica. Flos croci. Fructus, vñæ passæ, ficus passæ, dactyli, myxa, zizypha, capita papaueris albi.

Succi radicum, glycyrrhizæ, scillæ.

Succi herbarum, brassicæ, prassij, sceniculi, cannarū sacchari, id est, saccharum, & ex hoc penidia, mel.

Succi fructuum, mororum batinorū, nucum, myrtarum, pulpa cassiæ, sapa.

Gummi, tragacathi, arabicum, myrrha.

Semina papaueris albi, & inde syrupus, psyllij, cydoniorum, malux, melonū, cucumeris, citreoli, amygdalæ dulces, amaræ, strobili, auellanae, lactucæ, portulacæ, lini, scenigræci, sceniculi, anisi, nasturtij, amyllum, farina fabarum.

Cortices, cinamomum, & alij cortices, radicis capparis, tamaricis, ellebori, petroselini, &c. Præter hæc aqua cui multa horum infunduntur, incoquantur ve: & ex animalibus pulmo vulpis, butyrum.

Ex his radices & herbæ teruntur, si sint siccæ, vel aqua incoctæ, & tritæ, & cretæ aliis miscentur, spodium ducendo friatur.

Fructus purgati teruntur, cernuntur:

sed dactyli intus & foris purgati ante decocto thoracico aliquo macerantur; capita papaveris albi macerantur, coquantur, exprimuntur, abiciuntur.

Succi omnes serè hoc loco liquidi sunt, & ob id promptè miscentur, glycyrrhizæ autem succus, vel dissoluitur, vel in talcolas sectus, inter papyros ficcatus, aut aliter calfactus, scilicet aliquoties pistillo & mortario teritur.

Gummi teruntur calfactis pistillo & mortario, si est siccatione opus, vel in mucagine soluuntur.

Semina si maiora sint, depellata cultello inciduntur, ut amygdalæ, strobili, pistacia, auellânæ, fabæ, melonum, cucumeris, citreoli, si parua puluerantur, & si vis horum quædam ut papaveris post inciduntur. ex aliis etiam mucago extrahi, & reliquis misceri potest, ut ex semine lini, scæ-nigræci, cydoniorum, psyllij.

Huius verò tempestatis eclegmatum materiæ, magis sunt penidia, pillulæ albæ, bechicæ, electarium vel pulvis E. diatragacanthi frig. diairis simplicis, & Salomonis, diacalaminthes, diahyssopi, diaprasij, saccharum candefactū, succus glycyrrhizæ, cassia cum syr. adianti, glycyrrhizæ, zizyphorum, vel alio thoracico
magis

magis & minus calido, tergente, incidente, pro medici indicationibus. Quibus misceri possunt etiam alia simplicia prius dicta dulcia, amara, acris.

Tamen ex veterum eclegmatis hodie quidam retinent eclegma sanum, ex pulmone vulpis, diacodion, diamoron, diacaryon. De quibus quia est abundè nobis dictum sectione tertia Mesuæ, frustra hinc repetenda non fuerunt.

Sunt etiam qui compositum hoc medicamentum eclegma cassiæ pro enematis vocant, & sic parant: In libra vna decocti violarum, maluæ mercurialis, betæ, parietariæ, absinthij coquunt mellis libram dimidiam, & sub finem iniiciunt pulpæ cassiæ fistulæ purgatæ libram vnā.

SECTIO QUARTA.

Sectio quarta de apozematibus, & infusis est: quia tamen horum nullum hodie in usu est, satius fuerit si quem vendi cupiditas ceperit, Mesuen consulere. Quæ autem infusa & apozemata in rem præsentem hodie facimus, longè sunt ab illis diuersa, & tam paratu facilia, ut vel puero perspicua sint. Quapropter de his supersedere malui quàm parum necessaria, etiam intelligentibus inculcare, præfer

præsertim cùm statuerimus aliquândo dare typographis commētarium quendam nostrum de remediis medicis omnibus sumendis & admouendis: in quem multa congerimus exempla apozematum, & infusorum hac ætate consuetorum, quæ ad medicum magis quàm ad pharmacopœum pertinent.

SECTIO QUINTA.

SECTio quinta de antidotis, seu electariis, quorum materiæ ex omni medicamentorũ simplicium genere petuntur. Hæc formis quatuor præcipuè parantur, sicca seu puluere, melle excepta, vel saccharo, vel alio humore.

Quoniam verò puluis horum est materia reliquarum trium formarũ, de puluere prius mihi fasius dicendum, quoniam hic vario fit modo, vt mox audies.

Vt autẽ planius intelligas, pauca quædam capita ex trituræ ratione mihi sunt leuiter perstringenda, ne in compositionibus singulis hæc sint inculcanda.

Teruntur primũ radices acori, cyperei, costi, phu, gentianæ, glycyrrhizæ, mei, zingiberis, & similium, & interdum coquuntur, si electarium præsertim molle est futurum, sed antè leuiter fractæ.

His

His mediocriter tritis semina fœniculi, apij, petroselinij, anisi, dauci, ameos, felseleos, amomi, cardamomi, & similia adduntur.

Semina autē cucumeris, cucurbitę, melonis, citreoli, cnici, vt nuclei pinei, amygdalę inciduntur cūtellō per se, aut etiā saccharo pauco, ne pinguescant adiecto.

Postea herbę siccę, cassia, cinamomū, aspalathum, calamus odoratus, caryophylla, spica nardi, schœnuanthos.

Postremō flores rosarum, croci, epithymi, forficibus antē confecti.

Vuę, dactyli, & similes fructus, vel per se triti cernuntur impulsu manuum, aut cochlearis, vt cassia, thamar indi: vel secti cum siccioribus teruntur.

Bdellium, opopanax, ammoniacum, opium, myrrha, vino, melle, vel alio humore soluuntur, vel parua portione cum aliis siccioribus multis teruntur minutim prius secta, sic os cordis cerui, rasura eboris. Turbith modicē quassatum vbi erit in diaphœnico, electario Indo vtroque, & similibus, tunc sicciora misceantur zingiber, piper, & similia, vt puluerati possit. Nam per se latefcit, non pulueratur, si sit legitimum. Quę industria scammonio, opiō, & liquoribus, gummis, resinis

his terendo lateſcentibus confert: vel piſtillo & mortario calfactis illa ſiccare: ſed id multum virium à medicamento digerit.

Terèda præterea tenuiſſimè calida cùm vrinas mouere ſtudemus, vt thymū, aſarum, cuminum, vt in aurea, athanaſia, eſdra, hēmagogo, diacurcuma, dialacca maioribus E. aromatico: craſſius verò quum purgare ſtudemus, vt in antidoto hamech vtraque in electario Indo maiore.

Per ſe teruntur rha barbarum, ſcammonium, niſi quòd oleum amygdalarum dulcium vtrique à quibuſdam miſcetur: & poſtrema miſcentur ac è propinquo, & clementer ne euolent, aut exhalent. Seorſum quoque thus maſculum, myrrha, maſtiche, ſuccinum, gummi Arabicum, tragacantha, moſchus, caphura, ambra: ſed hæc tria ferè cum pauca aqua roſarum, & poſtrema miſcentur etiam è propinquo, qua ratione rha barbarum, & ſcammonium. Priora autem minutim ſecta mortarium ſiccius poſtulant, vt euphorbium, ſtyrax calamites, ſal gemma, ſericum, anacardi etiam per ſe terantur.

Vniones, corallium vtrunque, lapidum pretioſorum fragmēta in mortario lapideo vel æreo primū craſſius teruntur, poſtea

postea super marmor porphyrium, vel alium lapidem durissimum ducentur, friatur, affusa identidem pauca aqua rosarum, aut buglossi.

Lemnia terra, ut bolus armenia per se est friabilis, & humore aliquo soluta, mox liquefcit modo calcis.

Multa alia huc pertinentia ex modo componendi theriacem scripto nobis libro quarto methodi medicamenta componendi possunt huc transferri, quale est illud quod mortarium in quo prædicta omnia teruntur, & cætera alia præsertim preciosiora, est tegendum etiam duobus operculis, ne quod est tenuissimū exhalet, ac euolet, eadem ratione quod iam est cretum curiosè inuoluatur. Si electariis succi, vel humida alia ascribuntur, tollenda sunt, si hæc sicca & puluere seruaturus es pyxidibus vitreis, ut ferè hodie fit: si verò electarium formare libet molle, sunt vsui quæ forma veteribus magis placuit. nam quæ hodie est electarij sicci, & solidi forma, minus est vsu frequens, nisi ad palati gratiam.

Si etiã dactylos, vuas, ficus recipit medicamentum, tollantur, si puluerē vis, nisi pauca cū magna siceorū copia puluerari posse videantur. si autē electarium molle

conaris, purgentur, secētur, terantur, cernantur, & aliis misceantur.

Si pulvis ante electarii solidi compositionem amygdalas, strōbilos, semina frigida maiora, & similia recipit, hæc vendendi, & electarium parandi tempore misceatur: quia diebus paucis rancida fiunt, & compositum vitiant.

Pulveris vnc. vna, vel etiā drach. sex vni libræ sacchari ferè miscentur in electario solido: sunt qui parcius iniiciunt, non ut crassius sit electariū, sed ut ipsis cōstet minoris, præsertim cum præciosa recipit, ut electariū de gemmis, diambra, exhilarās.

Pulveris verò vnc. 3. ferè traduntur libræ vni mellis despumati: sic tamē ut saccharum, penidia, dactyli, amygdalæ, strōbili, & similia pulveris appellatione tunc non veniant. Mel tamen crudum quadruplum omnium puluerum miscet. Mesues in antidoto diamoschi.

Cum verò pulveres miscentur, sit mel tepidum adeò, ut digitos admittat mel ipsum, vel fundum sartaginis quæ mortario, vel alterius manibus firmata sit oportet, quando pulveres pistillo ligneo sunt commiscendi. Id quod etiam seruandum est, si electariū solidum es factururus, quod primū in cistas mazæ modo cogūt, dein-

de manibus & pistillo ligneo super papyrum puram complanāt in flaminicæ placentæ figuram, mox cultello secant in bucellas, & tessellas, nunc rhomboides, nunc quadratas, nunc triangulas (quas lozengas vocant) nunc longiores digitorū formas, quas ob id manus Christi vulgus vocat. Quibus præterea pondus circumscribunt, ut drach. vnius vel plurium.

Porro in antidotis mollibus, ut catholico, diaprino, antidoto hamech, cū cassia & thamar Indi cum humore aliquo soluta cernūtur, thamar Indi antè per horam sunt macerandi quàm cernātur, vtraque verò antequā solvatur, humor est pendendus, ut intelligas an cum eo pondus iustum thamar Indorū & cassiæ postquā creuisti, retinueris. Eodem modo in manna & aliis eiusdem generis, quod etiam in pilulis seruandum audies, dum lachrymas humore solutas cernes, aut colabis.

Antidotus diambra Mes. recipit cinamomi, dromici, caryophyllorū, macis, nucis moschatæ, folij, galagæ ana drach. tres, spicæ nardi, cardamomi maioris, & minoris, ana drach. vnā, Zingiberis drach. vnā, & semissem, santali flauī, ligni aloes, piperis longi ana drach. duas, ambre aureum vnum, moschi drach. dimidiū.

Ans. de gemmis Mes. recipit fragmentorum

saphyri, hyacinthi, sardis, granatorum, smaragdina drach. vna & semissem, Zedoarie, doronici, maci, corticis citri, sem. ocymi caryophyllati, ana drach. duas, corallij rubri, succini, limaturæ eboris ana script. duo. been albi & rubri, caryophyllorum, Zingiberis, piperis longi, spice, folij, croci, cardamomi minoris ana drach. vnam, trochiscorum diarhodon, ligni aloes, ana drach. quinque, cinamomi, galangæ, Zurumbet ana drach. vnam & semissem, foliorum argenti & auri ana aureum dimidium, moschi boni drach. semissem, ambræ drach. duas.

Ambra, moschus per se terantur, corallium & pretiosi lapides, aut per se singuli, aut omnes simul quo dixi modo. cætera simul terenda, sed ordine seruato.

Ant. ex hilarans Galeno ascripta, recipit apud Nicolaum, succi pomorum dulcium & odoriferorum, succi cydoniorum, succi florum borraginis, * florum basilici.

* semi-
nis alij.

Vini veteris.

Croci, maci, Zedoariæ.

Xylobalsami, caryophyllorū. ana drach.

Corticis citri, galangæ. quinque.

Nuci, moschate, styracis calamitæ.

Caphura, ambra, moschi ana drach. vnam, anisi, thymii, epithymii, rasura eboris ana drach. duas, margaritarum, ossis à corde cerui ana drach.

drach. vnam, auri & argenti puri ana scrip. vnum, sacchari quantum sufficit.

Antidotum hanc non esse Galeni planè conuincunt macis, zedoaria, caryophylla, galanga, moschocarion, caphura, ambra, moschus, simplicia Galeno ignorata: & ebur, margaritæ, os à corde cerui, aurum, argentum, saccharum, sumi nondum cœpta Galeni seculo, aut saltem infrequentia. Saccharum cum succis coquendum, cui percocto & refrigerato pulueres miscendi sunt.

Sacch. lib. 7. in aqua dissolutæ & coctæ, additis ad postremum his succis coquantur quantum satis est ad comprehendendas vncias circiter septem huius pulueris. Electarium lætificans Nicolai Alexandrini ab hoc est diuersissimum.

Hi pulueres tres antidotorum præcipue nobis sunt in usu, quamuis Mes. & Nicolao humore aliquo excipiantur in electarium molle, vt nobis tempore vtēdi in electarium solidum saccharo per humorem idoneum, sed paucum soluto percocto, vt pulueris vnc. vna habeat sacch. vnc. 12. vel pul. horum iuribus & condimentis miscetur. Præter hos autem alij, quia usu rari à nobis consulto prætermittuntur, præsertim ea fusius in Mesue & Nicolao

interpretatis , vnde poterit pharmacopœus corrogare, si quando parare impetretur. Tales sunt antidotus diacalaminthæ, diatrion pipereon, diospoliticū, diathyssopum, diasennæ, diacoston, diairis Salomonis, diapenidion, diacomeron, diatragacanthum calidum, diamargariton calidum, alia eius generis permulta.

Nunc de antidotis dicendum quæ ob id opiatæ vocantur, quòd harum multæ opium recipiunt, quibus aliæ cōsistentia similes nomen idem vulgo sunt sortitæ.

Antidotū catholicum Nicolai, Galeno ascriptum, recipit folliculorum sennæ, cassia fistulæ purgatæ, thamar Indorum ana vnc. octo, rha barbari, violarum, polypodij, anisi ana vnc. quatuor, glycyrrhizæ rasæ, penidiorū, sacchari candefacti ana drachi. quatuor, seminum quatuor frigidorum, purgatorum ana vnc. vnam. Polypodij alterius lib. vnam, tritam, in aqua coque diu, colatū percoque in Syrupum cum libris octo sacchari. Cassiam & thamar Indos in colati parte dissolue, cola, syrupo iam percocto adde, postremò pulueres adice.

Senna, polypodium, glycyrrhiza, anisum, violæ simul terantur, rha barbarum per se, semina 4. frigida maiora excorticata scalpello minutim concidantur cum saccharo & penidiis, ne pinguescant.

Cassia

Cassia & si recentes sunt thamar Indi per se cernantur potius, quàm cum decocti portione solvantur, ne sint ad accepti humoris consumptionem coquenda.

Si verò thamar Indi decocto solvuntur & cernuntur, id pendendum, ut intelligas si cretorum thamar Indorum pondus quesitum habes.

Vbi ex decocto polypodij syrupus erit percoctus, & ab igne depositus, iam modicè refrigerit, cassia & thamar Indi creta parte syrupi dissolvantur, mox syrupo misceantur, postea pulvis prædictorum, postremo rha barbarum & concisa semina paulatim addantur pistillo ligneo probè permiscendo. Si verò cassiam & thamar Indos decocti portione, ut vnc. duabus solueris & colaris, probè percocto ipsi syrupo misceantur, ut coctione acceptum humorem deponant. Hodie sunt qui delicatius, & efficacius componunt, sed sumptuosius: sennæ enim vnc. sexdecim in libris quatuor, rha barbari vnc. octo, in libra dimidia decoctis radicis polypodij infundunt, sennæ expressum cum sacch. coquunt in electarij propè consistentiam. expressum rha barbari miscent paulatim extra ignē, deinde cassiam thamar Indos creta & pulveres.

Diaprunum simplex Nicolai recipit pruna

Diada Damascena matura centū. *Hæc aqua* ad dissolu-
tionem percocta ubi modicè refrixerunt, ex-
no dici- empta inde & manibus confricata, per cribrum
tur Ni cernuntur, cortices & ossa abijciuntur. *Aqua*
colao hæc cum dimidia vncia violarum, recocta* cum
Alexā sacchari librū duabus in syrupum percoquitur;
drino, addendo pulpæ prunorum prædictæ libram v-
& viri nam. *Hæc* ubi coquendo crassescere incipient,
dia Da cassia recenter extracta, ihamar Indorum ana
masce- vncia vna in portione parua prædictæ aquæ
na eli- dissoluatur, coletur, admisceatur semper spathu-
git. la mouendo, dum perfecte omnia hæc erunt co-
** & co* cta, aufer igni & adde spathula semper miscen-
lata. do puluerem sequentem, santali albi & rubri,

spodij, rha barbari ana drac. tres rosarum, vio-
 larum, seminis portulacæ, intybi, oxyacanthæ,
 succi glycyrrhiZæ, tragacanthi ana drac. duas:

Nicol. quatuor seminum frigidorum maiorum purga-
Alex. torum ana drach. vnā. Si verè purgatorium
scāmo- vis medicamentum ab igne ubi abstuleris, adde
nij dra. scammonij præparati vnc. dimidiam in libras
 7. in li. singulas.

singu- Sunt qui scammonij drach. sex, alij vn-
las mi- ciam vnā miscent libris singulis, sicque
scet. nescientibus medicis imponūt. fit enim
 ut medicamētum valentius purget, quod
 tamen clementius existimabat medicus
 instituisse.

Ant. diaphanicon Mes. recipit phanicon
 elithon,

cirrhon, id est, dactylorum fulvorum aceto per triduum maceratorum partes centum, penidiorum cum aqua hordei coctorum partes quadraginta, turbiti partes triginta quinque, amygdalarum purgatarum partes triginta, scammonij partes duodecim, Zingiberis, piperis longi, cinamomi, macis, galange, ligni aloes, foliorum ruta siccorum, anisi, fœniculi, dauci, ana partes duas & semissem. Probe trita hac omnia melle despumato excipiantur. Lib. tri-
bus.

Dactyli intus & foris purgati quo sunt sicciores, eo diutius & largiore aceto sunt macerandi, quo recentiores & humidiores, minus diu & parciore aceto macerentur. Quin si præhumidi sunt, citra macerationem teri possunt, aceto pauco interim affuso. serè autem nobis sunt passi, purgati igitur, & particulatim secti aceto parciore sine igni macerentur triduo in vase siliceo, vel vitrato recto, pistillo ligneo in mortario lapideo curiose terantur, manu cernantur per cribrum setaceum, vel stamen, vel reliquæ pelliculæ eximantur. Potes cum his amygdalas depellatas terere & cernere, aut cultello minutim concidere, vñ & nucleos pineos (quos nonnulli penidiorum loco adhibent) sed cum pulpa dactylorum ad acetum

consumptionem sit parum coquenda amygdalæ pinguescerent, ob id melius inciduntur & cum pulvere reliquo miscentur. Mellis lib. sex aqua dupla despumata

* *sunt* dum aqua consumpta ad libras tres * *re-*
enim *dierint*, & cydoniati liquidi cōsistentiam
pulue- habeant dactylos misce, parum diu co-
ris vn- que, vt acetum exhalet. Quidam saccha-
cie no- ro excipiunt in electarium solidum, vt &
uem si diacnicum, bene tamen coquatur, & loco
drach. sicciore reponatur, ne rancidum fiat. Ni-
partem colai Alexādrini diaphœnicon carniū
accipis. dactylorum drach. centum recipit, cæte-
 ra multum ab hoc diuersum est.

Ant. hamech apud Xtesuen, recipit myro-
 balanorum flauarum vnc. quatuor, cepularum;
 Indarum, rha barbari ana drachmas duas,
 agarici, colocynthidos, polypody querni ana
 drach. sexdecim, absinthij, thymi, feniculi ana vn-
 ciam vnā, violarum drach. quindecim, epithy-
 mi vnc. duas, anisi, rosarum, fœniculi ana drac.
 sex, succi fumarie lib. vnā, pruna numero se-
 xaginta, ruarum purgatarum vnc. sex. mace-
 ra omnia sero lactis dies quinque in vase vi-
 treato, oris angusti, obturati. Post hos semel ser-
 uesac, cola, in colato dissolue cassia fistule pur-
 gata vnc. quatuor, thamar Indorum vnc. quin-
 que, manna vnc. duas, frica manibus, iterum
 cola, colato adde sacchari lib. vnā & dimi-
 diam,

diam scammonij vnc. vnam & dimidiam, coque ad mellis crassitudinem, tunc paulatim puluerem hunc insperge. Myrobolanorum flauarum, cepularum, Indarum ana vnc. dimidiam, bellericarum, emblicarum, rha barbari, seminis fumarie ana drach. tres, seminis anisi, spica nardi, ana drach. duas.

Polypodium, senna, myrobalani, anisum crassiusculè teratur, agaricus raptim minuatur: colocynthis, rosæ, thymus, epithymus, absinthiū, minutè forcibus incidantur, rha barbarum cultello, vel forcipe in taleolas: pruna, vuæ intus purgentur: violæ integræ, agaricus, rha barbarū, colocynthis cum cæteris, quinque dies macerentur succo fumarie, residentia, & insolatu etiam post vnā. feruesfactionem purgato, & sero lactis colato quantū omnia tegat, vt libris tribus, sed agaricum, & colocynthidem nodulo ligare præstiterit. Sexto die id totum leuiter coquatur, coletur mediocriter exprimendo. (Fortis enim expressio ex materia illa macerando & coquendo velut putrefacta terreum quoque extrahet.) Colati portione idonea dissolutam cassiam & thamar Indos, alia portiuncula mannam cocto ex reliqua colati parte syrupo, cū sacchari lib. vna & dimidia misce, minimum coque:

his enim coctio longior, aut vehementior vires adimit. quapropter ne omnino coquantur, quidam sine humore purgatam cassiam, & thamar Indos percocto & repenti syrupo miscent, quo scilicet tempore adduntur pulueres aliorum & scammonium coctum. Serum sit lactis caprini recens mulcti, & in rem præsentem coagulati immisso semine cardui beatę Marię contracto. Eius seri lib. sex semel feruefiant, albuminibus duobus purgētur: ubi refrixerint, colentur: aut si celerandum est, ter colabis etiam calidum. Caprę autem nigrę, & excornis serum hic quidam expetunt, vt lac practici ad calculum frangendum.

Ant. benedieta Nicolai recipit turbith electi, sacchari ana drachm. decem, scammonij cocti, hermodactylorum, rosarum ana drachm. quinque, caryophyllorum, spica nardi, Zingiberis, croci, saxifragię, macropiperis, amomi, cardamomi, seminis apij, salis gemmę, galangę, macis, cari, fœniculi, sem. asparagi, rusci, lithospermi ana drach. vnam, mellis quantum sufficit.

Turbith, scammonium, hermodactylos trita negligentius, vt purgent magis: reliqua tenuius, vt in corpus magis ferantur, ex tritura disciplina rectę quidam volunt.

volunt. Turbith, esulæ, sacchari ana drach. decem, scammonij, drach. quinque, quædam exemplaria habent, cum esula in Nicolaò Alexandrino taceatur. in eodem scribitur turbith saccharique ana drach. viginti, scammonij drach. decem, sed reliquorum omnium ana drach. duæ, quæ pondera omnia dimidio diminuit Nicolaus Salernitanus. sunt qui etiam scammonij drach. duas, alij drach. duas & semissem miscent.

Hierapicra, id est, sacra amara Galeni, recipit cinamomi, mastiches, asari, spice nardi, xylobalsami, croci ana drach. sex, aloes drach. centum, mellis quantum sufficit.

Sic Galenus Romæ componi solitam suo tempore scribit: & aloën, nunc lotam, nunc illotam, nunc largiorem, nunc parciorem miscendam pro variis medicorum scopis: & croci sufficere drachm. quinque. Plura de hac antidoto leges in Mesue.

Ant. hiera diacolocynthidos Pactij recipit. Scribo-
stæchados, *marrubij*, *chamedryos*, *agarici*, *colocynthidos* ana drach. decem, *opopanacis*, *sagapeni*, *gum.*
petroselini, *aristolochiæ rotundæ*, *piperis albi* ana drach. quinque, *cinamomi*, *spice nardi*, *myrrhæ*, *polij*, *croci*, ana drach. quatuor. *Opopanax*,
 & *sagapenum* mortario terantur adiecto melle.

tenuis

tenui, id est quàm liquidissimo: trita cætera & cribrata melle ad comprehendendum sufficienti excipiantur.

Quæ ad hanc hieram hodie celebrari ceptam magno mortalium commodo pertinent, fusissimè in Mesue docuimus. Si puluerem & siccam hierã cupis, liquores fractos purgatos aliis particularim iniectos, cum his puluerantur. Si autem vis electarium molle, liquidissimo melle dissoluti colantur.

Ant. Philonis recipit piperis albi, hyoscyami albi ana drach. viginti, opij drach. decem, croci drachm. quinque, spicæ, pyrethri, castorij ana drachmam vnã, mellis despumati quadruplo omnium excipe. Addunt aliqui moschi scriptulum vnum.

De philonio Romano & Persico lege Mesuen, mihi satis est hæc veterũ descriptio. In hac antidoto pulueris vnciæ tres, mellis lib. singulis miscentur, vt in aliis plurimis, à Philone Iudæo philosopho Platonico doctissimo, vt scribit Nicolaus Alexandrinus dicta.

Ant. de baccis lauri Rasi recipit foliorum ruti siccorum drach. decem, seminis ameos, cumini, melanthij, ligustici, origani, cari, dauci, amygdalarum amararum, piperis nigri & longi, menta

mentastri. acori, baccarum lauri, castorij ana
drachm. duas, opopanacis drachm. tres, sagapeni
drachm. quatuor, mellis cocti pondus omnium,
tritit terendis fac electarium molle.

Hoc electarium pilularum consisten- Dia-
cartha
mi.
tiam habebit ex tam paucio melle, nisi sa-
gapenum & opopanax alio melle liqui-
dissimo dissoluantur & colétur, vt in hie-
ra diacolocynthidos. Hodie mel pulveri-
bus quadruplū miscet, sed puluerum
nomine opopanacem & sagapenum nō
censet, sic est gratius, sed imbecillius.

E. diacnicum Arnaldi villanovani recipit
pul. *E. diatragacanthi frigidi vnc. semissem, car-*
nium cydoniorum vnc. vnam, medulla cnici, her-
modactylorum ana drach. quatuor, Zingiberis
albi drachmas duas, scammonij cocti drach-
mas tres, turbith albi drachm. sex, manna gra-
nata drach. duas, mellis rosati colati vnc. vna,
sacchari vnc. octo. cum saccharo sufficienti fiat
electarium.

Caro cydoniorū siue cydonia in par-
tes 4. plures, pauciores diuisa, & vt sunt
integra saccharo condita terantur, & per
stamē colentur. cuius loco si cum nostra-
tibus cydoniatum capias in drach. eius
duabus, vna erit sacchari, aut mellis drac.
vel etiam largius. Tunc verò id vt manna
melle

melle rosato soluta colatur per stamē, semen cnici excorticatum, vel inciditur, vel cum saccharo teritur, & pulueri turbith, hermodactylorum & zingib. simul tritorum miscetur, scammoniū verò per se. Vbi saccharum paulò vltiā quā electario conuenit est coctum, (quia liquida mox addenda ipsum vt sic dicam recrudabunt) adde cydonium, mannam, mel rosatum simul trita & colata. Sunt qui pul. diatragacanthi omittunt, & cydoniatum cum melle subactum immittunt in sacchari lib. vnā percoctam cū aque vnciis 4. vel sex, si impurius est saccharū, & ob id despumandum, postea pulueres reliquos. Alij aliter.

Elec. de succo rosarum. Nicolai recipit sacchari, succi rosarum rubrarum perfectarum ana lib. vnā, vncias quatuor: santalorum alborum & rubrorum & citreorum, ana drachmas sex, spodij drachm. tres, scammonij cocti drach. duodecim, caphurę script. vnum, ad excipendum. succus cum saccharo in syrupum percoquatur.

Cui misce santala & spodium puluerata, postremò scammonium & caphuram, vtrunque per se tritum.

Cum Mesuæ sit solenne vnciis singulis

lis compositionem scammoniata: ū dare scammonij cocti circiter scriptulum ynū; hic Nicolaus dat propemodum scriptula duo, ob id rectē quibusdam videntur scāmonij drach. octo, huic composita sufficeretamen etiam drach. duodecim scribit Nicolaus Alexandrinus cap. 309. lib. de compositione medicamentorum secundum locos, ex quo Nicolaus Salernitanus & alter Nicolaus præpositus sua descripserunt. Succo pauciori commodius fieret. Alij etiam componunt E. rosatum cholagogum Mesuæ.

E. diarhodon abbat is Nicolai recipit, santali, albi & rubri ana drachmas duas & semissem: tragacanthi, gummi arabici, spody ana scriptula duo: asari, mastiches, spice nardi, cardamomi, succi glycyrrhizæ, croci, xyloaloes, caryophyllorum, galliæ moschata, anisi, marathri, cinamomi, rha barbari, seminis basilici, oxyacanthes, cichori, portulacæ, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, ana scriptulum vnum: margaritarum, ossis à corde cerni ana scriptulum dimidium: sacchari candefacti, rosarum ana vnciam vnā, drach. tres, capbura grana septem, moschi grana tria & dimidium, confice cum syrupo facto ex aqua rosarum.

Puluis huius vt aliorum vitrea pyxide
oper

operculata seruaturs, & vtendi tempore excipitur syrupo rosato percocto. Vel sacchari delecti lib. vna dissoluitur, lib. dimidia aquæ ex rosis albis recentibus destillatæ, vel rosarum siccarum decocti, vel succi rosarū rubrarum recentium, & coquitur ad iustam crassitiem.

Vbi refrigerando iam multum concreuit, pulueris prædicti drach. sex iniiciuntur, raro plures: & curiosè pistillo ligneo, vt prædixi, miscentur: semina quia citò rancescunt & cætera corrumpunt, misce tantum vtendi tempore. Moschum ple-risq; abominabilem, & cephalalgicum, ne misce, vti neque caphuram, nisi doctus est medicus qui imperet.

E. aromaticum rosatum Gabrielus apud Me suem recipit rosarum rub. drachm. quatuordecim, glycyrrhizæ rase drachmas septem, ligni aloes, santali flauiana drachm. tres, cinamomi drachmas quinque, macis, caryophyllorum ana drachm. duas & semissem: gummi Arabici, tragacanthi ana drachmas duas, & partes duas drachmæ vnius: nucus moschata, cardamomi maioris, galangæ ana drach. vnâ: spicæ nardi, ambre cineritiæ ana script. duo: moschi scriptulum vnum, syrupi rosati quantum sufficit.

E. diamargariton frigidum recipit santalo.

rum omnium, florum violarum, seminis melo-
 num excorticati, trachiscorum diarbodon ana
 drach. duas: serici crudi, ossis à corde cerui, spo-
 dy, doronici Romani, been albi & rubri, spice
 nardi, croci ana scriptula duo, margaritarum
 integrarum & pertusarum, rasuræ eboris, sa-
 phyrorum, hyacinthorum, smaragdorum, ia-
 spidum viridum, ligni aloes, seminis intybi &
 oxalidis, ambre cineritie ana drach. semissem,
 auri optimi drach. vnam, caphura scriptulum
 vnum, moschi grana duo.

Aliter Nicolao, aliter aliis, sed hoc no-
 bis est in usu frequentiore.

E. diatrion santalon Nicolai recipit, santali
 albi rubri, flavi, rosarum, psyllij ana solidos
 duos, rha barbari, spody, succi glycyrrhiæ, se-
 minis portulacæ, ana solidum vnum & dimi-
 dium, amyli, gummi Arabici, tragacanthi, se-
 minis melonis, citreoli, cucumeris, cucurbitæ, ci-
 choryj domestici ana solidum vnum, caphura
 scriptulum vnum & dimidium, syrupi rosati
 quantum sufficit, alij pondus rosarum quadru-
 plum miscent.

Dimidium est descriptionis Nicolai
 Alexandrini, nisi quod saccharum habet
 pro psyllio, & cicho rij domestici non me-
 minit. loco syrupi, fit cū saccharo in aqua

communi aut rosata soluto.

E. Diatragacanthon frigidum Nicolai recipit, tragacanthi albi vnc. duas, gummi arabici vnc. vnam, drachmas duas; amyli vnc. vnam, penidiorum vncias tres, glycyrrhizæ, seminum melonis, cucurbitæ, cucumeris, citreoli ana drachmas duas, capsuræ scriptuli semissem, syrupi violati, aut iulepi violati quantum sufficit.

Saccharo aqua communi, vel rosata soluto excipitur hodie.

E. Diarru simplex Mesue recipit radicis iridis vnc semissem, sacchari candefacti, E. diatragacanthi frigidi ana drachmas duas.

Saccharum aliud aqua rosarum soluitur ad hæc comprehendenda, libræ autē vni sacchari vnciam pulueris vnam capienti dum refrigeratur, si albumen ouis vnus, vel potius succi limonū vnc. duas, fortiter & diu misceas, vtrunque hoc electarium euadet longè albissimū. Sacchari vnc. vna, aqua rosarum soluta, cū margaritarum pul. tenuissimi drach. vna, sic manus Christi perlata vulgo dicta.

SECTIO SEXTA

de Pilulis.

MEDICAMENTVM cur forma pillularum fingatur interdum, abunde diximus in Mesue, initio sectionis sextæ:
hoc

hoc autem loco dicēda sunt quæ ad modum pilulas seu potius pilularum offas & magdalias componendi pertinent. Ut electaria humore aliquo egebant comprehendendi, præsertim mollia, sic & pilulæ, & trochisci. Is autem est magna parte mel despumatum vel rosatū, syrupus rosatus vel similis, interdum mucago tragacanthi, ita ut omnino sit glutinosum, quod pilulas debet comprehendere, ut melius velut in mazam misceatur, & mista cohereant, ac ne simplicium facultas promptè exhalet, si offa siccitate interhiet, sed intus probè conclusa melius fermentetur. Ob eam causam quas pilularum species aqua, aut succo vult comprehendere Mesues aut Nicolaus, hodie nos excipimus melle, in quo succus hic ad sui consumptionem sit percoctus. Quod succo comprehensæ non cohærent, sed hordeacei aut furfuracei panis modo promptè friantur, mox siccantur, & canescunt situmq; ducunt putredinis indicem & autorem. Ob eam rem videtur Nicolaus pilulas sine quibus fœniculi succo exceptas manibus oleo rosato, aut communi inunctis formare, & pos alutam, aut pergamenam offæ inuolvendę debitam oleo quoque oblinimus. Si tamen in usum præsentem fiant pi-

lulæ, possunt succo excipi, quod in multis videtur scriptores innuisse, dum ciceris scilicet orobei, aut orobi, aut piperis magnitudine pilulas formandas imperant. Est tamen quando succi emplasticam efficiunt materiam, quando scilicet his emplastica alia solvuntur, vt aloë, scammonium, sagapenum, ammoniacū, gummi arabicum, tragacantha. Tunc etiam pilularum massam rectè comprehenderint. Omnia in pilulis crassius terenda quàm in electariis, nisi quod utrobique lapides pretiosi, & congeneria tenuissime sunt pulueranda, & colocynthis, ne partes quas permeat viceret.

Quæ verò lachrymæ, siue liquores sint, siue gummi, siue resinæ, si sunt adhuc molliculæ, pistillo calido, in mortario calido terentur & puluerabuntur, aut humore idoneo dissoluentur, vt alia capiāt. De succis recentibus iam diximus, de siccatīs seu sapis idem iudiciū quod de lachrymis: interdum tamen prædictæ lachrymæ, si puræ sunt, pistillo calido in mortario calido, humore paucō superdato subiguntur, fiuntque idoneæ pulueribus alijs comprehendendis, vt in pilulis foetidis, sagapeni & similibus. Si autem sint impuræ, dissoluantur humore quæsito,

fito, colantur, coquuntur ad humoris consumptionem, pulueres tunc adduntur, & permiscuntur.

Magdalia, seu ossa, seu massa inuoluitur, vbi siccata est quantum satis est, aluta alba, potius quàm rubra, vt vires illas infectricum materiarum pillulæ in se non trahant, aut pergamenæ, sed vtraq; oleo rosato, aut communi est antè subigendâ, vt massam, diu mollem seruet, & transpirare vires eius prohibeat, obstructis oleo emplastico poris: non tamen ita quin humiditas, si qua adhuc superest excrementosa digeratur. In vsum autem non veniât pillulæ si potes, nisi iam fermentatæ, non tamen verustatè exuccæ, & exanimatæ: sed nec ita molles, vt in ore disfluant, sed cōsistentia mediocri fiant, aut plures, pauciores, maiores, minores pro eius qui sumit natura, & aliis medici scopis. Si autem deuorare nequit, minimæ fiant, & syrupo aliquo inuolutæ cochleari aliquo simul deuorentur. Alij ne ingrati earum saporem percipiant, syrupo remollitas saccharo tegūt, alij foliis auri æquius quàm nōnulli membrana prunorū, aut vuarū, aut cerato liquido. Nam carne prunorum, aut pomorum coctorum inuolui nō magis prohibeo, quàm panem missali

in vinum inersio. Os quoque ante & post
ablui potest vino, aqua, alio, vt lingua
hoc imbuta saporem retum non sentiat
& si quid ei hæserit, tergeatur. potest etiã
vini loco pomi buccellam mandere &
succum deglutire, aut aliud aliquid iu-
cundũ præsertim astringens. Sunt quoq;
quos vino vel alio implent, & pilulam
ori immittunt cum vino illo deuorandũ,
idque toties repetunt, donec omnes de-
norarint, quod ad celeriozem pilularum
actionem facit, non ad diuturniorem, &
ventriculum lædi pilularum præsertim
durarum contactu vetat, & quibus friget
ventriculus confert, vt quibus is aut he-
par insigniter calet, cum pituitana, vel hu-
more alio deuorari possunt, manus etiã
ligare, & eas ac nares aceto, aut frigida,
aut oxycrato madefacere est vtile. Quæ
præcepta sunt communia etiam his qui
medicamenta alia quavis forma sumpte-
runt, quando vomitus eorum timetur. Et
præter hæc alia multa doctè à Mesue de-
scripta libro primo.

*Pilula aurea Nicolai recipiunt aloes, scam-
mony colli ana drach. quinque, rosarum, semi-
nis apij ana drachm as duas & semissem, anisi,
fœniculi, mastiches ana drachm. vnã & se-
missim, croci, pulv. colocynthidos ana drach-*

nam unam, cum aqua infusionis tragacanthi fac massam.

Tragacanthi drachma una, aquæ viciis duabus maceretur ad dissolutionem. super cineres calidos coletur panno raro: hac mucagine paulatim affusa comprehendere pulveres. hodie tamen syrupo vel melle rosato comprehendunt ommissa tragacantha, neque mea sententia infœliciter, aloë, scammonium, colocynthis, mastiche seorsum, quo sæpe dixi modo terentur: simul autem semina, rosæ, crocus, ambo hæc prius minutim concisa dimidium est compositionis Nicolai Alexandrini, in quo etiam mastiche non scribitur.

Pillula coccia Rasii & Mesue recipiunt, pulveris hieræ picræ Galeni drach. decem, colocynthidis drachm. tres, & scriptulum unum scammonij drach. duas & semissem, turbith. stœchas ana drach. quinque.

Syrupo vel melle rosato excipe, turbith & stœchas simul teruntur, cernantur. Nam, stœchas ægrè teritur, licet florulenta sit, nisi inter papyros siccetur antè, quomodo etiam vis eius facilè exhalat.

Alij ex Nicolao Galeni coccia sic parant, aloes li. aloes, absinthij, colocynthidos, scammonij ana i. c. pib. partem unam, mastiches partem dimidiam, p.

cum succo fœniculi, vel absinthij, vel solani, forma massam.

Nicolaus Alexandrinus Galeni non meminit, & vocat pillulas diacolocynthidos, hisque miscet aloës, scammonij cocti ana drachmas quatuor, colocynthidos, mastiches ana drachmas duas, bdellij drachmam vnam cum succo absinthij fac orobea cataportia.

Pillulæ sine quibus esse nolo apud Nicolaum recipiunt, aloës lotæ drachmas quatuordecim, myrobalanorum, flauarum, cepularum, bellericarum, emblicarum, Indarum, rha barbari, mastiches, absinthij, rosarum, violarum, senna, agarici, cassutha, ana drachmam vnam. Temperentur scammonij bene triti & puluerati drach. sex & dimidia, succo fœniculi, quantus scammonio per pannum colando, & pulueribus aliis ad pillulas comprehendendas sufficere videbitur, quæ manibus vnctis oleo violato vel communi, sed arte dicta luto formentur.

Senna, myrobalani, absinthium, rosæ, violæ, cassutha simul: rha barbarum, aloë, scammoniū mastiche per se puluerentur, licet autem succo fœniculi purgato parua coctione & residentia, in quo dissolutum sit scammonium comprehendi possint, tamen ferè scammonium per se tritum & cretum aliis pulueribus miscet, omnesque

nésque simul mistos excipiunt melle, cum quo succus fœniculi coquendo sit consumptus:.

Pillule rha barbari Mesue; recipiunt rha barbari drachmas tres, succi glycyrrhizæ, succi absinthij, mastiches ana drachmam vnā, myrobalanorum flauarum drachmas duas & semissem, seminis apij, fœniculi ana drachmam semissem, trochiscorum diarbodon drachmas tres & semissem, hieræ picræ drachmas decem, forma cum aqua fœniculi.

Succus fœniculi, hîc vt in aliis cū melle coquendo est consumendus, myrobalani, succi concisi simul terenda, rha barbarum, mastiche, trochisci per se.

Pillule aromatica Mesue recipiunt cinamomi, cubebæ, ligni aloës, calami aromatici, maci, nucis moschatæ, cardamomi, caryophyllorum, assari, mastiches, schænuanthi, spicæ, carpobalsami ana vnciam vnā, absinthij sicci, rosarum ana drachmas quinque, trita crassius coque ex aqua libris duodecim ad partium duarum consumptionem, frica, cola, exprime. Expressi huius libris duabus macera libram vnā aloës, prius aqua pluuiæ sepe lotam & siccata tribula, sicca. Illi misce myrrhæ, mastiches ana drach. quinque, croci drachmas tres. omnia macera, reliquo expresso, tribula, sicca.

Siccatur aloë primùm in ymbra, post

in sole Mesuæ cap. de aloë. Hæc verò omnia, vel seorsum quassanda, vel dura crassa cum duris crassis, mollia tenuia cum mollibus tenuibus, postea in aquam mittenda omnia hæc tantum contracta, ut promptius aqua permeet, & vires ipsorum in se trahat, macerantur, igni lento coquuntur ex aquæ libris octo ad dimidias (nam tam larga aqua longam postulat coctionem, quæ his aromatibus vires aut minuit, aut adimit) reliquarum quatuor librarum dimidium aloë primum per se ebibet, prius tamen aqua fontana lota & siccata, reliquum dimidium cum pulvere tenuissimo myrrhæ, mastiches, croci semel, aut potius paulatim combibet eadem aloë; & priusquam siccetur, massa fingatur, æstate potius fiant, quam parte anni alia, ut promptius siccetur aloë.

Pillula lucis maiores Mesuæ, recipiunt rosarum, violarum, absinthij, turbitij, colocynthidos, cubebarum, calami aromatici, nucis moschate, spice, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, schœnwanthi, mastices, asari, caryo-

** Surcu phyllorum, cinamomi, cassiæ, croci, seminis rutæ, li sum. anisi, apij, fœniculi ana drachmas duas: myrri cum robalanorum quinque, rha barbari ana drachmas quatuor: agarici, sennæ ana drach. quinquaginti. Qur, * euphrasie drachmas septem, aloes bonæ pondus*

pōndus omnium, excipe succo fœniculi.

Colocynthis, agaricus, aloë, mastiche per se terantur; cætera simul misce omnia, & comprehendē melle cocto, eum succo fœniculi ad ipsius consumptionem, seu donēc mel valde glutinosum euaserit.

Pillule fœtidae maiores Mesue recipiunt sagapeni, ammoniaci, opopanacis, bdellij, colocynthidos, * rutæ agrestis, aloes, epithymi, * Eius ana drachmas quinque: hermodactylorum, c. penit. * fulæ ana drachmas duas, scammonij drachmas tres, cinamomi, spicæ, croci, castorij ana drachmam vnam: turbiti drachmas quatuor, Zingiberis drachmam vnam & semissem, euphorbij drachma vnius partes duas, dissiccam, solue lachrymas succo porri, & colato comprehendē omnia.

Liquores quatuor primi succo porri calfacto dissoluti & colati, coquuntur ad consumptionem multi succi, deinde cætera mista comprehendūt. Scammonium tamen & euphorbiū liquores per se puluerantur, nisi recentia sunt, & molliā: talia enim etiam dissolui possunt.

Pillule de hermodactyli maiores, recipiunt hermodactylorum, aloes, turbiti, colocynthidos, myrobalanorum flauarum, bdellij mollis, sagapeni ana drachmas sex, opopanacis, euphorbij, sar

sarcocolla, castorij, ruta agrestis, apij anadrachmas tres, croci drachmas duas & semissem, comprehendendo succo brassicæ.

Melle cui incoctus sit hic succus excipiuntur omnia hæc puluerata : nam etiam puluerari possunt hi liquores pauci & sicciores cum multis siccis : vel potius ut prius, liquores hi succo brassicæ calfacto soluti, colati, recocti omnia alia comprehendant.

** Pul- Pillula arthritica Nicolao recipiunt hermo-*
garis ci dactylorum, turbith, agarici ana drachmas
*namo. quatuor, * cassia lignea, spica, caryophyllo-*
** Semi rum, xylobalsami, carpobalsami, Zingiberis,*
*nis in mastiches, fœniculi, seminis lithospermi, * semina*
bacca asparagi, rusci, rosarum, salu gemma ana drach-
eius ru semissem, aloës pondus omniū, comprehendendo
bra cō. succo fœniculi.
diti.

Succus in melle coquendo consumitur, quo melle vires succi adepto cætera excipiuntur, pillulas ex semine cucumeris agrestis, & Alexandrinas podagricis & arthriticis viles scribit Nicolaus Alexandrinus, hanc verò descriptionem non habet.

Pillula fumarie Auicenna recipiunt myrobalanorum flauarum, cepularum, nigrarum, scammonij ana drachmas quinque, aloës drachmas septem, omnia ter imbuantur succo fumar

maria, & toties siccantur, postremò fac massam.

Imbui debent succo fumarie, non excipi, sed melle cui succus hic incoctus fuerit, multò facilius ob myrobalanorum siccitatem, sole siccantur quàm aromatica.

Pillule assaieret Avicenna recipiunt pulueris hieræ picræ vnciam vnā, mastiches, myrobalanorum citrearum ana vnciam semissem, aloës vncias duas, cum Syrupo Stachados forma offam.

Hic syrupus vt cæteri ob lentorem idoneus est his pulueribus comprehendendis, & seruandis à situ ac putredine.

Pillule ex agarico Mesue recipiunt agarici drachmas tres, radicis ireos, praßij, myrrha, Ixiu Il-
ana drachmam vnā, turbiti drachmas quin- lyrica
que, hieræ picræ drachmas quatuor, colocyn- aut flo-
thidos, sarcocollæ ana drachmas duas, exci- rëtina.
pe sapa.

Vinum ad dimidias aut tertias coctum, id est sapa crassitie & lentore est idoneū his comprehendendis, & à putredine ac transpiratione in aërem vindicandis.

Pillule ex hieræ recipiunt, pulueris hieræ picræ Galeni vnciam vnā, cum melle rosato, fac massam.

Similiter ex omnibus hieris & antidoti-

tis aliis fieri possunt massę pillularum, sed melle opus est tanto parciorē ad pillulas quā ad electaria, quanto pillulas electariis esse oportet duriores.

Pillula mastichina conciliatoris recipiunt mastiches drachmas quatuor, aloes drachmas decem, agarici drachmas tres, cum succo arthemisię finge massam.

Hęc tria seorsum trita mastichę, si vis cum pauca aqua dulci, melle excipiuntur, cui succum arthemisię incoxeris.

Pil. an te cibū. *Pillule stomachicę Mesuę* recipiunt aloes drachmas sex, mastiches, rosarum ana drachmas duas, syrupo rosato excipe.

Aloe estate, *Pillule rusę, seu communes* recipiunt croci, myrrhę ana vnciam vnam, aloes vncias duas, comprehende vino aromatico.

Sta- tu pesti- lenti la- uanda. *Pillule bechicę Mesuę* recipiunt succi glycyrrhię, sacchari ana aureos sex, amyli, tragacanthi, amygdalarum, dulcium ana aureos quatuor, comprehende mucagine seminis psyllę, aut cydomorum.

Possunt comprehendi mucagine tragacanthi, vt sequentes.

Pillulę albę sunt ex sacchari libra vna, in vncia mucaginis tragacanthi soluta, & diu tribulata.

SECTIO SEPTIMA DE

trochiscis.

Quid trochiscus, & cur hoc nomine, & aliis appellatus, abūdē nobis dictum est sectione septima Mesuæ. Horū autem vel compositio hīc fieri nō potest, ut trochiscorum theriacorum, vel vsus intercidit, ut iam paucissimi sint in officinis compositi. Quia verō componēdi rationem habent pillulis finitimam (in ambobus enim pulueres humore aliquo excipiuntur) longo sermone mihi egere non videntur. Ob id paucis eos perstringam, qui adhuc sunt vsui quotidiano, quibus verō aliorum erit necessitas, Mesuen & Nicolaum Alexandrinum consulant.

Trochisci de gallia moschata Mesua recipiunt ligni aloes crudi partes quinque, ambre partes tres, moschi partem vnā, glutinis, tragacanthi, cum aqua rosata extracti, quantitatem illam comprehendere sufficientem: fiant trochisci magnitudine foliorum myrti, sigillentur, reponantur in vase vitreo, alij ambra oleo balanino in vase vitreo soluant, & hoc oleo cetera comprehendunt.

*Trochisci de gallia moschata Nicolai Alexā. De ben-
drini recipiunt mastiches uncias duas, gummi & mu-
unciam vnā, caphura scriptulum vnum: trita stelinū
mellissimē, cum aqua rosarum fermentur in vocant.
trochi*

trochiscos, in umbra siccentur, terantur subtilissime, oleo iasmino, sambacum vocant, incoquantur, adde cinamomi, caryophyllorum, nucis moschatae, ana semunciam, fac trochiscos, illine moscho aqua rosarum soluto.

Malè in Nicolao; olei sambucini vncie quatuor, & malè eoquit ad dimidias. hodie mastiche trita super cineres calidos ex olei drach. vna soluitur, pul. gūmi, & caphurè additur affusa pauca aqua rosarū.

Nico-

lai A-
lexan.
drini.

Trochisci aliptæ moschatae, recipiunt ladanū purissimi vnc. tres, styracis calamitæ vnciam vnam & semissem, styracis rubri vnciam vnam, ligni aloes drachmas duas, ambre drachmam vnam, caphuræ scriptulum vnum & dimidium, moschi scriptulum dimidium, aqua rosarum quantum sufficit.

Ladanum per se negligentius & crassius teratur, styrax vterque simul parum teratur, & per cribrum rarum cernendo purgetur: deinde tria hæc catino imposita sole æstiuo vel sine hoc vase duplici liquetur potius quam mortarij, aut pistilli caliditate vehementi: mox ut liquata sunt pistillo in mortario, sole vel igni probè siccat, diu tonduntur addendo paulatim puluerem ligni aloës. In mortario alio tere amygdalas aliquot oleosas, easque ubi mortariū, & pistillum illeuerint abice:

ce ibi tere primūm ambram, deinde caphuram, & moschum aqua rosarum pauca affusa, misce reliquis, & forma trochiscos. Hęc parandi ratio propè tota ex eodem Nicolao est sumpta.

Trochisci de myrrha Nicolai recipiunt myrrhæ, foliorum ruta, mentastri, pulegij ceruini, rubiæ, * opi Parthici, sagapeni, popanacis, ana * assæ drachimas tres, lupinorum pertritōrum drach. fœtida. quinque, fiant trochisci cum succo ruta ponderis drach. duarum.

Trochisci de agarico Mes. recipiunt agaricum electum pulueratum, qui cum vino cui infusum sit Zingiber formatur in trochiscos.

Trochisci de spodio recipiunt spodij drach. quatuor, rosarum rubrarum drach. septem, seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ ana drach. duas, muccagine seminis psyllij comprehende in trochiscos drach. vnus.

Spodium arabū sit verū nō ebur vstū, ne autē accipe spodium Græcorum, rem furnacariā pomoholygi affinē, nunquā sumendam, sed solūm admouendam.

Trochisci de terra sigillata Mes. recipiunt sanguinis draconis, gummi Arabici assī, * ra. * imich, rosarum, seminis rosarum, amyli assī, spodij, acaciæ, hypocisthidos, balauistij, boli armenie, terra sigillatæ, id est, sigilli Lemnij, corallij, vnionum, succini, tragacanthi, papaueris.

nigri ana drach. tres. & semissem, sem. portulacæ assi, cornu cerni vsti, thuris, nucum cypressi, ana drach. duas. cum aqua arnogolossi fac trochiscos.

Diaele Trochisci de succino Mesue recipiunt succini
et rasen aureos sex, cornu cerni vsti, gummi Arabici
diaca- assi, corallij vsti, tragacanthæ, acaciæ, hypoci-
rabe. stnidos, balaustij, mastiches, canticani loti, pa-
 paueris nigri assi ana aureos duos, thuris, croci,
 opij ana aureum unum & semissem, fac trochi-
 iscos cum mucagine seminis psyllij.

SECTIO OCTAVA DE pulueribus.

Pulueres initio antidotorum nonni-
 hil attigimus, vbi horum pulueres py-
 xidibus vitreis ferè seruari diximus, &
 interdum præsertim vtendi tempore in
 electaria solida formari. Sæpe etiam ini-
 tio melle, vel alio excipi, seruari, coqui,
 ea suo calore nativo; seu (vt cum vulgo
 dicam) fermentari. De pulueribus aliis si
 quid es sollicitus, ex Mesue sectione o-
 ctava repete, tantum addam pulueres
 condimentis destinatos.

Puluis minutarum specierum recipit
 zingiberis albi lib. vnâ, piperis boni
 vnc. quatuor, nucis moschatæ vnc. duas,
 caryophyllorum, granorum paradisi ana
 vnc.

vnc. vnam, cinamomi electi semunciam, fiat puluis.

Puluis albus recipit zingiberis albi & purgati lib. vnam. fiat puluis. Puluis eximius, finis vulgo dictus, recipit zingiberis albi scilicet libram, granorum paradisi vnc. duas, tritis his simul misce croci drach. duas, & acetum paulatim affunde, vt croci colorem induat; diu & multum tunde simul omnia.

Libræ vni sacchari misce cinamomi vnciam vnam, habes puluerem ducis.

SECTIO NONA

de oleis.

Olei genere quatuor demonstraui-
mus in Mesue, quorum primum est
oleum ex oliuis maturis, aut immaturis
expressum, quod oleum absolutè dicitur,
aut cum vulgo oleum commune. Alterum
est quod ex seminibus oleaginis
exprimitur. Tertium quod vi ignis tollitur
aut descendit. Quartum quod oleo
constat: sed cui plantarum partes ac animalium
sunt incoctæ.

Primum genus tanquam cuius perspicuū
sciens omitto, reliqua tria persequar.

Oleum igitur amygdalarum dulcium
fit ex amygdalis nō depellaris, in mortario
lapideo p̄tritis, in offas collectis, quæ

*Secundum
dum g
mi.*

calentis aquę vapore, in quo diu subiguntur manibus. vbi calēt, calatho spartaceo, aut sacco cannabino calēti inuolutę, torculari calido exprimuntur in oleum clarissimum & dulcissimum. Aliter quoque fieri in Mesue docuimus.

Sic fit oleum ex amygdalis amaris, pistactis, strobilis, nucibus auellanis, Indicis, balano myrepfica, nucleis persicorum, cerasorum, seminibus cucurbitę, cucumeris, melonũ, ricini, staphidos agrię, cnici, cannabis, lini, papaueris, hyoscyami, & cæteris oleaginis, quę etiam per genus tertium extrahi possunt.

Mes.

Oleum laurinum fit ex baccis lauri maturis, recentibus, tritis in pila, incoctis aquę, & torculari expressis.

Sic ex baccis recentibus myrti, iuniperi, terebinthi, lentisci fieri potest oleum simplex. In vsu autem frequentiore est compositum, de quo in quarto genere. Laurinum autem id ex Gallia Narbonensi, vbi magnus est harum baccarum recentium prouentus, ad nos mittitur.

Tertiu
genus.

Mes.

Oleum ouorum fit ex vitellis duorum elixando duratis triginta aut circiter, qui manibus friati in sartagine plumbata frignantur igni mediocri, mouendo cochleari donec rubescant, & oleum ab his resolvatur & profluat.

Alios.

Alios huius olei modos lege in Mesue: *Mes.*
 alij facculo & torculari exprimunt.

Oleum iuniperi fit segmentis ligni iuniperi,
 vase solido conclusis, incenso circa id igni lucu-
 lento ut in vas subiectum descendat oleum.

Cætera ad hoc oleum pertinentia &
 ad alia, quæ eodem fiunt modo, ex Me-
 sue repete, item qua ratione fiat oleum
 philosophorum, tartari, & alia eius gene-
 ris permulta: quæ, quia ibi fusius sunt ex-
 plicata, neque multo usu nunc celebrata,
 non putavi pluribus verbis explicanda.

Olea quarti generis ex plantarum, &
 animalium quorundam partibus, ubi ha-
 rum vires macerando, & coquendo tra-
 xerunt, colantur, exprimunturque, & hu-
 mor si quis in oleum largior transit, co-
 ctione absimitur. Et quæ olea cum suc-
 cis liquidis fiunt: aut siccis quidem vel li-
 quoribus, sed humore ut vino solutis, ad
 humoris cõsumptionem percoquantur,
 ne humor ille excrementosus oleo pu-
 trendi, & situm ducendi occasionem af-
 ferat. succi consumptionem indicat o-
 leum spathula iniectum igni. nam si ar-
 det, purum est: si crepitat, succum habet
 adhuc reliquum. Ad hæc feruendo in le-
 bete crepitat cum succo, & bullas egerit:
 ubi absumptus, tranquillum est, & gutta

Quar-
 tum ge-
 nus.

in manu succum subiectum ostendit oleum supernatans.

Olea quibus flores miscentur æstiuo insolatu magis coquuntur, aut igni lento, aut utroque.

Olea ex animalibus facienda viua ipsa recipiunt ut in his moriantur scorpiones, serpentes, ranæ, formicæ, vulpes.

Oleum rosatum Nicolao sic fit, Rosarum tritarum sesquilibra coquitur diu in olei loti libris duabus vase duplici, tela alba exprimatur & torculari.

*Quar-
tum ge-
nus olei
per im-
pressio-
nem.
Mes.*

Hodie rosas recentes, etiam nō exunguatas oleo omphacino aut loto, dies, aut etiam menses aliquot in sole macerant vase vitreo aut ciliceo. Postea hyeme, aut vtendi tempore paucō succo rosarum aut vino adiecto coquunt in vase duplici, ne vrendo graueolentiam acquirat, sicque reponūt. Similiter ex floribus violarum, chamæmeli fit Mesuæ chamæmelinū cum oleo dulci etiam in vase duplici coquendum, & ex floribus meliloti, anethi, liliorum, iridis, leucoij lutei, nymphææ: sed à liliis apices crocati tollendi.

*Oleum
cydonio-
rum.
Mes.*

Oleum melinum fit ex cydoniis acerbis tritis, in oleo omphacino sufficienti. insolatur dies quindecim, dein cum succo cydoniorum coctis in vase duplici ad horas circiter quatuor. Carnem & succum

succum muta, rursus insola, & coque vt dixi, idq; bis aut ter repete, cola, repone.

Cydonia sunt qui cortice & semine purgent, purgatione tamē nihil opus est, nisi impura sint aut semiputria.

Oleum mastichinum recipit olei rosati vnc. *Mes.* duodecim, mastiches vnc. tres, vini boni vnc. octo, coque ad vini consumptionem.

Fit hodie ex oleo vulgari, cum tamen aut rosato, aut omphacino, aut saltem lo to cōfici debeat in vase duplici. Consumptoque propemodum vino mastiche per trita paulatim affunditur cōtinenter mouendo, donec crit liquata & permista. Coctione longiore exanimatur.

Oleum myrtinum recipit myrtarum recentium selibram, olei omphacini, aut loti sesquibram: insola, aut coque cum vini albi austeri vnciis quatuor ad vini consumptionem. Fit etiam per expressionem, & per decoctionem in aqua, donec oleum supernatet quod concha separandum est.

Oleum nardinum *Mesua* recipit spica nardi vncias tres, vini & aque ana vncias duas & dimidiam, olei sesamini selibram, coque in vase duplici lento igne horis circiter quatuor, saepe mouendo.

Seu ad aquæ & vini consumptionem: sed prius infundatur spica aquæ & vino.

Fit etiam sæpe oleum nardinum descriptione Nicolai Alexandrini efficax, sed sumptuosum magis: à quo etiam componendi modus abundè explicatur.

Mes.

*Oleum costinum recipit costi amari vnc. duas, casia vnciam vnam, extremitatum sam. * vnc. psuchi vnc. octo, vini odori quantum * sufficit. octo infunde hoc biduo, olei sesamini lib. duas, co- aut cir que horis septem, seu ad vini consumptionem, citer. exprime, repone.*

Aut costum verum, galanga maior hodie dictum, sumendum, aut eius loco radix enulæ campanæ, aut silphij, aut similis, potius quàm quæ vulgò est in officinis qualitatibus insignium experts.

Oleum rutaceum fit ex folijs rutæ recentibus, oleo maceratis, & æstate tota insolatis, quæ exacta coquitur, exprimitur, reponitur. sic fit oleum menthæ, absinthij.

Oleum euphorbij fit vt oleum mastichinum. Euphorbium enim tritum, aut si recens & molle est, minutim confectum oleo cum vino feruenti paulatim immittatur, & ad vini consumptionem semper mouendo coquatur.

Oleum castorij Nicolai fit ex castorij vnc. vna, cocta in olei lib. vna, ad consumptionem tertiæ partis, castoreum retinendo seruatur.

Coquitur etiam id oleum cum paucò vini, vt vnc. duabus. nam si per se coquatur, &

tur, & oleum vrendo nigrescit, & castorium vanescit. Potest tamen sine vino in sole coqui sæpe mouendo.

Oleum vulpinum Mesue sic fit, *Vulper* integra tantum exenterata coquitur in aqua fluuiialis & marina aut salse, ana sextario vno, olei antiqui clari sextarius duobus & dimidio, coque ad aquæ consumptionem, & vulpis carniū dissolutionem, exprime & repone.

Oleum lumbricorum fit ex lumbricis in vino albo diligenter lotis, & oleo, & paucō vini rubri incoctis ad vini consumptionem: deinde colatur & exprimitur leuiter oleum, ac reponitur. Sunt qui tritos deinde lumbricos eidem oleo permiscant in vnguenti formam, nec inutiliter.

DE YNGVENTIS SE-

ctio decima.

Vnguentum, quia partibus inungitur dictum, crassius est oleo, liquidius cerato, vt ex vnguentis Galeni, & aliorū constat. Huius materiæ sunt, plantarum partes, & multæ animalium, metallica etiam & terrea quædā. In his succi recentes, & fluidi coquendo absumentur, vt in oleis, iidem si sunt sicci, aliquo sunt humore dissoluendi.

Si herbæ in vnguenta recipiantur, vel puluerantur si sunt siccæ, & aliis miscen-

Paulus. c.
20. lib.
7.

tur, vt metallica & terrea, & alia plurima: vel humore aliquo, vt vino macerantur, etiam virides coquuntur, exprimuntur: deinde reliquis vinum id vel aliud incoquitur, ad sui consumptionem. Liquores sicci, & gūmi, & resinę, vel teruntur quando sunt sicciora: vel pistillio calido soluntur, vel humore idoneo, quando præsertim sunt humidiora.

Fiunt autē vnguenta nunc igni, nunc sola subactione, sed longa, vt vnguētum ex lithargyro nutritum cum oleo, aceto, aliis, & quæ alia similiter nutrirī diximus lib. 2. Sic argentum viuum citra ignem aliis miscetur, quod in vaporem promptè totum abeat.

Vnguētis, ceratis, emplastris, æstate minus olei, ceræ, & similium corpus dānium miscemus: hyeme plus: quòd huius frigiditate etiam liquidiora coquantur, & duriora appareant, æstate contra etiam sicciora per colliquationem mollescant.

Cera cum oleo liquata igni aufertur, & refrigerando continēter mouetur, vbi iā modicè coiuit pulueres paulatim permiscantur, idque ne fiat grumosum vnguentum. Alij vbi refrigerando coiuit in sartagine, cochleari aut spatula ferrea in bracteolas deradūt, in mortarium impo-
nunt,

nunt,& adiectis paulatim pulueribus diu tribulant. Quod præceptum plurimis his vnguentis est commune.

Vnguentum aureum Mesue recipit cera flava vnc. sex, olei boni lib. duas & semissem, terebinthina vnc. duas, resinæ pineæ & colophoniana vnc. vnā & semissem, thuris, mastiches, ana vnc. vnā, croci drach. vnā. Vng. regis.

Cera ex oleo liquata pulueratæ resinæ affunduntur, his liquatis terebinthina mox igni aufertur, vbi refrixit, puluis reliquorum adiicitur.

Vnguentum pompholygos spurium recipit olei rosati vnc. decem, cera albæ vnc. quinque, cerusæ lotæ vnc. quatuor, plumbi vsti, pompholygos ana vnc. duas, thuris vnc. vnā. Coque oleum rosatum cum succo solani ad ipsius consumptionem, tunc adde ceram, deinde reliquorum puluerem tenuissimum misce in mortario, vbi refrixit, quod dixi modo.

Ceræ vnc. duæ, aut vnc. duæ, & dimidia satis sunt vnguento. Hæc enim quantitas emplastrum fecerit, pompholyx vera miscetur non vt hodie cadmia.

Vnguentum basilicum minus Mesue recipit resinæ picis, cera, ana olei quantum sufficit.

Tetrapharmacum hoc Galeno & Paulo aliter fieri docuimus in Mesue. Cera in

oleo liquata, pix & resina puluerata iniiciuntur, quibus liquatis igni aufer. Si verò crassius tritam picem immittas, quia tardius liquatur, ob id diutius ignem tolerat, & velut vritur, nigriūque facit tunc vnguentum. Cera & resinæ vnc. dimidia, olei vnc. duæ, picis vnc. vna.

Vnguentum Aegyptiacum Mesuæ recipit æruginis aureos quinque, mellis aureos quatuordecim, aceti acerrimi aureos septem, coquenda igni ad iustam crassitiem.

Gal. li. c. ph. 9. Mel cum aceto primū aliquādiu coquitur, deinde additur ærugo & percoquitur. Iusta autē crassities ex noris prius dictis intelligitur, hoc est, si eius portio vasi stanneo, aut marmorī imposita & refrigerata coëat, nec adhæreat. Aerugo coctione transmutatur in rubrū, sicq; minus terret vnguentum ægros quā viride.

Vnguentum album Rasis recipit cera alba vnc. vnā, cerusæ in aqua rosarum lotæ vnc.

**Vnc. duas, *olei rosati vnc. quatuor. Sunt qui addūt vnam. paucum aceti, alij etiam vnc. vnā lithargyri, alij capture drac. duas, alij duo albumina onorum, omnes rectè pro vario medici scopo.*

Hodie plæriq; addunt omnia hæc præter lithargyrum. Alij olei vnc. 12. cerusæ, ceræ albæ ana vnc. 4.

Vnguentum desiccatiuum rubrum nothum recipit

recipit cadmie lapidosa, terra sigillata, ana
unc. 4. lithargyri auri, cerusa, ana unc. tres, ca-
phure drac. vnam, cera unc. quinque, olei rosa-
ti & violati ana uncias sex.

Præstantius esset cum solo oleo rosato,
& eo facto ex oleo omphacino, quia ma-
gis stringeret & siccaret.

Lithargyros cum oleis aliquandiu nu-
tritur super iguem, cera deinde liquatur
in his, deinde reliquorum puluis tenuiss.
paulatim adiicitur.

Unguentum enulatum spurium recipit radi-
cis enula campana coctæ cum aceto, & trita, &
creta libr. vnam, axungia porci, olei communis,
ana unc. tres, cera noua, argenti viui, sali-
na hominis ieiuni extincti, terebinthina lote-
ana unc. duas, salis communis puluerati unc. se-
missim.

Cera in oleo liquatur, axungia, deinde,
post additur enulæ pulpa, deinde argen-
tum viuum, & sal, post id terebinthina.
Sunt qui argenti viui loco salubrius mi-
scent sulfur, alij vtrunque omittunt.

Unguentum populeum Nicolai recipit oculo- A mul-
rum populi lib. dimidiam, foliorum papaueris ni- tis huic
gri, mandragoræ, hyoscyami, solani, semperuiui dupla
parui & magni, lactucæ, personatæ, cotyledo- aut tri-
nis, violæ nigre, summitatum rubi tenerrimarum, plâ cõ-
ana unc. tres, axungia porci sine sale lib 3. ponitur.

In hac regione populi flores & herbæ in idem tēpus non incidunt. Nam oculi populi Martio erumpūt, herbæ Iunio vigent: ob id oculos ipsos in mortario per se terimus, deinde cum dimidio axūgiæ porci purgatę (seuū dulce vocamus) multū diuq; tundimus, in vase o percolato recondimus hebdomadas 5. 6. menses duos dum herbæ vigeant. Hæ incisæ & per se pistillo ligneo tritæ, quia simul ob lentorem, & multitudinē non possunt cū oculis populi, & sepo coquantur, cernūtur omnia, & si opus est parum recoquantur, reponūtur: vt tamen vireat magis, superadde coctioni solani triti manipulos duos, nō maleficorum more, æruginem.

Unguentum tripharmacum Mesua recipit lithargyrum leuissimè tritū in mortario ad instam crassitiem, tribulandum cum aceto & oleo vicissim & paulatim affusus: si verò coquis ad aceti consumptionem, & lithargyri fusionem, ut crasse scat magis, fiet emplastrum.

* Di.
Etum
quia
simplici
bus 12
cōstat,
quot

*Unguentum *apostolorum Auicēna 5. can. recipit terebinthina, cere albæ, resinæ, ammoniaci ana drachm. quatuordecim, æruginis, opopanax ana drach. duas, aristolochiæ longæ, thuris masculi, bdellij ana drach. sex, myrrinæ, galbani ana drach. quatuor, lithargyri drach. nouem, bdellium si molle est, ammoniacum, opopanax*

panacem cum aceto macerabis nō esse vna, pōt fuerunt
 frigidie calefac, cola, iterum pendere: & ponderi ho- apostoli
 rum legitimo terebinthinam permisce, quæ tam Olei li-
 bellæ hæc, ac cætera comprehendet, vt vix sis. bra sint
 erraturus: lithargyrum autem in oleo nutri- æstate
 es aliquandiu sine igni friatum. Post igni tra- due,
 de: vbi calet, ceram immitte. Hac liquata igni hyeme
 aufer, liquores, vt dixi, paratos misce: vbi re- tres.
 frigit, reliquorum puluerem paulatim adijce,
 & bdellij, si est siccius, quale nobis est adu-
 rinum.

Rarum vsu, tamen ob componendi & miscendi magnam difficultatem sæpe ad operis specimen probandis seplasiariis parari imperatur.

Emplastrum apostolicum Nicolai Alexandrini ab hoc diuersissimum est, & cōstat simpl. viginti & vno.

• Vnguentū martiatum cum Hermolao, vel Martianum cum aliis, & de althæa, & Aregō, & Agrippæ (quæ quatuor vulgus olea 4. calida vocat) quia rarò componuntur, omisi: ex Nicolao petenda si cōponendi necessitas inciderit: & vnguentum in gratiam cōmitis cuiusdā ad menses cohibendos scriptum, quia omnibus & solis astringentibus constat, vt emplastrum contra rupturam. si tamen componendi cupiditas tibi incesserit, aut etiam
 necessi

necessitas, nobis scribitur in fine vnguentorum Mesuæ cum vnguento citreo, & aliis non paucis hodie obsoletis: quamquam & vnguentum citreū etiam hodie quidam componunt, incerti tamen quid amentum dulce sit.

Nam sunt qui lapidem vitri (quam axūgiam vitri vulgò vocant) alij gypsum lucidum, alij aliud. Fortè autem corrupta vox ex amianto lapide, quo adulterant hodie alumen scissile illi aspectu simillimum, sed alumen vrit, amiātus est dulcis. Eadem ambiguitate tenentur in antalli lapide, & in gersa serpentaria, quam vocem ex cerusa, syncopen, corruptam esse est perspicuum. Est enim velut aut cerusa, aut amylum (sic enim etiam quidam vocant) ex radice ari, vel dracūculi depellata, trita, siccata citra lotionem his aliis post lotionem cum aqua rosarum.

Cerote & cerelæon Græcis, nobis ceratum à cera dictum, medicamentum consistentia quodammodo mediū inter vnguenta & emplastra.

Ceratum Galeni refrigerans recipit cera alba per ablationem unciam vnā, olei rosati ex omphacino facti uncias quatuor, fiat cera tum in vase duplici, quod dum est refrigeratum, multum diūque ex aqua frigidissima, & postremo
paucis

*Mes-
sues.*

panco aceto albo puro subigatur.

Non esse autem ceratum hoc aqua & aceto imbuendum nisi tempore vtendi, abunde ex Galen. in Mesue sectione vndecima docuimus. Postremò aqua rosarum imbuunt hodie, quod probo, sed diu seruari nolo, præsertim aëre calido, quia vires suas perdit, & graueolentiam acquirit.

Ceratum santalatum Mesue recipit cera alba drach. triginta, olei rosati lib. vnam, rosarum drac. duodecim, santali rubri drach. decem, santali albi & flauī ana drac. 6. boli Armeniace drac. 7. spodij drach. 4. caphura drach. 2.

Refrigerato iam cerato & raso, puluerem in mortario miscent paulatim potius quàm inter refrigerandum, vt antè vnguenta dixi.

Ceratum Galeni stomachicum recipit vnguenti nardini optimi, cera odora & pinguis, & lote ana vnc. vnam, si hyems est: si verò æstas, cera drach. septem, liqua in vase duplici, refrigerato deinde & raso adde pulueris mollissimī aloes, & mastiches ana drach. vnam.

Succus omphacij aut absinthij quando addenda, in Mesue dixi. Hoc aliter Mesues componit ex Galen. sed mutatis aliquot simplicibus & ipsorum pondere.

Ceratum Galeni stomachicum alterum reci-

*Spodiū
Ara-
biū non
Graco-
rū Ca-
lidum.*

*Refri-
gerans*

pit olei melini, cera alba lota ana vnciam vnā,
hypocisthidos vnc. semissem, fiat ceratum.

Hæc duo cerata stomachica ex Galen.
vsurpāda potius suaserim, quàm quæ ho-
die fiunt ex Nicolao & Mesue, quanquā
& id clemens, & efficax fuerit. Illud cali-
dissimum, quod non esse Galeni caryo-
phylla, nux moschata, macis, cubebæ, ga-
langa, planè indicant.

Ceratum, stomachicum Galeni ex Nicolao
recipit mentha, absinthij, maiorana, stæchados
Arabica, foliorum lauri, chamæmeli, rosarum,
ana manip. vnum, cinamomi, spica nardi, nucis
moschatae, caryophyllorum, macis, cubebæ, ga-
langa ana vnc. dimidiā, thuris, mastiches ana
vnc. vnam: puluerata excipe ladani, cera ana
vnc. octo, olei chamæmeli, laurini, spicini, ma-
stichini, rosati, ana vnc. vna & dimidia.

Oleum laurinum, rosatum, chamæme-
li, cum cera & ladano liquātur, mox igni
aufer, & trade mortario, cætera misce
multum, & diu tundendo, donec erit glu-
tinofum cum oleo spicino, & mastichino.

Ceratum aliud Mesuæ recipit rosarum, ma-
stiches ana drachmas viginti, foliorum absin-
thij siccerum drachmas quindecim, spica Inde
drachmas decem: excipe cera puræ vnciis qua-
tuor, olei rosati libr. vna, & semisse simul igni
liqua

liquatis, mox aqua rosarum aliquoties lotis, deinde vino veteri, succo cydoniorum & pauco aceti.

DE EEMPLASTRIS.

HÆC emplastrus cum r, & adiectiuè medicamentum emplastrum sine r, Galeno dicitur, Latinis tamen placuit potius dicere neutro genere emplastrum, quos hîc sequemur. Emplastrum autem est medicamentum corpori admouendû, durum valde & solidum ex omnibus propè medicamentis, præsertim pinguibus & siccis coactum.

In emplastra enim recipiuntur omnes plantarum partes, metallica item & terrea omnia. Multæ etiam partes animalium ac interdum animalia tota.

Ex his autem quædam vires solas emplastro distribuunt, vt vinum, acetû, aqua, succi liquidi: hæc enim ad sui cõsumptionem coquuntur. Alia corpus tantum, & materiam emplastro conferunt, nullam verò aut minimam virtutem largiuntur, vt lithargyros, cera oleum commune, recens, & frequenter resinæ. Reliqua propè omnia & corpus & facultatē aliquā emplastro impertiuntur. Ex quibus patet scopos cõponendorum emplastrorû præci-

puos esse duos, facultatem & consisten-
tiam crassam, duram, glutinosam. Duos
verò alios odorum & colorū minus esse
præcipuos, & magis in ægrorum gratiam
quàm medicamenti naturam, recipit
tamen ob apprehensionem, magni quoq;
sunt momenti, præcipuè odor. Is enim
bonus cerebro, cordi, vtero, commodare
possit: malus nocere. in sumēdis verò co-
loris, & præter hos saporis magna quoq;
ratio est habenda, vt in methodo compo-
nendi medicamenta ostendimus.

Ex his radices, cortices, ligna, folia, sut-
culi, flores, fructus, semina sicca, & simul
puluerata, vel cum aliis, fere postrema mi-
scentur cocto emplastro cū aristolochia,
gentiana, chamæleo, remoto ab igni em-
plastro à Galeno miscentur: si qua verò
ex his recentia & viridia sumantur, vel ex
humore aliquo coquuntur, cernūtur, mi-
scentur: vel succus ex his si succulēta sint
trititis expressus incoquendis aliis seruit,
& in vaporem exhalat, viribus tamē re-
lictis, vt in emplastro de gēua. Id quod
etiam muccaginibus commune est, sed
minus hæ ob lentorem exhalant.

Oleum tamen & mel adhuc multum
absolutis emplastris superest.

Qui verò succi constantes & corpulēti
vt

(vt aloë, hypocisthis, glycyrrhizæ succus, acacia, glaucium, lycium, elaterium, meconium) in emplastra veniunt. si recentes sunt, aliquo rei propositæ idoneo humore solvuntur, qui coctione prius est consumendus, quàm illi composito miscuantur, aut saltem simul incoquendo consumetur. Si autē sicciore sunt, tamen adhuc teri contumaces, pistillo calido, & ob calorem siccante terantur, nisi si qui sint friabiles, vt aloë, scammonium, tam succus, quàm liquor. Dicti verò succi omnes refrigerari iam incipienti emplastro miscendi sunt, vel dum cerati consistentiam habet emplastrum, si illorum succorum substantiam & facultatem manere volumus in emplastro.

Sed succi sicciore, vt rarius in emplastro recipiuntur: sic liquores, gummi, resinae, metallica omnino frequentissimè.

Liquores autem vt galbanum, opopanax, sagapenum, ammoniacum aceto vel vino vel alio competenti humore macerati dissoluuntur, colantur, coquuntur ad humorem illius consumptionem, in emplastroq; consistentiam coguntur, tuncque pōdus illorum quæsitum in scriptura sumitur. Si verò horum duo, tres, quatuor in idem emplastrum recipiuntur: sed

pondere diuerso, vt in emplastro diuino, separatim liquores singuli sunt macerandi, dissoluendi, colandi, coquendi, vt cuiusq; per se pondus legitimū accipiatur, id quod ante hanc per colum purgationem fieri probè non potest ob ramentorum, seminum, sordium, & aliorū largam in multis horum mistionem. Si verò puri sint, aut cultello purgati, potes initio statim pendere, & mox simul dissoluere, colare, & emplastro propemodū cocto incoquere ad humoris ascititij cōsumptionem. Quòd si iam dissoluti, colati, appēsi, & per se cocti ad emplastri crassitudinē, vt dictum est, venerint, percocto iam emplastro iniiciuntur. Sunt qui terebinthina pauca, si hanc recipit emplastrum, percoctos prius resoluant quàm iniiciant.

Galbanum ligneo pistillo tustum aliquando cæteris ab igne depositis iniicitur, aliquando parum incoquitur, raro multum: ammoniacum sæpe multum coquitur, aut separatim, aut cum emplastro, interdum minus: est quando digitis ad ignem, vel solem dilatatum, mox vt i alia, sed remota sunt ab igne sublata iniicitur, donec liquefcat.

Ammoniacum solum impositum squallida & arida reddit emplastra, nisi cera & resina

resina, vel alia ad emplasticam cofectionem idonea misceantur.

Vinum verò, acetū, & alia id genus coquēdo tota cōsumuntur, viribus tamē (vt dixi) in medicamēto relictis pro varia acetī & vini natura. Neq; enim idem potest acetum ex vino austero, & acetum ex vino valenti: adhæc tenue, purum, albū valentius est, in tenuādo & penetrādo quā contrariū: sic vina medicamētis varia expetūtur, nūc austera in emplastris epuloticis: nunc generosa, quale Falernū, si digerendum valentius est. Ob id à medico sunt hæc distinguenda in suis scripturis.

Oleum emplastris prima ratione miscetur ad coctionem, deinde vt emplastrum fiat anodynum, resoluens, molliēs, vtq; medicamenti vis acris, vel austera obtundatur.

Oleum cōmune emplastris miscetur, vt materiam præstet: sitq; cum cera liquidum, & mīstum emplastrorum corpus, cui euphorbium vel alia misceantur. Sæpe autem ad metallicorum coctionem adhibetur, vel solum, vel cum aqua, vel aceto, vel vino. Solum cum axungia in emplastro diachalciteos ad lithargyri & chalciteos coctionē: sola item, vel cum dictis humoribus lithargyros læuissima ferē

veteribus coquitur ad sordium consisten-
tiam, metallicis quibusdam, vt squamma
æris, cerussa, nunc initio adiectis, nunc
postea pro variis medici scopis.

Oleum verò vetus, quanquam & ma-
teriam præbeat, tamen ad digerendum
miscetur: id quod quâto vetustius est, tan-
to in id efficacius. Eadem ratione ompha-
cinum oleum, vel simile ad astringendum
& refrigerandum miscetur: lotum ad re-
frigerandum, & dealbandum. Composita
quoq; olea omnia, & vnguenta in empla-
stra immitti possunt, vt præter materiam,
facultatem quoque suam immittant.

Additur etiam oleum, vt resinarum sic-
ciorum, & ceræ vetustioris siccitatem cor-
rigat: id quod resinæ recentiores quoque
præstant.

Oleum hyeme vnguentis quibusdâ cæ-
ratis, emplastris largius miscendum quàm
æstate, à cuius calore semifusum, mollius
reddit vnguentum ceratum, emplastrum,
vt durius idem oleum ab hyemis frigore
concretum. Eadem ratio resinarum liqui-
dârûm, & siccarum minus, & ceræ, vt olei
partem cotylæ quartâ hyeme, æstate octa-
uam miscet Galenus, interdû cotylas olei
quatuor hyeme, tres æstate idem miscuit.
Resinâ tamen & cerâ quâto pinguior;
humid

humidior, recentior, tanto paucior tam hyeme quàm æstate miscenda est: sed tamen parcior adhuc æstate quàm hyeme.

Mel panaciæ, & aliis quibusdam emplastris miscetur, ut corpus præbeat emplasticum, & præterea siccet, tergeat, digerat, à putredine vindicet.

Cera in emplastris solum materiæ locum habet, non efficaciam virtutis adiuuat, ut interdum resina, nō tamen omnibus, utpote materiam aliunde fortitis cera miscetur, aut resina. Nam emplastrum diachalciteos neutram recipit, quòd consistentiam emplastri iustam suppeditent lithargyros, chalcitis, & axungia à membranis purgata, cum oleo cocta. Adhæc quibus ladanum miscetur, si largum est, ceræ vicem sustinet, ut ea non sit addenda.

Porro cera vel est recens, & ob id pinguis & glutinosa magis. Hæcque æstate parcior est miscenda, ut oleum hyeme, largiori manu utrunque & ratione eadem pices, & resinæ. Quæ verò cera est sicciore, vel natura, vel tempore hæc, minus diu coquenda, & sæpe oleo aliquo vel resina liquidiore humectanda. Adde quòd cera alba seu natura, seu lotionem ad candorem quoque interdum additur: Propoleos ferè eadem quæ ceræ consi-

stentia & ratio, sed facultate trahendi vehementi est prædita, quam cera vel nullam vel minimam obtinet, quamvis non-nihil digerit, sed inter digerens & tractorium aliquid interest Galeno initio lib. 7. c. ph. g. Propolis ob id ferè semper remoto ab igni emplastro miscetur, ne vis eius attractrix exhalet.

Gummi thuris omnium frequentissimè in emplastra Græcis veteribus recipitur, myrrha & sarcocolla non rarò, bdellium & styrax interdum, cætera rarissimè, nisi quòd caphuram, & alia quædam Arabes ac neoterici frequenter hodie suis emplastris commiscunt.

Vt lib. Thus autem persæpe miscetur empla-
s. meth. stris ad obrundendam aliorum valentio-
Māna rum violentiam, nonnunquam ut mate-
Grec. riam præbeat emplasticam, præsertim quod recentissimum est ac pinguis-
 simū, nonnunquam ut affectus causam coquat,
 & modicè digerat. Rationibus iisdem māna ipsis miscetur, ac præter eas ut modicè astringat. Gummi alia ferè miscen-
 tur, quo emplastris facultatem aliquam suam largiantur, ac non multò ante resinas iniiciuntur, idque quia substantia sint aquea & crassiore, cum resinae sint aëreæ magis & tenuiores, ut in simplicibus dixi-
 mus

mus. Si verò gummi sint liquida & recentia eorum quæ humiditatem multam & virtutem in emplastro manere velimus parum diu incoquantur. Quod præceptum succis, liquoribus, resinis, & aliis permultis est commune: quia coquendo ficciora euadunt, & viribus velut exanimantur.

Gummi liquores semper in fine misceantur, & succi ficci: quæ si humore aliquo fuerunt soluenda, ad illius consumptionem prius coquantur, post misceantur, quando emplastrum incipit refrigerari. Succo liquidi in emplastro de ianua coquendi cum oleo. Herbarum virides in emplastro gratia Dei cum vino coquantur ad eius consumptionem. Ex oleo coquantur emplastra, ut apostolicum, ceronem, oxycroceum, diuinum, & contra rupturam, diachylon, vel ex succis, ut emplastrum de ianua, vel lacte, ut emplastrum gratia Dei.

Chalcanthum aceto solutum depositis ab igne paulatim miscetur, Galeno cauēti ne effruescat. Aesustum, ærugo, chalcitis, magnes, bolus Armenica, terra Lemnia, sulfur, auripigmentum, & cetera puluerabilia in fine depositis ab igne miscetur. Adeps super ignem miscetur semper agitando

tando: crocus humore solutus dum fiunt
magdalia & moschus miscentur.

Resina Resina lentiscina, terebinthina, laricea,
pityinia seu pinea, picea, abietina, cupres-
sina emplastris miscentur sæpe ad confi-
scentiam ipsorum constituendam tantum,
seu ut materiam & corpus emplastro cum
aliis præbeant, interdum ut lentorem &
glutinofam qualitatem impertiatur, cum
per alia emplastrum pinguis expers, nec
adhærens per se partibus est, at per se
promptè exidens.

Est quãdo ut virtutem aliquam empla-
stro afferant digerendi, tergendì, siccãdi,
vel aliam cuique seorsum resinæ peculia-
rem, ut in ipsarũ historia docui in simpli-
cibus: Quantum autem vniuscuiusque sit
miscendum, & quando coctioni sit vna
quævis miscēda, postea suis locis audies.

Terebinthina quantis valentius quàm
cera emollit, ac præterea calfacit, & di-
gerit: sæpe tamen emplastris iniicitur, ut
ea tantum reddat glutinosa, non ut facul-
tatem aliquam, vel nouam tribuat, vel
augeat. Aliæ item resinę similiter pingues
eadem ratione.

Quãdo autem ea miscetur, & simul li-
quores, aut succi sicci. His humore ido-
neo solutis, colatis, ad humoris consum-
ptionem

ptionem coctis, rectè commiscetur terebinthina, deinde ambo percocto emplastro, & ab igni deposito permiscetur, ut ignē nullum, vel minimum sentiat terebinthina, siue per se, siue cum aliis in emplastrum veniat, ut in emplastris diachylo maiore, de meliloto, de mucaginibus.

M E T A L L I C A.

Metallica autem sunt admodum curiose terenda, & cribro tenui cernenda, ut promptius liquentur si liquabilia sunt, vel ne contactu nos offendant si non liquantur, etiam si liquabilia sint.

Ex his verò quæ liquantur libro superiore docui in liquatione.

Liquatur lithargyros cum aqua, vel oleo, vel vino, vel aceto, vel oleo iunctis horum aliquibus, quæ tamen coquendo absumentur, & liquandi celeritatem lithargyro afferunt, ut post audies.

Lithargyri & cerusæ ana lib. i. si cum olei & aquæ ana libra vna, parum diu aëre puro igni splendente coquantur, album fiet emplastrum: sed ut adhæreat parum terebinthinæ, vel resinæ similis addendū: si molybdæna addatur, fiet cineritium, si lithargyros & oleum sint lota, albius fiet emplastrum, albedinem præter dicta emplastro

plastro conciliat cera alba, oleum lotionē albatum, pompholyx, spodium, calx, ossa vsta, & piscium testæ vstæ farinæ. si plus cerusæ accipiat quàm lithargyri, albius fiet, sed minus tenax.

Aerugo citra coctionem cerato mista emplastrum facit viride: melius fiet si ærugo in sole ex aceto acri pluribus diebus læuigetur; quod enim est in ea mordax, sic mitescit. Si verò æruginem cum aliis initio mediocriter coxeris, emplastrum facies melinum, id est coloris mali cydonij: si liberalius, rufum fiet. Rufa itē & fusca efficiunt chalcitis vsta, auripigmentum, sandaracha, pix nigra, bitumen, gagates lapis, & alia ante mitionem nigricantia, quæ si largiora miscentur, nigrum faciunt emplastrum. Melinum etiam fiet si ærugo lithargyro ad spissitudinem cocto addatur, & iterum coquatur, donec vrendo rufescat.

Cadmia fornacaria, vt etiam lapidosa prius ex vino, vel alio liquore idoneo diutrita sit melior, & ad fusionem aptior.

Cerusa interdum additur emplastris, vt refrigeret, siccet.

Interdum ad albedinem conciliandam, interdum cen apta tantum conficiendo emplastro materia, vt in emplastro

stro Heræ ex duabus aristolochiis.

Si candidum vis emplastrum, lithargyri loti & cerusæ ana lib. i. cum olei vnciis nouem coquitur parum diu ob paucum liquorem (coctio enim longa nigredinē affert) sed medicamentum tunc minus est glutinosum, & adhærēs: quale vt fiat quidam terebinthinam, vel colophoniam maximè perlucentem miscent, ne calorem vitient, aut medicamenti virtutem. Alij eadem ratione ceram albā adiiciunt, vt cerusa emplastris multis ad albedinem conciliandam miscetur: sic ad ruborem minium sinopicum, veteres miscuisse docet Gal. lib. 6. c. ph. g. vt autem sit fuscum emplastrum, squamma æris additur, & ignis fit ex teda loco lignorum, ibidem.

Interdum per se ex oleo coquitur lithargyros ad spissitudinem, tūcque puluerata cerusa spargitur, vt fiat emplastrū album. Cerusa potest initio misceri, vt sal, & alia metallica, & terrea, & cum lithargyro coqui quando nihil ad albedinem conferet, sed neque ad aliud quā materiam, nisi quòd valentius siccat, quòdiutius coquitur: sic lithargyros & metallica ac terrea alia.

Lithargyri enim vsus in emplastris duplex

duplex: si enim non liquetur, materia solum habet rationem: si liquetur præterquam quod corpus glutinosum emplastro præbet, etiam siccatur, idque magis quo diutius cocta erit, fitque sic medicamentum glutinantius.

Si lithargyros ex oleo coquenda sit, & ei emplastro addatur mucagines, lithargyrum prius extra ignem paucò oleo nutrias: deinde igni trade, & mucaginem paucam, ut uncias duas affunde, prohibebit oleum & lithargyrum: si non requiritur mucago, igni lento diu coquatur.

Lithargyros oleo duplo incocta satis glutinosum facit emplastrum sine resinoso, aut ceroso corpore, multò magis si triplo.

Si emplastrum recipit lithargyrum, cerusam cum vino, aceto, aqua, oleo, vel succo alio fluxili, prius sine igni illa nutrian- tur in mortario cum pistillo: deinde coquantur igni lento, donec corpus (ut dicunt) sumat, & crassum glutinosumque euadat. Lithargyros enim coquenda diu ex humore aliquo, ut siccans magis, & glutinosum reddat emplastrum. Eadem ratione metallica reliqua, & terrea coctione longa sicciora euadunt, non tamen glutinosa, nisi quæ liquantur. Nam quæ glutinosa prius erant cum his cocta, liquores, gummi

gummi, resinæ, cera, mel, siccata magis lentorem glutinumque amittunt. Oleum verò lentum, sed minus ob iunctam humiditatem multam glutinosius euadit, vt exustate sic coctione. Adde quòd fusse coquendo lithargyros, & oleo vnita probe, olei glutinositatem auget, tū quòd in pastinam duritiem non redit, tum quòd siccando liquiditatem olei consumit. Vnde etiam citra fusionem lithargyros leuissime trita, diu cum oleo mediocri subacta, in emplastri formam perducitur, præsertim si id in sole, vel aëre aliter calido fiat.

Contra, ærugo, chalcitis, squamma æris, & similia diu coquuntur, vt vires eorum vehementes coctione longa obtundantur. Ladanum autem & galbanum, *Quantitas.* & propolis, & plurima alia vires tantas non habent, quæ obtundenda veniant. Obsid nihil, aut minimum coquuntur.

Lithargyri lib. tres, chalciteos uncie quatuor cum olei lib. tribus, & axungie lib. duabus coquantur præstat tamē prius in mortario miscere illa omnia, quàm in cacabo coquantur. Lithargyrus & cerusa ex pari sibi oleo & aqua si coquantur, medicamentum fiet fragile, cui non herens, si maiorem liquidorum mensuram

acceperint, & ob id diutius coquatur, glutinosum euadet medicamentum: Lithargyros fusa cū aqua & oleo largo blandū, & glutinosum, & album facit emplastrū.

Lithargyri lib. vna ex aceti & olei ana lib. duabus, cocta ad liquationem, glutinosum admodum facit emplastrum, magis si ex vtriusque ana lib. tribus coquatur: quod si vno die toto coquatur, nigrum fiet ac splendens.

Eadem ratione si cum largo vino & oleo liquetur. Viribus tamen maximē variat pro coctionis mensura, & aceti, vini, aquæ, olei varia in differentiis suis natura: quas differentiās medicus pharmaco pœo in scripturis suis explicare debet. Præstantius autem fiet horum quodque, si lithargyros ex his liquoribus, vel singulis, vel coniugatis æstate sole calido multum teratur singulis diebus quindecim.

Oleū hyeme largius emplastris miscetur quàm æstate, à cuius calore semisum fit mollius emplastrum, vt à frigore concretum durius. eadem ratio est resinarum liquidarū aut minūs siccarū, & ceræ.

Resina aut cera quanto pinguior, humidior & recentior, tanto parcior tam hyeme, quàm æstate miscenda est.

Si medicamentum facturus es simile

acopis

acopis vnguentis, & ceratis liquidis, oleum sit quadruplum ceræ. Si ad emplastri speciem durū, ceram oleo æqualem miscē, maximè si cera sit vetusta & sicca: si verò recens est ac pinguis, pauciore oleo quàm cera opus est, ut ceratum emplastri consistentia fiat, maximè per æstatem: ut si facis ceratum diaeuphorbij, accipe ceræ drach. 6. olei drach. 6. vel drach. quinque, euphorbij drachmam vnā. Quòd si resinam miscebis, ut glutinosius sit medicamentum, oleum minue. Cera enim ad liquiditatem multo pingui eger: resinæ verò si sint aridæ, paucio: si liquidæ, siccam aliquam substantiam ad emplastri consistentiam postulant. Quantum autem resinæ cerato misceas, coniectabis experientia. Terebinthina enim triplicata ceræ mista, vide an emplastri habet spissitudinem, si erit siccus, auge resinam: si mollius, minue, vel cerā auge.

De propoli eadem quæ de cera ratio, si enim pinguis & recens est, parcius miscenda est ad emplastri formam, si vetus & sicca, largior potest misceri.

Si medicamentum iam cerati habet consistentiam ut emplastrum fiat, ceræ tantum tertia pars vel quarta misceatur: si adeps miscēda est, & ea humidior, ceræ

dimidium addendum est.

Si ceram parem miscebis oleo, emplastrum medicamentum fiet aëre temperato. Si verò cera vetus est, & arida, & aër frigidus, paulò plus olei: si autè cera pinguis, & aër calidus, paulò minus olei quàm ceræ, ut ceræ pinguis lib. vni, olei vnc. duo decim, ceræ verò siccæ vnc. tredecim, pro ceræ consistentia, quantitate, & aëris in calido & frigido temperatura. Ut autem pinguedine lenta euti adhærere possit, resina additur, præcipuè terebinthina liquida, parte ad ceram tertia, vel quarta.

Quando ceræ miscentur liquabilia, quæ frigida ubi concreuerint solida sunt, pauca cera opus est, ut in basilico tetrapharmaco recipienti ceræ, resinæ simpli colophonie, picis, seu taurini pares portiones.

Quando præterea ceræ mista sicca sunt, ut metallicorum pulueres, farinæ, pauca miscetur, ut emplastrum ex sem. lipi. Olei veteris lib. duæ, ceræ vnc. 20. resinæ colophonie, adipis suilli ana lib. i. & dim. lithargyri lib. i. cerusæ, & mucaginis seminis lini ana vnc. sex, thuris vnc. quatuor, farinæ tenuiss. vnc. vna. Mucagines, sem. feniculi, lini, rad. althææ, & oleum incoquit Paulus in diachylo, dum bullire

bullire defierint, id est, ad muccaginis consumptionem.

Ex metallicis præsertim si pauca liquida addatur, statim durissima evadunt emplastra. ob id parva quantitate paranda, præsertim si hyeme paranda sunt, ceræ, olei, adipum, medullarum, gummi, resinarum, butyri, liquorum recentium, & succorum glutinosorum misturam cum siccis, primam coniectura quadam artificiosa ex singulorum quantitate & consistentia præsumimus: non planè scientes quale crassitudine tandem medicamentum sit futurum. Sed cum mista sint omnia, clarum sit an tenerius, vel durius æquo sit redditum: quare in secunda compositione diligentius à nobis coniectanda est legitima cuiusque quantitas.

Olei mensura est coniectanda ex his quibus miscetur, & coctionis quantitate, & aëris temperie: nam metallica sunt coquenda diutius quæ siccare sine morfu volumus, ac glutinosiora esse. ob id largius oleum requirunt: quod si paucum habet, & minus diu coquenda & friabilia sunt, nisi resina aliqua coëant. Quod si cum oleo & aceto vel vino coquitur, quo plus aceti vel olei accipit, eo magis siccabit emplastrum. Quæ ladanum accipiunt, non egent

cera, & contrà, quia ladanum ceræ loco ad siccorum medicamentorum vnitatem faciendam vsurpatur. Multæ ceræ mistura medicamenti vim auferit, cera recentissima, mollissima, pinguiissima, paucò humore oleoso eget. Vnus coquendi modus in omnibus emplastris non est similiter utilis, sed colorè, & sæpe facultatem immutat. Possis enim cerusam ab initio cum lithargyro coquere, sed candorem ex longiore coctione perdet, & astringentiam, & refrigerationem; magis tamen ficcabit, si citra iniicitur: contrà, si cocto iam lithargyro ad mellis consistentiam, omnia hæc mediocriter.

Dum lithargyrum & alia metallica coquis igni, spatha ferrea moue ne vibratur, quòd fundum ob insitam gravitatem promptè petunt.

Lithargyro ad consistentiam cocta, adduntur adipēs, resinæ, gummi, manna, cera: dum cocta adeò sunt omnia, vt digitos non inquinent, galbanum, & ærugo, & opopanax, aristolochia, panacis radix, chamæleontis radix, gentiana, myrrha.

Lithargyro ex oleo liquata, cera & rebinthina additur: vbi cocta sunt adeò, vt manus non inquinent, ammoniacum manibus dilatatum additur, deinde lana succida,

succida, vsta.

Quod si sepum & mannam thuris acci-
piat, illa ante ceram miscentur, & assidue
mouentur: post ubi mutata erunt & liqua-
ta, ceram, & picem aridam, & terebinthi-
nam, donec amplius manus non inqui-
rent: tunc adde galbanum, post ærugi-
nem, & opopanax aceto dissoluta.

Lithargyro ex oleo cocta squamma le-
uissima miscetur semper mouendo, dein-
de chalcitis ex vino calido acrimoniam
exuta, vel aceto trita, paulatim miscetur.

Si bitumen, pix, cera, resina, propolis
spissato illi addantur, quibus liquatis eru-
go, & pyritis lapis: ab igni sublato & mo-
dice refrigerato alumen, galbanum sub-
actum manna iniicitur.

Myrrha, bdellium, thus, opopanax ex
aceto teruntur, interdum & ichthyocol-
la minutim concisa prius, pulvis lanæ
succidæ, manna, galbanum extra ignem
iniiciuntur.

Terebinthina & cera additur lithargy-
ro ad consistentiâ cocto, deinde ammo-
niacum digitis dilatatum, tunc & ærugo
& squamma æris, post hæc ipsum es vstū,
pityinam, & ceram, post hæc metallica.

Finis coctionis emplastrorū est, cum
scopos prius dictos attingit consistentiam.

Conco-
quendū
finis.

scilicet legitimam cum viribus expectatis, colorem quoque quæsitū ac odorem. Consistentia autem iusta, hoc est crassa, dura, glutinosa, & adhærēs cognoscitur, quando emplastri portio exempta, & refrigerata in aëre, marino, metallo, vel aqua, vel alio, digitos non inficit, & omnia in vnum probè coierunt, nec fragile, sed tenax, ductile, rumpi contumax, duritiæ ceræ igni, vel alio calore mollitæ.

Vires autem emplastri expetitas cognosces si quas frangi noluit medicus integre sunt, nec igni dissolute, quas auctas voluit, vel fractas, coctione longa, vel aliorum mistione auctas & fractas coniectura quadam colligis, quæ an certa fuerit, experientia & vsu emplastri probabit medicus; & tibi postea insinuabit. Ignis ipse non modò vehemens aut clemēs, sed subiectorum ratione, & diuturnitate emplastri, vim aliam alia mutat: nam vehementior vrit, & denigrat: vti & diuturnior & fumosus, & qui ex tedis fit, vel aliis fumum multum & crassum ob resinosam substantiam edentibus, & in aëre crasso, & nebuloso factus. Contrà verò clementior coquit, & qui ex lignis fit siccis, ac sine fumo, sinceram & splendidam flammam edentibus in aëre puro.

Lithargyros flamma aeri & continua interdum coquitur, interdum igni lento: Probè coctum est emplastrum diachylon Nicolai Alexandrini, quando in eo vesiculas ebullare & subsistere videris, cap. eiusdem. 104.

Pyxide rubra quædam, alia lignea, alia *Reposi*
 pelle excepta reponuntur, ferè tamen ho *tio.*
 die Democriti exemplo lib. 5. com. ph. g.
 μαγδαλίαις manibus facimus, quas papy-
 ro circumdamus.

Emplastrum diachylon commune Mesue sic Dia-
 fit: lithargyri tenuissimè triti, & à plumbo & chylon
 scoria purgati ꝑnc. vna & dimidia: cum olei an album.
 tiqui clari ꝑnc. tribus in mortario * lapideo pi- * arco
 stillo ferreo diu conquassetur & agnetur, post i- hodie.
 gni lento coque, rudicula semper mouendo, do-
 nec lithargyrum crasseſcat: tunc igni aufer:
 vt paulatim frigeſcat, sine. Interim ꝑnc. tres
 muceaginis ex semine lini, & sænigræci & ra-
 dice malua extractæ parum serueſce, deinde
 illam paulatim lithargyro & oleo probè pi-
 stillo ligneo permisce: postremò percoque omnia
 simul ad iustam spissitudinem, si vñ irreatum
 facere, misce aut oleum irinam pro commu-
 ni, aut pulueris ireos ꝑnciam vnā in lib. sin-
 gulis, si addatur muccago, se. meliloti, anody-
 num magis enadet.

Hodie sic paramus, sunt qui semina lini & scenigræci purgata sordibus, & radicem malvæ mundā & contusam nonnulli triduo aqua macerant super prunas clementes, deinde semper mouendō coquant ad dimidias, & colant. Eius colati libram vnā cum oleo aliquantisper coquant, postea puluērē lithargyri miscēt, & continenter rudicula mouentes coquant, donec bullas & stridorem edere desinat, seu donec marmori vel aquæ frigidæ infusa portiuncula & refrigerata idoneam habere cōsistentiam videatur.

Si lithargyros & oleum diligenter sint abluta, multo albius erit emplastrum. Nicolao Alexandrino recipit olei veteris vnc. 42. lithargyri vnc. 36. radices malvæ agrestis, & ibisci, scenigræci, seminis lini ana vnc. 12. radices & semina in aquæ phialis tribus triduo infusas, igni lentō coque ad dimidias, cola: expressi libram vnā cum oleo aliquandiu coque, dein puluerem lithargyri quantum satis est incoque semper mouendo: dum percoctum erit, hoc est, dum vesiculas bullare & subfidere videris, aufer igni: dum refrigerit, conde. Lithargyrum cum oleo viddiū agitari in mortario metallico, pistillo ferreo, albuit: sed dum ignem attigit, nigrum,

nigrum maximè, vt diachylo ineptissimum videretur.

Lithargyrum vbi in vas igni impostum miseris, oleum paulatim affundatur, semper miscendo pistillo ligneo vbi probè erunt mista, partem meliorem muccaginis affunde & coque: dum ea videbitur consumpta, reliquorum paulatim aduice semper mouendo.

Cum autem lithargyrum promptè vrtur, motu per spatulam ligneam latam assiduo est opus, qui eam à fundo vasis separet: ignis præterea sit blandus, & affundatur vt dictum est, muccago.

Album autem fiet, vt vulgo expetitur, si muccago parùm habeat sc. scænicæ, id enim largius flauum facit emplastrum. addunt nonnulli salem paucùm initio extrahendæ muccaginis, vt clarius & albius sit. Lithargyros item benè lota aqua communis vel salsa, albedinè addit, & coctio mediocris. Nam multa & vstioni propinqua flauinem & ruborem & nigrorem impartit. Si verò violenta est flamma, etiam mox nigredinem dat lithargyro.

Empl. diachylon magnum. Mesuræ recipit lithargyri puri, triti & creti ꝑnc. 12. olei irini, anethini, chamamelini ana ꝑnc. octo, muccaginis seminis lini & fenigreci, & radicis prius, albae,

oxydum
-o alio
-o mian
-o ad

Proper
tio li-
thargini

ad oleū
hic eadē
qua

albae,

althæe, & ficuum pinguium & ruarum passa-
rum, succi ireos, & scylla, cœsyti, ichthyocolla a-
na drach. duodecim & semissem, terebinthina
unc. tres, resinae pini, cera flauæ ana unc. duas,
componere ut diachylon commune.

Muccagines ut prius emulgeantur, o-
leoque lithargyros in mortario vel vase
in quo coquenda est diu ante coctionem
nutriatur semper mouendo: deinde igni
lento coquatur, dum crassescere incipit
muccago paulatim affundatur, hac pro-
pè cōsumpta igni auferatur emplastrum,
affundatur succus ireos & scillæ, & ich-
thyocollæ glutinis mucago, cum vino
& aqua simul mistis & coctis extracta.
His cōsumptis coctum est emplastrum,
& cera minutim secta & pini resina mi-
scendæ his liquatis: terebinthina & cœsy-
pus extra ignem miscenda, quia coctio-
nem non sustinent.

Emp. de mucaginibus spurium recipit muc-
caginem sem. lini & fœnigraci, & althæe, &
mediani corticis vlmæ ana unc. quatuor & se-
missim, olei liliorum, anethi, chamæmeli ana
unc. vnam, Ammoniaci galbani, opopanaci,
sagapeni ana unc. semissem, cere nouæ unc. vi-
ginti, terebinthinae vncias duas, croci drachmas
duas. fac emplastrum.

Muccagi-

Ichthyo
colla e-
tiam pi-
scis est.

Muccagines vt dictum est extrahantur cortice vlni medio bene prius contuso, eadem oleis incoquendo consumantur, olea residendo purgentur, vel linteo sine expressione colentur: his carentibus cera particulatim secta liquefiat, & liquores isti quatuor aceto * soluti, & linteo colati cerelæo calido misceantur: postremo extra ignem terebinthina, probèq; omnia commisceantur, & caue ne in grumos abeat. Crocus tritus marmoris inspergitur & manibus fingendo magdalias im-

* vel
chama
meli
melilo-
ti de co-
cto.

Empl. de meli loto. Mesue, recipit meli lati vncias sex, florum chamæmeli, se. fœnigraci, rad. altheæ, absinthij, sampsuchi, baccarum lauri ana drach. tres, cardamomi, cyperi, ireos, cassia, spica nardi, seminis apij, aneos, anisi ana drach. duas & semissem. ammoniaci drachm. decem, styracis, bdellij ana drachm. quinque, terebinthinae vnc. vnam & dimid. ficus pingues duode-

Vi ana
vnciâ
vnam.

Sepum hirci colatum, resina, cera in oleis liquentur: ficus pingues aut parum humectatæ probè tritæ per mantile, aut

flamen,

stamen, aut cribrum setaceum cernantur, prædictis misceantur, deinde ammoniacum & bdellium in aceto soluta & colata, postea terebinthina, postremo vbi refluxerit, pulueres creti radicum, herbarum, florum, aromaticum, & simul cum his styrax per se diligenter tritus. Si vero ficus essent pauciores, & pulvis largior, nec is cernendus, possunt hæ minutim concisæ cum aliis teri. baccæ lauri excorticandæ. Sunt qui Ammoniacum & bdellium aqua (cui melilotus, chamæmelum, & fornium græcum sint incocta) dissolui malunt, ut emplastrum fiat emolliens magis: sed aqua illa ægrius soluantur, quam aceto essentia tenuitate promptius ipsa tota penetrante & dissolvente.

Emplastrum ceroneum Nicolai recipit picis panalis colata, cera ana uncias duas, & drach. tres, sagapeni unc. duas, ammoniaci, terebinthina, colophoniam, croci, ana unciam unam, & drach. tres, aloes, thuris, myrrhe ana unc. unā, opopanax, styracis, galbani, mastiches, aluminis, sæmigræci, styracis rubri, bdellij ana drach. tres, lithargyri drach. unam & dimidiam, sagapenum, galbanum, opopanax, ammoniacum fracta vel potius incisa vino testæ nocte maccerentur: coquantur ad vini dimidij

consumptionem, colentur, tunc picem colatam
 misce, spathula moue, hac liquata ceram: qua
 fusa colophoniam colatam, postea styracem pi-
 stillo calido tritum frustatim adde: hinc ma-
 stichen, thus, myrrham, bdellium, trita, creta
 aliquandiu post inice, terebinthinam, alumen,
 lithargyrum, fœnigracum percoctum affun-
 de in aquam frigidam, extracto aquam om-
 nem manibus exprime cum puluere aloes, super
 marmor oleo laurino vinctum subige, cum pul-
 nerato croco finge offas manibus eodem oleo
 vinctis.

Sed Nicolaus Alexandrinus lithargy-
 rum tenuissimè tritum, cum oleo quantū
 satis est percoquit, deinde picem addit:
 hac liquata, ceram, aqua fusa lachrymas
 colatas, ammoniacum, sagapenum, opo-
 panacem, galbanum, styracem vtrunque,
 terebinthinam, & spathula probè miscet.
 Hinc colophoniam, thuris, mastiches, bdellij,
 aluminis, myrrha, fœnigræci, puluere
 paulatim miscet, vbi percoctum est, in
 aquam inicit. Ceram autem propriè
 oleum quo luctaturi se perfundunt.

Hodie melius picem & colophoniam
 liquatam colant, ceram in ea liquant, sa-
 gapenū, ammoniacum, galbanum, opo-
 panacem, bdellium, vino soluta & colata
 coctaque ad vini propè totius consum-
 ptionem,

prionem, paulatim miscent, deinde terebinthinam, postremo puluerem reliquorum tenuissimè tritorum & cretorum, crocum verò inter subigendum super marmor & oleo manus vngunt, ne his emplastrum adhæreat. Vel potius liquoribus, vt dixi, coctis particulatim miscetur cera, resina, colophonia liquata, vel cera particulatim insdem miscetur: & hac fusa reliqua duo liquata paulatim miscentur: sic enim citius & perfectius in corp^o vnū coeunt. Si verò simul vel liquores ceræ, pice, colophonie, vel cōtra liquoribus, cerā, picē colophoniam affatim iniicis, liquores fundū ob-grauitatē petentes videntur: & cum aquosi sint, ægrius. aliis pinguibus summū leuitatē sua petentibus miscēbuntur: nisi fortē tandē iam vel vsti vel semiusti. Vide diligēter, ne aloë, & myrrha varantur, & grumosum reddant emplastrū.

Alij secrete quodam modo Ammonia cum sagapenum, opopanacem, galbanū, bdellium vino soluta, cocta ad emplastri consistentiam, terebinthina paulatim missa sine igni remolliunt, non modo in ceroneo hoc, sed etiam emplastro precedēti de meliloto & aliis, deinde liquatam ceram cum pice & colophonia miscent, postremo reliqua,

Emplastrum oxycroceum Nicolai recipit picem naualem; croci; colophoniam; ceram ana uncias quatuor; terebinthinam; galbani; ammoniaci; myrrha; mastiches; thus ana unciam unam, & drachm. tres. Galbanum & ammoniacum aceto nocte una macerentur, postmodum liquantur igni, colantur, iterum coquantur ad partem aceti consumptionem: addit tunc picem naualem colatam, hac fusa ceram, qua liquata colophoniam, deinde terebinthinam, aliquodiu post mastichen, thus, myrrham, semper spatula movendo. Cocta in aquam frigidam immitte, manibus hanc totam exprime; super marmor oleo inunctum cum pulvere croci molli, & offas finge.

Alij picem naualem colatam, colophoniam ceram liquant; his adhuc calidis galbanum & ammoniacum in aceto dissoluta & colata miscent. His coctis mastichen, thus, myrrham, postremo terebinthinam, & ubi iam refrigit manibus molliendo, & subigendo super marmor, pulverem croci confundunt: hyeme vero addi potest olei unc. vna ob emplastri siccitatem.

Nicolaus Alexandrinus picem cum parte aceti, in olla nova coquit ad aceti consumptionem, cum reliqua ammoniacum, thus in mortario terit & soluit, & coquit

semper mouendo, cauens ne acetum ex-
liat. Cum acetum est consumptum, gal-
banum, myrrham, mastichen addit, his
seruefactis crocum pulueratum miscet,
deinde in mortariū fundit, & fingit mag-
dalionēs. Sed modi alij placent magis.

Oxycroceum vocatur ab aceto mace-
rante galbanum & ammoniacum, & cro-
co largiore. Nam eius vncias quatuor re-
cipit, ceroneum verò tantum vnciam
vnā, & drachmas tres. In ceroneo præ-
terea liquores vino macerantur, cætera
multum conueniunt, sed illud valentius,
hoc propter crocum largiorem sumptuo-
sius, quem variè minuunt. Ob id vt vilius
sit, croci vncias tantum duas hodie miscet,
dolo parum malo cum crocus vires me-
dicamento maiores non largiatur, quàm
ceroneo, vt causa sit nulla, cur hic adeo
augeatur sumptu parum necessario, nec
viribus adeo æstimandis.

*Emplast. de Lingua Nicolai recipit succorū
apꝑ, plantaginis, betonicæ ana lib. vnam: cera,
picis, resinæ, terebinthinæ ana lib. semissem, for-
ma emplastrum.*

In succis his reliqua tria sunt igni lento
coquenda, & continenter mouenda ad
succorum consumptionem, postremo te-
rebin

rebinthina mista, semel aut bis seruefacienda. Alij terebinthinæ partem dictis simul incoquunt, reliquam extra ignem miscent, vt siccitatem aliorum emendēt, sicq; formā emplastro meliorem imperiunt. Succos per se in sapas coquerem potius, deinde liquatis aliis miscerem. In neutro Nicolao inuenio hoc emplastrū, vt neque tria sequentia: sed tantum ex his ceroneum, oxycroceum, apostolicum.

Emplast. gratia dei Nicolao, recipit terebinthina libr. semissem, resina lib. vnam, cera vne. quatuor, mastiches vne. vnam, verbera, pimpinella, betonica ana manip. vnum herba hæ tussa ex vino albo valenti coquantur, ad vini tertia partis consumptionem, cola, herbarum substantiam abijce, in colato cera, resina, mastiche coquantur ad corporis idonei constitutionem, aufer igni, terebinthinam adde, spatula moue, fac emplastrum.

Herbæ hæ recentes incisæ, tussæ in vino albo potenti ad sui dissolutionem percoquantur, colentur, in colato vini reliquo cera & resina ad colati propè consumptionem coquantur tunc mastichē adde, postremo terebinthinam, semel seruefac, aufer igni. vbi refluxit finge in offas cylindricas.

Alij in colato resinam solam coquunt: hoc propè consumpto ceram addunt, postremo terebinthinam extra ignem, & ubi refrigerari incipit, mastichen pulveratam permiscent. Vterque hic modus, quam Nicolai est præstantior, quod mastiche coctionem non sustineat ob essentia tenuitatem.

Hodie ut sit albius, addita paulo largiore terebinthina trahunt modo penidiorum.

Emplastrum ad herniam. Nicolao recipit picis navalis, aloes ana uncias tres, lithargyri, cere rubre, colophoniae, galbani, ammoniaci ana uncias duas. Visci à quercu uncias sex, Boli armenie, utriusque symphyti, gypsi, utriusque aristolochia, lumbricorum terre, gallarum ana uncias quatuor, myrrha, thuris ana uncias sex, terebinthinae unc. duas, sanguinem humani lib. vnam. Pellis à veruere mox ubi ablata est, horis 24 coquatur, deinde expressa pelle & abiecta viscum quernum in hoc iure duo coctum ubi fuerit igni auferatur, addaturque terebinthina, lithargyros, colophonia, hinc mastiche, thus, myrrha, galbanum, ammoniacum, lumbrici terre, paulo post symphytum minus, gypsum, bolus armenia: igni tunc redde, & adde sanguinem humanum, aristolochiam

longam & rotundam, postremò aloen, sem- Aliud
per spatula agitanda, impone marmori, quod est Ar
oleo violato inunxeris & manibus subige. Ite naldi
rum biduo aut triduo in mortario continenter Villan
detatur. In decocto prædicto pellis arietis re- nova.
centis visci bacca ad sui dissolutionem
percoctæ colando expressæ abiiciuntur,
additur lithargyros, aliquanto post ce-
ra, pix, colophonia, coquendo semper
mouenda ne vrantur: coctis his, & aqua
prope consumpta, galbanum, ammoni-
cum, vino soluta, & creta, myrrha, tere-
binthina, ab igne depositis, sed adhuc ca-
lentibus, thus, mastiche, lumbrici in vino
purgati & vino alio probe seorsum cocti.
Tempore nimis durescit, nisi addatur
oleum. Alij post colatum viscum extra
ignem addunt ceram, colophoniam tere-
binthinam, aliquanto post iniiciunt li-
quores dissolutos, colatos, coctos, ut sepe
dictum est. Lithargyros, gypsum, thus,
myrrha, bolus armenia, sanguis huma-
nus & cætera teni habilia.
Emplastrum diuinum. Nicolai recipit gal-
bani, myrrha ana vnc. vnam & drach. duas,
ammoniæ vnc. tres & drachm. tres, opopapa-
cis, mastiches, aristolochiæ longæ, eruginis ana
vnc. vnam, lithargyri & olei communis ana

libr. vnā & semissem; ceræ nouæ vnc. octo,
thuri vnc. vnā & drachm. vnā, bdellij
vncias duas, magnetis vnc. tres, misce omnia vt
debet.

Lithargyrum cum oleo diu ante coctio-
nem nutriatur; postea ad spissitudinem
quod cuiusque coquatur: tunc adde ceram minu-
cito, vim concisam: qua liquata aufer igni; &
quia adde galbanum, ammoniacum, opopa-
nax, bdellium, si molle est, in aceto vel
est oleū, vino dissoluta & colata & cocta: deinde
accidit puluis mirrhæ, bdellij, si est siccum, masti-
ches, thuris, aristolochiæ, magnetis: po-
stremo ærugo, ne si diu coquatur, empla-
strum fiat rubrum, sit tamen medicamē-
tum adhuc valde calidum, alioqui ob ip-
sius solidam duritiem ægrè permiscerentur
omnia. Si verò flauum vis, semiuistam
æru ginem impone, vel coquendo talem
redde si rubrum (quale Narbonensis Gal-
lia præfert) eius æruginis drach. duas, vel
quatuor dum coqui cœpit lithargyros im-
mitte, reliquas eius drac. in fine, si nō vis
ita coloratum, totam misce postremum.

Emplastri forma per coctionem fiunt
hodie vnguentum tripharmacum, & vn-
guentum de cerusa.

Emplast. apostolicum Nicolai recipit, lithar-
gyri vnc. sex, ceræ maurice, colophonie ana
vncias

uncia duas, propoleos, visci querni ana unciam unam, ammoniaci, cadmia lapidis ana drachmas sex, mastiches, thuris ana unciam semissem, terebinthinae, bdellij opopanacu, galbani, myrrhae, sarcocollae, æris vsti, squammæ æris, æruginis, dictamni, aristolochia rotunda, * mumiæ ana drachmas tres.

Lithargyrum & oleum diu simul nutrita, coquantur, semper mouendo ad emplastri consistentiam, seu donec scutellæ imposita, ceræ, aut mellis modo coacta sint: tunc cera, colophonia, mastiche, thus, myrrha, bdellium, propolis, viscum quernum, terebinthina in his quo scribuntur ordine liquentur. His fuis igni auferatur, adde paulatim: ne efferveat liquores, ammoniacum, opopanacem, galbanum dissolutos aceto aut vino, colatos, coctos ad aceti aut vini consumptionē, ut dictum est, recoque, deinde pulveres sarcocollæ, cadmiæ lapidosæ, æruginis, squammæ æris, æris vsti, dictamni, aristolochiæ, dum erit percoctum, hoc est aquæ frigidaë portione iniectum duratur, & digitos tractatu non inquinat glutinoso adhæsu, tunc totū aquæ frigidaë iniiciatur: dum refrigit, exemptum manibus, oleo laurino inunctis, fac magdalias. Nicolaus Alexandrianus lithargyro, cum oleo ad emplastri

* Praesens viridum Nicol.

Alexander cetera consentit, nisi ponderibus omnibus variaret.

consistentiam percocto, ceram, galbanum, terebinthinam, propolim, colophoniam seorsum & modico intervallo addit postea, æs vltum, cadmiam commiscet, probe semper feruet faciendo, deinde opopanacem, ammoniacum, bdellium, viscum, myrrham, thus, mastichen, sarcocollam, squammam æris cum paucō aceto trita in mortario, & in lactis formam deducta miscet, & coquit spatula certatim mouendo.

Emplastrum de vigo recipit olei chamæmeli, anethi, de spica, de lilio ana vncias duas, adipis porci, vitul. ana libram vnā, euphorbij drachmas quinque, thuris drachmas decem, olei Laurini fescunciam, adipis vipera vncias duas & semissem, ranas viuentes sex, limbricorum in vino lotorum vncias tres & semissem, succi radicis ebuli & enule ana vncias duas, schæmæthi, stœchadi, matricaria ana manipulum vnum, vini odoriferi libras duas, coque omnia simul ad vini consumptionem: coletur. colato adde lithargyri auri libram vnā, terebinthina clara vncias duas, cum cera alba, fiat ceratum, aut vnguentum, addendo in fine, styracis calamitæ fescunciam, & igni ablaturum pistillo tribuletur, donec tepidam erit, tunc adde argenti vini salua extincti vncias quatuor, misce diu pistillo. Hoc emplastrum ascripturus non eram, quod

quod argentum habeat vinum, à cuius v-
 fu omnium maxime abhorreo, propter
 noxas à prioribus designatas, à recentio-
 ribus experientia quotidiana plusquam
 vellent cognitae. Sed publica vtendi eius
 consuetudo, ne omitterem effecit accessit
 ad id Petri Gualbelli olim mihi in re me-
 dica condiscipuli, nunc vero medici lon-
 ge præstantissimi, elogium de hoc em-
 plastro à se non semel magnis successi-
 bus vsurpato in articulorum & reliqua-
 rum partium nervosarum doloribus etiã
 hæreditariis, non solis Hispanam luem
 concomitantibus in corporibus carnosis.
 Plura composita medicamenta describe-
 re, mihi visum non est, quod etiam in his
 multa idem promittunt & præstant, ob
 idque ociosa videri possint. Integrum au-
 tem cuius docto, vel noua adiuicere, vel ex
 his quædam expungere, aut saltem muta-
 re, vt simplicibus consent, vel pluribus,
 vel paucioribus, vel non idem pollenti-
 bus. Huc pertinet quod nullo negotio
 quiuis potest ex Mesue & Nicolao Ale-
 xandrino potius, quam ex Salernitano
 quoties opus erit, alia corrogare. Nobis
 hoc labore suffecit experiri quid hac in
 re aliquando præstare poterimus. Qua-
 propter paucis singula tantumque leuiter

Perstrinximus, cum plurima superaddere nobis licuisset, nisi voluissimus prolixitate auditorem detertere nouitium, vel obruere. Est autem id totum velut imago quædam rudis tantum eorum quæ postscribemus: sed paulatim mihi pharmacopœi sunt melioribus assuefaciendi, ut postea non fugiant maiora. Cum non ignorem in horum fæce plurimos omnino & indoctos, & rerum omnium imperitos, & stolidos, dicam audacius, & maleficos, & haud dubiè veneficos, qui hunc laborem nostrum accusabunt tanquam parum utilem, imò noxium, scio, calumniabuntur: quòd hætenus miseris mortalibus ægris rectè esse consultum per Arabicæ familiæ placita planè mentientur. Sed hi non ita multo post etiam inuiti intelligunt quàm fuerit in hunc diem iniqua ipsorum conditio, & volent non volent, sub nostra hæc præcepta cogentur, ne frugibus inuentis glandes defendere amplius illis liceat. Interea verò quia nihil suis his cum amaracino ynguento est, musis & purioris pharmacopœices studiosis scribo id quantulum quantulum est: quod oro manu grata accipiant, & secum repetant, quàm non fuerit facile rem hætenus intentatam excitasse. Id
quod

quod iudicare facillimum his est, qui scripta sua aliquando publicarunt multo studio, cura, industria, vigiliis, ingenij summis viribus comparata. Qui verò nihil adhuc ediderunt, ignari nostrorum laborum, ad calumnias sunt propensissimi, sed hæc seges ingratos tulit, & feret omnibus annis. Hisque ingratis servire nephas est, ut est apud poëtas. Boni igitur consule: & fronte non ingrata fume, lector candide, nostrum hoc tyrocinium, interea dum huius medicinæ partis specimen apparamus, longè pulcherrimum, foecundissimum posteritatis memoria dignissimum.

F I N I S.

quod in eare facillimum sit effectus fore
 et tunc ad publicum impetum
 quo, cura, industria, vigilie, ingenuitas
 hinc vixit comparata. Qui vero nihil
 ad hoc ediderunt, igitur non in hoc labor
 tunc, sed calumnias tantum propendunt, sed
 hoc leges ingratas iuris, & tunc omnibus
 agnis. Hinc ingratas leges nequeas est
 ut est apud potestatem. Hoc igitur consilium
 si non non ingratas leges, sed et candidi
 consilium hoc non est, interea quod
 hinc neque non potest ipse non potest
 hinc, longe pulcherrimum, fore, sed
 hinc non est, hinc non est, hinc non est



INDEX

RVM NOTABILIVM

HVIUS OPERIS, NVNC

PRIMVM AD-

DITVS

A



Cacia nostras quibus rebus con-
stet 201

Acacia nostras quando bona

74

Acetum album nigro valen-

tius

71

Acetum scillinum

334

Acori radicum nota

37

Adeps

95

Aegypto aquam Nili turbidam, vasis figulinis
crudis colari docet Gal.

238

Aeromeli vel Manna electio

72

Aerugo sincera

88

Aerugo citra coctionem cerato mista emplastrum
facit viridem.

414

Aerugo

88

Aes

<i>Aes rustum</i>	87
<i>Affectibus hepatis puluerata tenuiter debentur</i>	
154 <i>Tenuius, lienis</i>	<i>ibid.</i>
<i>num & vesica affectibus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Agaricus qualis optimus</i>	38
<i>Aloe optima</i>	74
<i>Aloe decocto aromatatum imbuta siccatur</i>	183
<i>Alumen scissile</i>	90
<i>Ambar describitur</i>	84
<i>Ambra</i>	96
<i>Amylum faciendi modus</i>	180
<i>Ammoniacum</i>	78
<i>Ami</i>	55
<i>Amomum describitur</i>	<i>ibid.</i>
<i>Amygdale ut probentur</i>	57
<i>Anacardi nota</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anisum</i>	55
<i>Animalium partium tritura</i>	136
<i>Animalium partes dura, rsta, vel rasa, vel li-</i>	
<i>mata per se teruntur</i>	139
<i>Animal purgante medicamento depastum lac</i>	
<i>reddit phlegmagogum</i>	119
<i>Antidotus diambra Mesue</i>	353
<i>Antidotus exhilarans Gal. adscripta</i>	354
<i>Antidotum catholicum</i>	356
<i>Antidotum diaphæmicon Mesue</i>	359
<i>Antidotum hamech apud Mesuem</i>	360
<i>Antidotum benedicta Nicolai</i>	362
<i>Antidotum hiera diacolocynthidos</i>	363

INDEX

<i>Antidotum philonis</i>	364
<i>Antidotum de baccis lauri</i>	365
<i>ApoZematum sectio quarta</i>	347
<i>Apri dentes limandi</i>	137. Lucij. ibidem.
<i>Elephantis</i>	ibidem.
<i>Aquam vino mixtam hederaceo vase extra-</i>	
<i>hes</i>	ibid.
<i>Aqua vini diu seruaturs, & quare</i>	253
<i>Arborum fructus qui fiant purgatorij</i>	116
<i>Aristolochie radices quando legende</i>	39
<i>Armenius lapis</i>	92
<i>Aromata</i>	98
<i>Aromata quedam qua industria humectes</i>	
<i>docet Mesues</i>	185
<i>Aromatizatio quid nobis vocatur</i>	239
<i>Aromatizatio ad quid</i>	ibid. & 240
<i>Aromatizatio diuersarum rerum</i>	ibid.
<i>Arsenicum quid</i>	86
B	
<i>Balaustium diu teri debet</i>	10. & 126
<i>Balani myrsificæ descriptio</i>	58
<i>Bdellium quid</i>	83
<i>Quomodo adulteretur</i>	ibid.
<i>Bolus armenia</i>	23
C	
<i>Cadmia fornacaria</i>	89
<i>Cadmia lapis</i>	ibid.
	Cadmia

INDEX

Cadmia, lapis calaminaris vulgò dicitur, ibid.	
eius usus	ibidem.
Calamus aromat. officinarum tametsi diversus	
a vero calamo aromat. easdè habet vires	62
Calami aromatici descriptio	40
Calefactionis scopi varij	178
Calidas modicè damus potiones medicas	ibid.
Calor moderatus coëctionis autor esse potest	213
Calore mollescant quæ	174
Cantharides	97
Cancrorum preparatio	118
Cancami	81
Caphura	ibid.
Capparis flos ut in usum venit	126
Carpobalsamum	60
Cassia fistula	ibid.
Caryophyllum quale laudatur	30
Cardamomum optimum	36
Cassutha ut lecta minus marcescat	52
Cassie defectus	70
Castorium	96
Centaurij parvi flores	51
Centaurium paruum plenam tritoram sustinet	
151	
Centaurij magni radix	40
Cera omnium facillimè liquatur	176
Cera bonæ notæ	72
Cerussa	90
Ceratum quid	400
	Ceratum

INDEX.

<i>Ceratum Gal. refrigerans quæ recipiat.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ceratum santalatum Mesue.</i>	401
<i>Ceratum Gal. stomachicum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ceratum Gal. stomachicum alterum.</i>	402
<i>Ceratum stomachicum Gal. ex Nicolao.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Chalcitis.</i>	89
<i>Chalcanthum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Caphura.</i>	141
<i>Chrysocolla.</i>	92
<i>χρὸς, quid significat.</i>	199
<i>Cinamomi electio.</i>	69
<i>Citrium & Arantium malum.</i>	59
<i>Clarificatio quid & quare fiat.</i>	131
<i>Clementer frianda; quorum virtus attritu vi-</i> <i>lento promptè exhalat.</i>	146
<i>Coagulum quæ enadat efficacius.</i>	117
<i>Coccum gnidium.</i>	60
<i>Coctio medicamentorum quomodo fiat.</i>	212
<i>Humor cui incoquantur ut plurimum aqua</i> <i>est.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Coctionis aliquot exempla. 215. & inde ad</i> <i>longum.</i>	
<i>Coctio non solum ignis, sed etiam solis calore fit.</i> 214	
<i>Coctionis instrumenta omnis generis sint vasa.</i> 217	
<i>Coctionis finis.</i>	218
<i>Coctio diuersarum rerum. 219. & 220. & in-</i> <i>de ad longum.</i>	

INDEX.

<i>Coctionis & tritura ratio propè est eadem.</i>	120
<i>Coctionem longam aut breuem qua requirunt.</i>	ibid.
<i>Coctio quibus lignis facienda.</i>	114
<i>Colatio cribrationi est persimilis.</i>	234
<i>Colationis differentie.</i>	ibid.
<i>Colamus quædam citra coctionem.</i>	237
<i>Cotis tribus vsi sunt maiores nostri.</i>	235
<i>Eorum differentie & vsus.</i>	ibid. 213
<i>Colorationis cause.</i>	241
<i>Coloratio multarum rerum.</i>	242
<i>Colocynthis quomodo teratur.</i>	140
<i>Colocynthis medulla.</i>	59
<i>Colocynthis Septembri legitur.</i>	79
<i>Celo magnitudine & textura mediocri utimur in presentia.</i>	237
<i>Colocynthis accuratissimè debet teri.</i>	151
<i>Colore indicantur medicamenta.</i>	4
<i>Colorum differentie.</i>	ibid.
<i>Conditura multarum rerum.</i>	305. inde.
<i>Conditura seminum & aliorum quorundam.</i>	312. 313
<i>Conditorum sectio prima.</i>	305
<i>Confricationis vsus varius.</i>	198. 199
<i>Confricatio rerum infusarum aut etiam coctarum colationem & expresionem adiuvat.</i>	196
<i>Conditura quarum rerum sit.</i>	255
<i>Et quibus rebus fiat.</i>	ibid.
<i>Condienda</i>	

INDEX.

Condienda quomodo condiantur.	256. & 257
Coni optimi.	58
Conservationem nihil tam vitiat quàm putrefactio.	248
Coquimus medicamenta cur.	215
Cortex radicum asari.	42
Corticum delectus.	69
Corallus lapis.	93
Corticum tritura.	134
Costus.	41
Crassum quid.	13
Cribrationis ratio eadem est quæ tritura.	164
Cribrationis differentia multa.	165
inde ad longum.	
Crocus optimus.	51
Crocum nouo quodam modo terant.	142
Cuminum bonum vnde.	55
Cupressi pilule.	59
Cnici semen.	56
Cucumeris agrestis fructus.	60
Cubebe.	ibid.
Cydonia.	59
Cyanus.	92
Cytinus.	50

D

Dætyli qui probandi.	61
Delectus medicamentorum simplicium vnde	

INDEX.

<i>Sumatur.</i>	12
<i>Delectus corticum.</i>	69
<i>Delectus cassia.</i>	70
<i>Densum quid.</i>	13
<i>De calefactione quatenus tractet.</i>	177
<i>Destillationis instrumenta unde petenda.</i>	210
<i>Destillatio quid.</i>	ibid.
<i>Destillata vapore aqua calentis vires & qualitates integrius retinent.</i>	ibid. 211
<i>Destillata plumbeis vasis omnino improbanda.</i>	ibid.
<i>Despumatio quid.</i>	217
<i>Detergens quid.</i>	14
<i>Diamorum quousque coquamus.</i>	219
<i>Diaphœnicon antida. Mes.</i>	359
<i>Diaprunum simplex Nicolai.</i>	358
<i>Diasetyrion.</i>	304
<i>Distamni vires & descriptio.</i>	41
<i>Dissolutio quid.</i>	168
<i>Dissolutio tritura quâdam esse videtur.</i>	ibid.
<i>Dissolutionis plurimæ differentie. 170. inde ad longum.</i>	
<i>Doronici radix qualis.</i>	41
<i>Dracunculi radix quando legenda.</i>	ibid.
<i>Duratio mollitioni contraria, & in quibus sit nobis in usu.</i>	173
<i>Quibus fiat.</i>	ibid.
E	
<i>Laterij nota ex quo petenda.</i>	75
<i>Electa-</i>	

INDEX.

<i>Electarium aromaticum rosatum</i>	<i>Gabriels a^o</i>
<i>pud Mesuen</i>	368
<i>Elect. diamargariton frigidum</i>	369
<i>Electa. diatrionsantalum</i>	ibid.
<i>Elect. diatragacanthum frigidum</i>	370
<i>Elect. diavis simplex Mesue</i>	ibid.
<i>Eclegmatum sectio tertia</i>	344
<i>Eclegmatum materie</i>	ibid.
<i>Electariorum tractatio</i>	348
<i>Electarium diacnicum</i>	365
<i>Electarium de succo rosarum</i>	366
<i>Elect. diarhodon abbatis Nicolai</i>	367
<i>Elleborus albus</i>	41
<i>Elleborus niger</i>	42
<i>Emplastrum gratia dei Nicolai</i>	435
<i>Emplastrum ad herniam</i>	436
<i>Emplastrum diuinum Nicolai</i>	437
<i>Emplastrum apostolicum Nicol.</i>	438
<i>Emplastrum de vigo</i>	440
<i>Emplastrum quid</i>	403
<i>In Emplastra que recipiantur</i>	ibid.
<i>Emplastrum album quomodo fiat</i>	413
<i>Emplastra, qua recipiunt ladanum, non egent</i>	
<i>cera</i>	421
<i>Emplastrorum coctionis finis</i>	423-424
<i>Emplastrum diachylon</i>	425
<i>Emplastrum diachylon magnum Mesue</i>	427
<i>Emplastrum de muccaginibus spurium</i>	428
<i>Emplastrum de meliloto Mesue</i>	429

INDEX.

<i>Emplaſtrum ceroneum Nicolai.</i>	430
<i>Emplaſtrum oxycroceum.</i>	433
<i>Cur oxycroceum vocetur.</i>	434
<i>Emplaſtrum de ianua Nicolai.</i>	ibid.
<i>Epithymum Barbarum quò lectum nimis citò marceſcat.</i>	52
<i>Epithymum Græcorum quid re vera ſit.</i>	ibid.
<i>Eryngij radicis conditum.</i>	303
<i>Eſula minoris radicis electio.</i>	42
<i>Euphorbij electio.</i>	77
<i>Euphorbium Nouitijs infeſtum.</i>	143
<i>Extinctio cur fiat.</i>	274. 275
<i>Exprefſio quid.</i>	194
<i>Exprefſionis diuerſi modi.</i>	ibid.
<i>Extractio ſuccorum tritura conſtat & exprefſione.</i>	199

F

F <i>Artura conditur a quadam differentia eſt.</i>	257
<i>Et quando fiat.</i>	ibid.
<i>Ficus paſſe habentur præſtantiſſime.</i>	61
<i>Ficus vitioſe quæ.</i>	62
<i>Fiſtula caſſia.</i>	60
<i>Florum delectus.</i>	49
<i>Flores centaurij parui.</i>	51
<i>Flores ubi reponantur.</i>	39
<i>Flores quando legendi.</i>	49
<i>Flos</i>	

INDEX.

<i>Flos balauſtium.</i>	50
<i>Flos nymphaeae.</i>	52
<i>Flores vix per annum ſeruari poſſunt.</i>	54
<i>Flores quomodo per annum ſeruantur.</i>	253
<i>Flores ſiccati parum diu terendi.</i>	124
<i>Florum multorum nomina.</i>	125
<i>Flos chamemeli diu terendus.</i>	ibid.
<i>Florum nullus coſtuenem recipit.</i>	222
<i>Flos cappari ut in uſum venit.</i>	126
<i>Fornacaria cadmia.</i>	89
<i>Forma medicamentorum.</i>	244
<i>Friabile quid.</i>	14
<i>Fruxio ſerè in ſartagine fieri intelligitur.</i>	260
<i>Et quomodo res multe frigantur Ibid.</i>	261. Et 262
<i>Frigendi modus.</i>	ibid.
<i>Fruticoſae herbae dum ſunt ſemine praeſtantes,</i> <i>demetenda.</i>	30
<i>Fruſtum delectus.</i>	56
<i>Fruſtus externi praeſtantes habentur.</i>	ibi-
<i>dem.</i>	
<i>Fruſtum communes nota.</i>	58
<i>Fruſtus immaturi ad maiorem aſtriſtionem</i> <i>clibano ſiccantur.</i>	184
<i>Fruſtus Syrupis conuenientes.</i>	316
<i>Flores.</i>	ibid. Et 317

C Alla qua laudatur. 62

INDEX.

<i>Galanga quid.</i>	43
<i>Galbanum.</i>	78
<i>Gal. docet, Aegypto aquam Nili turbidam va- sis figulinis crudis colari.</i>	138
<i>Gallus ad ius purgatorium.</i>	97
<i>Gallinaceus quando boni sit succi.</i>	118
<i>Gelatina qui fiat.</i>	208
<i>Gentiana.</i>	43
<i>Glandule mammarum quando meliores.</i>	117
<i>Glycyrrhiza.</i>	43
<i>Glycyrrhiza parum diu coquenda.</i>	222
<i>Glycyrrhizæ succus optimus ex Creta.</i>	75
<i>Graue quid.</i>	13
<i>Gummiu delectus.</i>	80
<i>Gummi oleæ Aethiopica.</i>	81
<i>Gummi iuniperi.</i>	ibid.
<i>Gypsum.</i>	91

H

H <i>Aematites.</i>	93
H <i>Hermodactylus.</i>	44
<i>Herbarum delectus.</i>	47
<i>Herbarum plurimæ virides in vsum recipiun- tur.</i>	ibid.
<i>Herbæ quando legenda.</i>	48
<i>Herbæ nunc virides, nunc sicca teruntur.</i>	123
<i>Herbæ antè secandæ aut frangendæ, quàm te- rendæ.</i>	ibid.
<i>Herba</i>	

INDEX.

<i>Herbarum radices qui siccentur.</i>	182
<i>Herba quotannis sunt mutande.</i>	253
<i>Herba ad syrupos propria.</i>	316
<i>Hepar ficatum.</i>	118
<i>Hirci preparatio ad calculos comminutendos.</i>	
182 117.	
<i>Hiera picra Galeni.</i>	363
<i>Hypocisthisqualis.</i>	75
<i>Hyssopus colligenda Mesue quando.</i>	52

I nfusio humectationi proxima.	185
I nfusionis tempus varium.	ibid. & 186
<i>Infundimus medicamenta quare.</i>	ibid.
<i>Infusio purgantium medicamentorum diversi-</i>	
<i>moda 186. & inde ad longum.</i>	
<i>Iris optima.</i>	44
<i>Iuiuba.</i>	62
<i>Iulepus rosatus.</i>	315
<i>Iulepus violatus.</i>	ibid.
<i>Iulepus clarus & purgatus sacchari vice pre-</i>	
<i>stantissimum est in syrupo.</i>	319
<i>Italicas plantas, & Creticas ad theriacem &</i>	
<i>alia medicamenta preponit Galenus.</i>	32

L acryma multum siccata friando per se.	
<i>Aut cum aliis excepta puluerantur.</i>	133

INDEX.

<i>Lac vacce, capre & asine</i>	73
<i>Ladanum quale probatur</i>	75
<i>Lapis Iudaicus</i>	93
<i>Lapides pretiosi feliciter pulverantur super lapidem</i>	147
<i>Lauatio purgationis species</i>	283
<i>Lauantur qui, que promptè liquantur</i>	284
<i>Et multorum medicamentorum lauatio diuersa.</i>	
<i>Ibidem.</i>	
<i>Leue quid</i>	13
<i>Lentum quid in solidis & humidis corporibus</i>	
	14
<i>Lignorum tritura</i>	134
<i>Ligna quantum radices teri postulant.</i>	<i>Ibidem</i>
<i>Lignum Gaiaci</i>	67
<i>Ligusticum unde laudatur</i>	55
<i>Lignorum delectus</i>	67
<i>Liquatio quid, & que medico, & que multo calore liquantur</i>	175
<i>Liquationis necessitas</i>	176
<i>Liquidis medicamentis vasa que conueniant</i>	
	31
<i>Liquores solum colo purgantur post dissolutionem</i>	231
<i>Liquorum delectus</i>	75
<i>Liquores, qui in emplastra recipiantur</i>	406.
	407. inde
<i>Liquores & gummi semper in sine emplastris misceant</i>	

INDEX.

<i>misceantur.</i>	411
<i>Lycium faciendi modus.</i>	201
<i>Lithargyros oxaleo nutritur.</i>	194
<i>Lithargyri vsus in emplastris duplex.</i>	416
<i>Lithargyros.</i>	86

M

M <i>Acetum</i>	70
<i>Magnes.</i>	93
<i>Maiores nostri tribus vsu colis.</i>	235
<i>Mammarum glandula quando meliores.</i>	117
<i>Malum punicum.</i>	63
<i>Malaxare quid vulgo significet.</i>	174
<i>Maſtiche laudatiſſima. quæ.</i>	79
<i>Medicamenta quadam quomodo excipiantur ſeu vt vulgo incorporentur.</i>	243
<i>Medicamēta reponenda quantum opus eſt ſint ſicca oportet.</i>	249
<i>Medicamentorum varia repositio. ibidem & 250. 251</i>	
<i>Medicamenta ſimplicia quare & quibus rebus humeſcentur.</i>	184
<i>Medicamenta composita.</i>	ibid.
<i>Medicamenta quadam quomodo confricentur. 196. 197</i>	
<i>Medicamenta composita hodie variè nobis ſer- uantur.</i>	254
<i>Medicamenta probantur ſapore 3. & ſaporum nomina.</i>	ibid.
<i>Medica</i>	

INDEX.

<i>Medicamentorum simplicium delectus rudesu- mendus</i>	7. & 12
<i>Medicamenta preparare quid</i>	115
<i>Medicamentorum simplicium tritura</i>	120
<i>Medicamentorum terendorum diuersi modi</i>	122
<i>Medicamenta, quæ ob duritiem, crassitiem, len- torem, densitatem agrè separantur sunt va- lenter tundenda</i>	147
<i>Medicamenta per se terenda quæ</i>	137. 138
<i>Medicamenta quædam tam sunt friabilia, vt etiam digitis attrita læuigentur. Quædam multum diùque terenda</i>	149
<i>Medicamentorū simplicium analogon nomina</i>	100
<i>Medulla</i>	95
<i>Mel sit vernum aut æstiuum non hybernū</i>	72
<i>Mel ab Ancardis extrahi potest</i>	205
<i>Mel aqua dupla despumatur, si alius humor non exprimitur</i>	228
<i>Mel sæpe per se expumatur</i>	229
<i>Mellis optimi nota</i>	72
<i>Metallica aere calido, non igne nutriuntur</i>	193
<i>Metallica sæpe humore aliquo nutriuntur.</i>	
<i>Ibidem</i>	
<i>Metallica sœlicius puluerantur super lapidem</i>	147
<i>Metallicorum & terreorum tritura</i>	135
<i>Metallicæ</i>	

INDEX.

<i>Metallica & lapides, ubilibet, probè servantur</i>	
<i>si sordem & pulverem, vitabis.</i>	254
<i>Metallicorum & terreorum delectus.</i>	86
<i>Mineralia per se ferè & seorsum, teruntur.</i>	
158.	
<i>Misy</i>	88.
<i>Mollitio solutioni & liquationi proxima.</i>	174
<i>Meschns.</i>	96.
<i>Muccago, ex gummis frequenter, extrahitur.</i>	
208.	
<i>Mumia Serapionis.</i>	94.
<i>Myrobalanorum, preparatio secundum Me-</i>	
<i>suen.</i>	192.
<i>Myrrha quid, qualis bona, & qualis pessima.</i>	
82.	
<i>Myrobalanos multū tenuiter conterì iubet Me-</i>	
<i>sues</i>	128.
<i>Myrobalani citrina</i>	57.
<i>Indæ</i>	58.
<i>Cepule</i>	Ibid.
<i>Emblice</i>	Ibid.
<i>Bellerice</i>	Ibid.
<i>Myrti bacca</i>	63.
<i>Nyxæ descriptio</i>	Ibid.

N

N <i>Ardis spica facultas & descriptio</i>	45
<i>Nymphæam colligendi tempus & qui ser-</i>	
<i>uanda</i>	

uanda	52
Nitrum	91
Nutritio infusionis species	192

O

O Chra	92
Odore prebantur medicamenta, & odorum nomina	3
Oesypus	96
Officium pharmacopœi	8
Olei boni præcipua signa	71
Oleum virgo præstantissimum	Ibid.
Oleum omphacinum	Ibid.
Oleum lauando minus est verberandum	285
Oleorum genera quatuor	387
Oleum amygdalarum dulcium & amararum	387
Oleum laurinum	Ibid.
Oleum ouorum	388
Oleum iuniperi	389
Olea ex animalibus facienda vina ipsa animalia recipiunt.	390
Oleum rosatum	Ibid.
Oleum melinum	Ibid.
Oleum mastichinum	391
Oleum myrtinum	Ibid.
Oleum nardinum	Ibid.
Oleum costinum	392
Oleum	

<i>Oleum rutaceum</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Oleum Euphorbiæ</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Oleum castorij Nicolai</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Oleum vulpinum Mesue</i>	393
<i>Oleum lumbricorum</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Olinæ balmades, seu colymbades præstantiores</i>	
64	
<i>Oxyacanthæ rhois & ribes vna quando legatur</i>	<i>ibid.</i>
<i>Opium quale laudatur</i>	76
<i>Opium cum alijs siccioribus particulatim inie-</i>	
<i>Etum cōminuitur, & cum humidioribus dis-</i>	
<i>soluitur</i>	132
<i>Opobalsamum</i>	76
<i>Opopanax optimum</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Opōs quid</i>	78
<i>Optima Aloe</i>	74
<i>Opus cyrenaicus</i>	75
<i>Oxymelitis simplicis compositio</i>	333
<i>Oxymeli Scillinum</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Oxysaccharum</i>	334

P

P <i>Artium animalium tritura</i>	136
<i>Partium ab animalibus sumptarum dele-</i>	
<i>ctus</i>	94
<i>Pharmacopœo nō licet vti quid pro quo (dicto)</i>	
<i>absque medici consilio</i>	III
	<i>Pilula</i>

<i>Pilularum tractatio.</i>	371.
<i>Quare fuerunt inuenta.</i>	ibidem, & 372.
<i>Pilule aureae Nicolai.</i>	374.
<i>Pilule cocciae Rhasis & Mesuae.</i>	375.
<i>Pilule sine quibus esse nolo.</i>	376.
<i>Pilule rhabbari.</i>	377.
<i>Pilule aromatica Mesuae.</i>	Ibid.
<i>Pilule lucis maiores Mesuae.</i>	378.
<i>Pilule foetidae maiores Mesuae.</i>	379.
<i>Pilule de hermodactylis.</i>	Ibid.
<i>Pilule arthritica Nicolai.</i>	380.
<i>Pilule fumariae Auicennae.</i>	Ibid.
<i>Pilule asseieret Auicennae.</i>	381.
<i>Pilule ex agarico Mesuae.</i>	ibid.
<i>Pilule ex hiera.</i>	ibid.
<i>Pilule mastichinae Conciliatoris.</i>	382.
<i>Pilule stomachicae Mesuae.</i>	ibidem.
<i>Pilule ruffae seu communes.</i>	Ibid.
<i>Pilule bechicae Mesuae.</i>	Ibid.
<i>Pilule albae.</i>	382.
<i>Piper longum.</i>	64.
<i>Piper album & nigrum.</i>	Ibid.
<i>Pistacia.</i>	Ibid.
<i>Planta Italica Cretica non multum cedunt.</i>	47.
<i>Plantarum radices quae diutius terenda.</i>	123.
<i>Plantarum partes cum saccharo propè pari coquantur in syrupum.</i>	318.
<i>Planta calida in locis calidis valentiores euadunt.</i>	24.
	<i>Pre</i>

<i>Præhumida locis siccioribus castigantur</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Polypodij vis & descriptio</i>	45
<i>Preparatio cancerorum</i>	118
<i>Preparationum plurimum simul multa differen- tie</i>	296. <i>Inde</i>
<i>Pruna passa vel acida & quæ magis ad aluum subducendam sint eligenda</i>	65
<i>Psyllium quale eligit Mesues</i>	56
<i>Psyllij succus qualiter extrahi debeat</i>	206. 207
<i>Purgantia</i>	99
<i>Purgatio ad quid 277 & rerum diuersarum purgatio qualiter fiat</i>	<i>Ibid.</i> & 278. 279
<i>Putrefactio coctioni simillima est</i>	258
<i>Pyrethri vis & descriptio</i>	45

Q

Q <i>Valitatum tactricum nomina quid me- dico significant.</i>	13
---	----

R

R <i>Adices quæ per se, & quæ cum alijs teri possunt</i>	123
<i>Radices multa diu seruari possant</i>	253
<i>Radices Raphani qualiter præparanda ut con- diantur</i>	305
<i>Radices quæ Sympliciorum compositionem ingre- diuntur</i>	316

INDEX.

<i>Radices quando legendæ</i>	33
<i>Radices quæ diu seruantur aut contrâ</i>	35
<i>Radices exoticæ vt deligantur</i>	37
<i>Radicum Beben optimæ notæ</i>	39
<i>Radix Bryonia</i>	40
<i>Raphanum vt facimus purgatricem</i>	113
<i>Rarum quid</i>	13
<i>Refrigerationis medicamentorum ratio</i>	179
<i>Repositio medicamentorum</i>	248
<i>Refinarum delectus</i>	79
<i>Rha barbarum & myrobalanos quando est cõ- siliũ astringere, diu coqui oportet</i>	221. 222
<i>Rha barbarum cum amygdalis facilius teritur</i>	142
<i>Rha barbarum curiosè terendum</i>	156
<i>Rha pontici notæ</i>	45
<i>Rha indicum</i>	Ibid.
<i>Rosæ vt terantur</i>	126
<i>Rosæ præstantissima quæ</i>	52
<i>Rosæ siccandi modus</i>	181

S

<i>Saccharum quale præstantissimum</i>	73
<i>Sagapenum</i>	78
<i>Salsofitius seu sal gemma</i>	91
<i>Sal armeniacus</i>	Ibid.
<i>Sandaracha arsenico affinis</i>	87
<i>Sanguis birci</i>	94

INDEX.

<i>Sanguis draconis</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Santali triplicis consideratio</i>	69
<i>Saparum & Syruporum sectio secunda</i>	315
<i>Sapa quæ nobis paratur</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Sarcocolla lacte muliebri nutritur</i>	192
<i>Scammonium exactè terendum</i>	151
<i>Scammonium unde deferatur & quale bonum</i>	79
<i>Schœnanthum ex Arabia rarissimè ad nos deferatur</i>	53
<i>Scilla bona qualis</i>	46
<i>Scilla ut siccetur</i>	179
<i>Scille succus optimè extrahitur, diebus quadraginta canicularibus</i>	203
<i>Scoria quid</i>	88
<i>Semina matura deligantur</i>	54
<i>Semina diu reposita vires habent imbecilliores</i>	55
<i>Semina propè vniuersa medio inter radices & herbas modo pulnerari desiderant</i>	126. 127
<i>Seminum multorum nomina</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Semina terendi modi diversi</i>	128
<i>Semina Syruporum compositionem ingredientia</i>	317
<i>Succi</i>	318
<i>Semina purganda cortice quæ</i>	279
<i>Semina vtilius & innocentius vbi seruantur</i>	30
<i>Semine folliculo præcipuè vtimur, & qui esse debeant</i>	65

<i>Sinapi Alexandrinum</i>	55
<i>Sericum crudum, incisum facile teritur</i>	142
<i>Serum lactis</i>	94
<i>Seseli Massiliense, Aethiopicum, Creticum</i>	
<i>Diosc. laudatur</i>	55
<i>Siccatio quid</i>	179
<i>Sigillatio inter preparationis differentias numeranda est</i>	246
<i>Similitudo & dissimilitudo medicamentorum, in genere propinquo aut diverso sumitur aliquando</i>	22
<i>Spuma nitri</i>	91
<i>Squamina aeris qualis laudatur</i>	87
<i>Stæchas exotica est ex Creta melior</i>	53
<i>Stæchas citrina quid Dioscoridi, & quid Galeno vocetur</i>	54
<i>Stercus pueri ad anginam idoneum</i>	119
<i>Stomachica crassius terenda</i>	156
<i>Stryax</i>	83
<i>Succi constantes & corpulenti recentes in emplastra veniunt</i>	405
<i>Succi sicciores ut rarius, sic liquores, gummi, resina, metallica, frequentissime in emplastra recipiuntur</i>	ibid.
<i>Succinum quid</i>	84
<i>Succorum & aliarum plantarum partium trituratio</i>	129. 130
<i>Succorum delectus</i>	71
<i>Succus glycyrrhizæ & hypocistis & lycium pistillo</i>	

Stillo calfacto siccatur & friatur	131
Succorum extractio tritura & expressione constat	196
Succus ex omnibus serè foliis virentibus per se tritis exprimi potest	200
Suffitus quibus conferat	276. 277
Sulfur vivum	90
Syruporum materia omnis est à plantis	316
Syrupi quo in vase coquantur	321
Syrupi ad iustam crassitiem coquantur	ibid.
Syruporum compositio	322. 323
Syrupi coquantur in quouis vase	326
Syrupus rosatus qui paratur	327
Syrupus violatus	328
Syrupus ex cydoniis	ibid.
Syrupus de granatis	329
Syrupos compositos faciendi modus	330
Syrupus saporis de pomis	ibid.
Syrupus portulacæ	ibid.
Syrupus Adiantinus	ibid.
Syrupus Ziziphorum	331
Syrupus papaveris	ibid.
Syrupus acetatus	332
Syrupus acetatus cum radicibus	ibid.
Syrupus Bizantinus	333
Syrupus de quinque radicibus	ibid.
Syrupus Absinthij	335
Syrupus menthe	ibid. & 336
Syrupus Epithymi	336

INDEX.

<i>Syrup. Stachados</i>	337
<i>Syrupus glycyrrhizæ</i>	ibid.
<i>Syrupus hyssopi</i>	339
<i>Syrupus prassij</i>	ibid.
<i>Syrupus intybi</i>	340
<i>Syrupus arthemisiae</i>	341
<i>Syrupus cichorij ex Gulielmo Placentino</i>	342
<i>Syrupus cichorij ex Nicolao Florentino</i>	ibid.

T

T <i>Amaricis cortex unde esse debeat</i>	70
<i>Tempus in medicamento deligendo multiplex observandum</i>	28
<i>Tenne quid</i>	13
<i>Terreorum delectus</i>	86
<i>Terebinthina resina</i>	79
<i>Terendi modi</i>	110. 121
<i>Thlaspi</i>	55
<i>Thamar Indi</i>	64
<i>Thus quid</i>	85
<i>Thuris cortex</i>	71
<i>Thuris manna</i>	85
<i>Tragacantha</i>	ibid.
<i>Thus persæpe miscetur emplastris</i>	410
<i>Thymeleæ folia aceto nutriuntur</i>	193
<i>Trochiscus quid, & cur hoc nomine appellatus abundè in sectione 7. Mesuæ dictum</i>	383
<i>Trochisci de Gallia moschata Mesuæ</i>	ibid.
<i>Troch</i>	

INDEX.

<i>Trochisci de Gallia moschata Nicolai Alexandrini</i>	383
<i>Trochisci aliptæ moschate</i>	384
<i>Trochisci aliptæ moschate Nicolai</i>	ibid.
<i>Trochisci de myrrha Nicol.</i>	385
<i>Trochisci de agarico Mesuæ</i>	ibid.
<i>Trochisci de spodio</i>	ibid.
<i>Trochisci de terra sigillata</i>	ibid.
<i>Trochisci de succino Mesuæ</i>	386
<i>Turbiti quale laudetur Arabibus</i>	46

V

V <i>Ipere quando capiende</i>	118
<i>Vnguis odoratus</i>	97
<i>Vniones seu margarite describuntur</i>	ibid.
<i>Vuarum passarum quæ præstantiores</i>	66
<i>Vrendi modus non est omnibus vnus</i>	265
<i>Vrendi modi diuersi</i>	266.267
<i>Vstio assationi finitima</i>	263
<i>Vstionis causa multa</i>	264.265
<i>Vnguentum vnde dictum</i>	393
<i>Vnguentorum materia quæ</i>	ibid.
<i>Vnguenta quomodo fiant</i>	394
<i>Vnguentum aureum Mesuæ</i>	395
<i>Vnguentum pompholygos</i>	ibid.
<i>Vnguentum basilicum</i>	ibid.
<i>Vnguentum Aegyptiacum Mesuæ</i>	396
<i>Vnguentum album Rhasis</i>	ibid.

I N D E X.

<i>Vnguentum desiccatum</i>	397
<i>Vnguentum emulatum</i>	ibid.
<i>Vnguentum populeum</i>	ibid.
<i>Vnguentum tripharmacum Mesua.</i>	398
<i>Vnguentum Apostolorum, et unde dictum</i>	399

X

X <i>Ylobalsamum recens probatur</i>	69
<i>Xuñs quid significet</i>	199

Z

Z <i>Edoaria radix cuius emula</i>	47
<i>Zingiberis radice nota</i>	46

